



Der Rathgeber bei mathematischen Beschäftigungen

Stöpel, August

Stendal, 1819

§. 650-659. der Wärmestoff, Vergleichung der Thermometergrade; Tafel der Wärmegrade vieler Dinge nach Fahrenheit und Reaumür; Bestandtheile des Luftzünders, Knallpulvers etc., Entzündung und ...

[urn:nbn:de:hbz:466:1-63556](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-63556)

Atmosphärischer Luft	= 0,46005	Gran franz. Maaß.
Lebensluft	= 0,50695	Gewicht.
Stickgas	= 0,44444	
Brennbarem Gas	= 0,03539	
Salpetersaurem Gas	= 0,54690	
Ammoniakgas	= 0,27488	
Kohlensaurem Gas	= 0,68985	
Schwefelsaurem Gas	= 1,03820.	

Die leichteren Luftarten steigen in schwerern in die Höhe.
Die brennbare Luft ist die leichteste, und daher zur Füllung der Luftbälle sehr geeignet.

IV. Vom Thermometer und dem Wärmestoff.

S. 650. Der Wärmestoff ist in der ganzen Natur verbreitet, theils gebunden, theils frei. Im freien Zustande wirkt er auf unser Gefühl, ist expansibel, unsichtbar, geschmack- und geruchlos, dem Gesetze der Verwandtschaft folgend, alles durchdringend, nach dem umgekehrten Verhältniß der Quadrate des Abstandes vom Ursprunge (s.) ausbreitend, zurückstrahlend (z. B. durch Hohlspiegel), die Körper ausdehnend, trennend etc.

S. 651. Auf der ausdehnenden Eigenschaft der Wärme beruht die Einrichtung des Thermometers oder Wärmemessers. Dies Instrument Fig. 220. besteht in einer oben verschlossenen, luftleeren, unten mit einer Kugel versehenen Glasröhre, die bis auf einen gewissen Punct mit Quecksilber oder Weingeist, welche Massen sich durch die Wärme sehr leicht und merklich ausdehnen, angefüllt wird.

Vorzüglich wichtig sind an demselben 2 Puncte S und E. An dem sogenannten Reaumur'schen Thermometer, welches am häufigsten gebraucht wird, findet man den Punct E dadurch, daß man es in gefrierendes Wasser oder Schnee setzt, und den Punct bemerkt, auf welchen das Quecksilber herabsinkt. Man bezeichnet ihn mit Null und nennt ihn Eis-punct. Ferner setzt man die

die Glasröhre in Wasser, bringt dies über dem Feuer zum Sieden, und bemerkt auch den Punct, auf welchen das Quecksilber steigt. Dieser Punct ist S und heißt Siedepunct.

Der Abstand beider Puncte E und S wird in 80 gleiche Theile getheilt, die man mit + bezeichnet und Wärmegrade nennt. Solche Grade werden auch unter E nach der Kugel hin getragen, mit — bezeichnet, und Kältegrade genannt.

Weil das Wasser nach Beschaffenheit der Schwere oder Leichtigkeit der Luft mehr oder weniger Hitze zum Sieden bedarf, so ist der Siedepunct am Thermometer etwas veränderlich. Man ist übereingekommen, den Siedepunct dahin zu setzen, wo das Quecksilber stehen bleibt, wenn das Wasser bei 27 Pariser Zoll, oder 324 Linien heftig kocht. Um bei jedem andern Barometerstand den richtigen Siedepunct zu treffen, dient folgende Tabelle, welche angiebt, wie viel Grade der Reaumur'schen Scale der Siedepunct höher oder tiefer fällt, wenn das Barometer einen andern Stand hat:

Barometer- höhen.	Stand des Thermomet. in siedendem Wasser.	Unterschied.
336	80,78	— 0,78
333	80,59	0,59
330	80,40	0,40
327	80,20	0,20
324	80,	0,
321	79,80	+ 0,20
318	79,60	0,40
315	79,40	0,60
312	79,19	0,81

Anmerk. Nach de Lüc's Erfahrungen erfährt man durch die Formel $\frac{89,8 - 78}{324} = 0,03642$, wie viel durch 1 Linie Barometerhöhe, die mehr oder weniger als 27 Zoll beträgt, die Hitze des kochenden Wassers vermehrt oder vermindert werde. Nennt man die jedesmalige Barometerhöhe in Linien ausgedrückt = b, so kann die Hitze

Höhe des in freier Luft Kochenden Wassers, bei jeder vorkommenden Barometerhöhe durch die Formel:

$$78 + 0,03642 b - \frac{9,8 \cdot 324}{b} (= 3175,2) \text{ gefunden werden.}$$

S. 652. Das Fahrenheitsche setzt Null dahin, wo am vorigen 14° Kälte steht, und theilt den Raum bis zum Siedepuncte in 212 Grade. Auch dieses Instrument ist häufig im Gebrauche.

Die Wärmegrade beider Thermometer verhalten sich zu einander, wie $80 : 212 - 14$, d. h. wie $4 : 9$, oder 4 Reaumur'sche Grade machen 9 Fahrenheit'sche. Will man daher die Angaben des einen in der Sprache des andern haben, so spricht man nach der

Formel: $4 : 9 = R : F - 32$, (denn $14^{\circ} R = 32^{\circ} F$)
oder $9 : 4 = F : R + 14$, je nachdem man Fahrenheit'sche oder Reaumur'sche Grade sucht.

3. B. Wie viel sind 190° Reaumur nach Fahrenheit?

$$\text{Hier ist } \frac{9 R}{4} + 32 = \frac{9 \cdot 190}{4} + 32 = 427\frac{1}{2} + 32 = 459\frac{1}{2} = F.$$

Wie viel sind 550° Fahrenheit nach Reaumur?

$$\text{Hier ist } \frac{4 F}{9} - 14 = \frac{4 \cdot 550}{9} - 14 = 244 - 14 = 230 = R.$$

Weil die Kältegrade das Minuszeichen erhalten, so ist R oder F eine Minusgröße in der Formel, und daher die Antwort auch verschieden. 3. B.

Wie viel betragen -51 Fahrenheit nach Reaumur?

$$\frac{4 \cdot -51}{9} - 14 = -22\frac{2}{3} - 14 = -36\frac{2}{3} \text{ nach Reaumur.}$$

Wie viel betragen -31 Reaumur nach Fahrenheit?

$$\frac{9 \cdot -31}{4} + 32 = -\frac{279}{4} + 32 = -69\frac{3}{4} + 32 = -37\frac{3}{4} \text{ Fahrenheit.}$$

Tafel

Tafel der Wärmegrade nach Fahrenheit und
Reaumur.

	Fah- renheit	Reau- mur		Fah- renheit	Reau- mur.
Gefrierender Weingeist .	— 51	— 37	Alkohol siedet Gemeiner	176	64
Gefrierendes Quecksilber	— 39	— 31	Weingeist sie- det	180	66
Eis mit Sal- petergeist .	— 39	— 31	Rother Franz- wein siedet	199	74
Halb Wasser u. rectificirter Weingeist ge- mischt gefriert	— 7	— 17	Ruhmilch siedet Regenwasser siedet	210 212	79 80
Schmelzender Schnee mit Salmiak .	0	— 14	Meerwasser sie- det	218	82
Wein gefriert	+ 20	— 6	$\frac{1}{4}$ Blei, $\frac{1}{8}$ Zinn, $\frac{1}{8}$ Wismuth schmilzt	220	83
Lämmerblut friert	25	— 3	Schwefel ist ge- schmolzen .	244	94
Weinessig friert	28	— 2	Wismuth und Zinn verm. schmilzt	283	111
Milch gefriert	30	— 1	Keines Zinn schmilzt .	420	172
Reines Wasser gefriert	32	0	Wismuth schmilzt .	460	190
Ol wird zähe u. undurchsich- tig	38	+ 2	Blei schmilzt. Witriolbl siedet	540 546	226 288
Gemäßigte Wärme der Luft	64	14	Leindl siedet . Quecksilber sie- det	600 600	252 252
(Stubenwär- me)			(nach andern Versuchen)	709	301
Butter schmilzt	88	25	Spießglasfd- nig mit Eisen und Zinn zu gleich. Thei- len schmilzt	635	268
Schweinesfett schmilzt	98	29			
Wärme des Bluts	100	31			
Gelbes Wachs schmilzt	140	48			

Fah-

	Fah- renheit	Reau- mür.		Fah- renheit	Reau- mür.
Eisen leuchtet im Dunkeln	752	320	Feines Gold schmilzt	5237	2313
Eisen glüht roth, bei Ta- ge sichtbar	1077	465	Größte Schweißhitze des Eisens	13427	5951
Schwedisch Ku- pfer schmilzt	4587	2025	Größte Hitze ei- ner Schmie- deesse	17327	7687
Feines Silber schmilzt	4717	2082	Guß Eisen schmilzt	17977	7964

Anmerk. Das sogenannte Aneinanderschweißen der Me-
talle ist nur bei einem gewissen Hitzegrade möglich.
Eine zu große Hitze hat ein Verschlacken zur Folge.
Gußstahl an einander zu schweißen, wollte
bisher nicht gelingen, es kann aber folgendermaßen
bewerkstelligt werden:

Man füge die zu schweißenden Stahlstücke mög-
lichst genau zusammen zwischen eine Zange, deren
Backen ein wenig über dem Stahl hervorstehen. Auf
die so entstandene Rinne lege man etwas von dem Lo-
the, womit das Kupfer gelötet wird, und gebe dem
Ganzen eine Hitze bis zum Bläßgeißelröthen, so wird
der Stahl sich reinigen (abbäuten) und anfangen über
einander zu fließen, und sich so innigst verbinden, daß
auf der geschweißten Stelle kein Bruch wieder erfolgt.

S. 654. Man hat 3 Gesetze der Temperaturverän-
derungen:

1. Der Wärmestoff wird beim Übergange vom Zu-
stande der Bestigkeit zur Flüssigkeit gebunden; um-
gekehrt aber e ~~t~~ b u n d e n. Daher erzeugen kristal-
linische Salze im Wasser oder mit Schnee und Eis
Kälte. Eine Vermischung von rauchender Salpe-
tersäure und Schnee erzeugt eine Kälte von 32°
Reaumür. Bei der Vermischung des Kalks mit
Wasser wird letzteres vest, und erzeugt Wärme.
2. Der Wärmestoff wird gebunden, wenn tropfbare
Flüssigkeiten in Dämpfe übergehen; frei, wenn sich
Dämpfe

Dämpfe zu tropfbaren oder festen Körpern verdichten.

Ausdünstung erregt Kälte.

Kochendes Wasser nimmt im offenen Gefäße keine größere Wärme, als 80° R. an; alle übrige Wärme wird zur Bildung der Dämpfe verwandt.

Der Druck der Atmosphäre auf kochendes Wasser ist stark. Je niedriger das Barometer steht, desto leichter kocht das Wasser. Auf 14 Linien Barometerveränderung beträgt der Unterschied 1° am Thermometer. Im luftleeren Raume kocht das Wasser schon bei 30° Wärme.

Wird Wasser zu Körpern geworfen, die mehr Wärme haben, als es anzunehmen fähig ist, so wird es mit Geräusch umhergeworfen, und augenblicklich in Dämpfe verwandelt.

3. Wärmestoff wird gebunden, wenn feste, oder tropfbare flüssige, oder dampfförmige Körper in Luftgestalt übergehen; umgekehrt wird er frei. (Siehe Klügel's Encyclopädie.)

§. 655. Das Verbrennen der Körper ist eine Zersetzung derjenigen Theile derselben, welche eine Verwandtschaft mit dem Wärmestoff (Oxygen) haben, und letzteren bei starker Erhitzung binden. Daher ist zum Brennen Luft nöthig.

Rauch besteht aus nicht völlig aufgelösten Theilen des Körpers.

Flamme ist glühender Rauch, und entsteht durch Zutritt des Lichtstoffs.

§. 656. Der Pyrophor oder Luftzündler besteht aus ätzendem Gewächsalzkali, Schwefel und Kohle. Diese werden durch Calcination von einem Theil feinen Kohlenpulvers und 5 Theilen gebrannten Alauns mit einander verbunden. Das Alkali zieht Flüssigkeit aus der Luft an und erhitzt sich, wodurch der Schwefel entzündet wird.

Schießpulver besteht größtentheils aus Salpeter, etwas Kohlen und Schwefel. Im Salpeter ist viel gebundener Wärmestoff.

Knallpulver ist eine Mischung von $\frac{3}{4}$ Salpeter, $\frac{1}{4}$ trockenem Gewächsalzkali und $\frac{1}{8}$ Schwefel.

Knall

Knallgold besteht aus Goldoxyd (Metall und Oxygen) und aus Ammoniak (Azote und Hydrogen). Durch Erhitzung über Kohlenfeuer, oder nur durch Reiben entzündet es sich selbst, und ist in seiner Wirkung entzündlich.

Knallsilber ist in seiner Wirkung noch gefährlicher. Es besteht aus Silberoxyd und sehr reinem ägenden Ammoniak. Es entzündet sich schon durch bloße Erschütterung.

S. 657. Entzündung wird auf mancherlei Art hervorgebracht. Z. B. Schnellgepreste Luft zündet Schwamm an. Plötzliche und starke Ausdehnung der Luft erzeugt Kälte. Ein Luftstrom der Windbüchse macht das Thermometer um einige Grad sinken.

Schmelzen erfolgt, wenn die Wärme größer ist, als der Zusammenhang der Theile eines Körpers.

S. 658. Die Wärme dehnt von dem Eispunkt zum Siedepunkt des Wassers und bei $27\frac{1}{2}$ Pariser Zoll Barometerstand folgende Körper aus:

Quecksilber um 0,01850 seines Raums

	0,01680
Wasser	— 0,04517
Weingeist	— 0,087
Leindl	— 0,072
Glas	— 0,00083
Gold	— 0,00094
Blei	— 0,00286
Zinn	— 0,00248
Messing	— 0,00193
Kupfer	— 0,00170
Stahl	— 0,00122
Eisen	— 0,00125
Silber	— 0,00189

S. 659. Über die Wärme leitende Kraft der Körper hat man folgende kleine Tabelle:

Die des Wassers	= 1,	die des Kupfers	= 0,97
— — Bleies	= 2,5	— — Eisens	= 0,02
— — Messings	= 1,02	— — Zinns	= 1,67.