



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

**Io. Baptistæ Portæ Neapolitani Magiæ Naturalis Libri  
Viginti**

**Della Porta, Giambattista**

**Frankfurt, 1607**

Quomodo sine extimis corijs, vel putaminibus fructus produci possint. Cap.  
XIII.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-70772](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-70772)



Atiferas incidunt, & sarmenti fructiferi medullam auris  
scalpio erodunt quantum fieri possibile est, eam ex alto  
eximentes, sarmento non fisso, velut exinducatum est,  
sed integro dimisso, & laseris cyrenaici succum aqua  
dissolutum, aut ad sapæ spissitudinem coctum, infun-  
dunt, & erecta sarmenta ad ridicas alligant, ne videlicet  
succus effluere possit, singulis autē octonis diebus suc-  
cum eundem sarmento infundunt, donec germen e-  
mittat. Perbellè etiam

*Myrtum sine interiori nucleo reddere*

si volumus, à Theophrasto habemus. Si feruenti aqua  
rigatur, meliorescit, & sine nucleo redditur, vt quidam  
affirmant, deprehensum hoc est fortuito. Quum myr-  
tus iuxta balneum staret neglecta: ab hac enim vacua  
nucleo reddita semina petentes, ferebant, atque ita ge-  
nus eiusmodi Athenis esse incepit. Didymus. Crebro a-  
quæ tepentis imbre rigata myrtus, baccas sine internis  
nucleis creabit. Theophrastus etiã spurcitas pellium,  
vrinamq; myrto adhibendam, & congerendam, quum  
germina prosiluerint; fructus enim ita redditur quasi  
sine interiori nucleo. Et punica siue interioribus acinis  
nascitur, appposito circa radices suillo stercore, talesq;  
fructus creabunt.

*Quomodo sine extimis corijs, vel putaminibus fructus  
produci possint. CAP. XIII.*

**I**SDÈM ferè remedijs, & artificijs, quibus in reddend-  
is sine interiori nucleo fructibus vsi sumus, vt emur  
vt nuces, & eiusmodi fructus, qui cute, & putaminibus  
integuntur, nudi, & omni tegmine orbati videantur. Et  
primo à medullæ ablatione. Vt

*Nux sine putamine reddatur.*

Quod docet Damageron. Si arborè penitus perforabis,  
& paxillum vlmeum pari magnitudine infiges: prohibet enim  
paxillus medullæ ascensum, per quam putant  
corticem creari. Palladius terebratæ radici palum de  
buxo imprimit, vel cuprinum clauum, vel ferreum. Sed  
sultus mangonio docet Theophrastus, vt

*Amy-*



*Amygdala, & castanea molliori tegmine integatur,*

Si fructum præmollire, immutareq; volumus, stercore  
 suillo utemur, tale enim stercus è numero validiorum  
 est. Crebra item fossio facit, ut alimēto meliori, vberio-  
 riq; tum ipsæ arbores vegetentur, tum fructus melio-  
 res afferant: nam & nuclei minores, & eorum, quæ li-  
 gno, crustave teguntur, ut amygdalæ, & nuces euboicæ  
 tegmina ista teneriora, intestina verò ampliora utique  
 fient. Quippe omnino alimenti copia humefacit, pul-  
 pasque auget fructus. Palladius verò calida aqua radi-  
 cibus amygdali per dies aliquot ante florem ablaquea-  
 tis ingesta teneras nuces creari promittit. Si vis

*ut nux tarentina fiat.*

Damageron idem demonstrat. Tenuem corticem, &  
 fructum facilem acquirat nux, similiter & amygdala: si  
 cinerè assidue trunco, & radicibus affuderis. Immo in  
 reliquis fructuum generibus, quæ testam forinsecus  
 habent, si iuxta eundem modum fuerint culta. Palla-  
 dius si nucem tarentinam facere volueris, lixiuo per  
 annum continuū ter rigabis in mense, & habebis, dicit.  
 Alij arbores castigando, earum radicum summa præci-  
 dunt. Vel si dura nux & nodosa, cortex circumcidendus  
 erit, ut vitiū mali deducat humoris, ex Damageronte:  
 Cuius ratio est, quod sicut medullam tollendo, nucleos  
 interiores emendabamus, sic corticem incidendo, &  
 lancinando, corticem, vel putamina mollia reddimus,  
 respondet medulla ossi, ut cortex putamini. Idque alio  
 exemplo obseruauimus: nam persico supra amaram a-  
 mygdalam insito, erat cortex amarus, ut non nisi eo e-  
 mundato vesci possent. Hoc secreto in alijs utitur. Hanc  
 in nostro viridario consitam habemus corio tam fragi-  
 li, & membranaceo, ut vix attrectata, spoliū decidat,  
 & nuda remaneat. Florentinus

*Amygdalam sine putamine reddere*

sic tentat. Confracta nucis testa, internum nucleum il-  
 læsum conseruato, & ipsi lanam, aut recentia vitis, aut  
 platani folia circumdato, ne nudus expositus fructus à  
 formicis erodatur. Alio artificio docet Columella



*Auellanam nucem tarentinam facere,*

Inquiens: In qua scrobe destinaueris nuces ferere, in ea terram minutam pro modo semipedis ponito, ibique semen ferulæ depangito, quum ferula fuerit enata, eam findito, & in medulla eius sine putamine nucem græcam, aut auellanam abscondito, & ita adobruito, hoc ante Calendas Martias facito, vel inter Nonas, & Idus Martias. Alio quoque artificio efficitur, vt

*Cucurbita fructus sine intestinis seminibus ferat.*

Ex Quintiliorum doctrina. Cucurbita semen non alet, si primum sarmentum, vel virgultum cucurbitæ vbi increuerit, vitium more in terram defodias, vt solum eius caput exertum promineat, rursusq; quum adoleuerit, exaggeretur, sed danda est opera, vt quæ adnascuntur propagines, rescentur, tertio tantum relicto, ita enati fructus, siue cucurbitæ, siue cucumeres, sine intestinis seminibus erunt. Sine semine etiam nascuntur, si per triduum antea spargenda semina, oleo sesamino macerentur: ita quidem prolem seminibus orbam parient.

*Vt fructus diuersos colores adsciscant.*

## CAP. XIV.

TRACTABIMVS quomodo fructibus colores conciliemus. Ad hunc vnum effectum producendum multæ sunt viæ, vt insitiones nunquam satis memoratæ, & laudatæ, rigationes, & alia artificia. Ab insitionibus auspicemur: videlicet si velimus fructum aliquo colore insignitum producere, illum super arborem inseremus quæsitæ succi vberem, vt si velimus

*Mala fiant rubra.*

Inferantur mala in platanum, & rubra producet mala, ex Diophane, Didymo, & Palladio. Eodem modo

*Rhodacena rubicunda producere*

poterimus, si in eandem arborem rhodacena inseremus, ex Africano: nam ex ea rubicunda Rhodacena nascuntur. Ab eo Palladius rhodacena rubescere scribit, si platano inserta figantur. Si quæris

*Citris*

*almond  
brown*