



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Algebra

Barth, Friedrich

München, 1999

Aufgaben

[urn:nbn:de:hbz:466:1-83513](#)

$$\begin{array}{l}
 \text{I}'' - 45y + 41z = 63 \\
 \text{II}'' x + \frac{29}{9}z = 12 \\
 \hline
 \text{I}''' y = -\frac{7}{5} + \frac{41}{45}z \\
 \text{II}''' x = 12 - \frac{29}{9}z
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 \text{I}'' = \text{I}' \cdot 9 - \text{II}' \cdot 2 \\
 \text{II}'' = \text{II}' \cdot \frac{1}{9} \\
 \hline
 \text{I}''' = \text{I}'' \cdot (-\frac{1}{45}) \\
 \text{II}''' = \text{II}''
 \end{array}$$

Man kann also z willkürlich wählen; zu jedem Wert von z gibt es genau ein x und y . Das System hat somit unendlich viele Lösungen:

$$L = \{(x|y|z) | x = 12 - \frac{29}{9}z \wedge y = -\frac{7}{5} + \frac{41}{45}z \wedge z \in \mathbb{Q}\}.$$

Ist die Anzahl der Gleichungen kleiner als diejenige der Unbekannten, so hat das System im Allgemeinen unendlich viele Lösungen. Es kann aber auch der Fall eintreten, dass es unlösbar ist, wie z.B. das System

$$\begin{array}{l}
 \text{I } x + y + z = 1 \\
 \text{II } x + y + z = 2 .
 \end{array}$$

Aufgaben

1. $x = 7$

$$\begin{array}{l}
 3x + y = 22 \\
 -5x + 9y + z = -8
 \end{array}$$

2. $x - 3z = -8$

$$\begin{array}{l}
 3x - z = 0 \\
 x + y + z = 3
 \end{array}$$

3. $2x + z = 3$

$$\begin{array}{l}
 x - 6y - 2z = 14 \\
 5x + 4y + 3z = 5
 \end{array}$$

4. $x + y - z = 1$

$$\begin{array}{l}
 x - y - z = 0 \\
 x + 5y - z = 2
 \end{array}$$

5. $x - y + 2z = 11$

$$\begin{array}{l}
 x + y - 2z = -7 \\
 3x - 4y - 7z = 27
 \end{array}$$

6. $x + 2y + 5z = 50$

$$\begin{array}{l}
 3x - 7y + z = 10 \\
 13x + 4y - 3z = -30
 \end{array}$$

7. $-3x + 5y + z = 3$

$$\begin{array}{l}
 7x - 4y - z = 2 \\
 x + 6y + z = 8
 \end{array}$$

8. $2x + 4y - 11z = 6$

$$\begin{array}{l}
 9x - 7y + 5z = 2 \\
 12x - 26y + 43z = 0
 \end{array}$$

9. $2x - 3y + 5z = 0$

$$\begin{array}{l}
 3x + 5y - 2z = 0 \\
 5x - 2y + 3z = 0
 \end{array}$$

10. $x - y = 0$

$$\begin{array}{l}
 y - z = 0 \\
 z - x = 0
 \end{array}$$

11. $x - y - z = 1$

$$5x + 4y + z = -1$$

12. $7x + 3,75y - 1,5z = 9$

$$\frac{4}{3}x + \frac{5}{7}y - \frac{2}{7}z = \frac{4}{3}$$

13. $x + 2y = 1$

$$\begin{array}{l}
 4x - 3y = -29 \\
 3x + 17y = 36
 \end{array}$$

14. $8x - 11y = 3$

$$\begin{array}{l}
 13x + 5y = -18 \\
 2x - 9y = 10
 \end{array}$$

15. $x + y - z = -1$

$x - y - z = 3$

$2y + 3z - w = -3$

$-2x + 2z + 3w = -5$

16. $x + y - z + w = 0$

$x - y - z - w = 0$

$x + y + z - w = 5$

$x - y + z + w = 3$

17. $2x - y + 3z = -7$

$x + 4y - 2z = 8$

$3x + 2y + z = 0$

$6x - 3y + 4z = -11$

18. $3x + 4y - 5z + 5w = 13$

$5x - 3y + 4z - 19w = -10$

$2x - 5y + z - 2w = -11$

19. Zwei Beispiele aus der *Zahlenlehre* des DIOPHANT (um 250 n. Chr.):

a) $x + y = 20$

$y + z = 30$

$z + x = 40$

b) $x = y + \frac{1}{3}z$

$y = z + \frac{1}{3}x$

$z = 10 + \frac{1}{3}y$

20. Johannes BUTEO (1492–1564/72) löst in seiner *Logistica* (1559) folgende Aufgabe als Beispiel für das Additionsverfahren. Text und Ansatz lauten*:

Tres numeros inuenire, quorum pri-
mus cum triente reliquorum faciat 14. Se-
cundus cum aliorum quadrante 8. Tertius
item cum parte quinta reliquorum 8.

$1A + \frac{1}{3}B + \frac{1}{3}C = 14$

$1B + \frac{1}{4}A + \frac{1}{4}C = 8$

$1C + \frac{1}{5}A + \frac{1}{5}B = 8$

21. Das Problem der 100 Vögel erscheint zum ersten Mal im *Chang Ch'iu-chien Suan Ching* – »Arithmetisches Handbuch des CHANG Ch'iu-chien« – um 475 n. Chr.:

Ein Hahn kostet 5 sapeks, eine Henne 3 sapeks, und 3 Küken 1 sapek.
Wenn wir nun für 100 sapeks 100 dieser Tiere einkaufen, wie viele sind es dann von jeder Sorte?

22. Aufgabe 21 findet sich bei den Indern, den Arabern, in Byzanz und schließlich bei fast allen Mathematikern des Abendlandes in allen möglichen Variationen, auch mit 4 und 5 Arten von Vögeln oder anderem Getier. Ein Beispiel hierfür ist die nebenstehende Aufgabe aus dem *Rechenbuch auff Linien und Ziphren* (1574) des Adam RIES (1492–1559).**
Beachte: fl ist die Abkürzung für *Gulden*; *ort* bedeutet *ein Viertel*.



* Drei Zahlen zu finden, deren erste mit einem Drittel der übrigen 14 macht. Die zweite mit einem Viertel der anderen 8. Die dritte ebenso mit dem fünften Teil der übrigen 8.

** Ohne Bild steht sie bereits in der Erstauflage von 1522, der *Rechenung auff der linien vnd federn*.