

# **Algebra**

**Barth, Friedrich**

**München, 2002**

---


[urn:nbn:de:hbz:466:1-83986](https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:466:1-83986)

Barth · Federle · Haller

# Algebra

## 10

### Lösungen



Oldenbourg



# Algebra

## 10

Lösungen

Friedrich Barth · Reinhold Federle  
Rudolf Haller

Akademische Freiheit bedeutet:  
Es darf mehr gearbeitet werden,  
als verlangt wird.

Feodor LYNEN

Oldenbourg

## Inhalt

Lösungen	3
Anhang: Zwei Aufgaben zu den Logarithmen von BÜRGI und NAPIER samt Lösung	101
Lösungen der Aufgaben 111/15 bis 111/19 gemäß der Formulierung von Satz 108.2 ab der 4. Auflage von <i>Algebra 10</i>	110

A

11

## Bildnachweis:

Bayerische Staatsbibliothek, München: 105a); 106

13

A

15

Das Papier ist aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff  
hergestellt, ist säurefrei und recyclingfähig.

© 1997 Oldenbourg Schulbuchverlag GmbH, München  
[www.oldenbourg-schulbuchverlag.de](http://www.oldenbourg-schulbuchverlag.de)

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen  
Fällen bedarf deshalb der schriftlichen Einwilligung des Verlags.

3., verbesserte Auflage 2002  
Druck 06 05 04 03 02  
Die letzte Zahl bezeichnet das Jahr des Drucks.

Alle Drucke dieser Auflage sind untereinander unverändert  
und im Unterricht nebeneinander verwendbar.

Zeichnungen und Umschlag: Gert Krumbacher  
Gesamtherstellung: Tutte Druckerei GmbH, Salzweg-Passau

ISBN 3-486-03009-4

### Aufgaben zu 1.1

11/1. a)  $3,14 \cdot 10^6$       b)  $3,14 \cdot 10^9$       c)  $3,14 \cdot 10^2$       d)  $1,00 \cdot 10^7$   
 e)  $1,23 \cdot 10^{10}$       f)  $2,93 \cdot 10^9$       g)  $1,11 \cdot 10^7$       h)  $1,20 \cdot 10^{11}$   
 i)  $1,00 \cdot 10^2$

2. a)  $4,01 \cdot 10^7$  km      b)  $3,16 \cdot 10^7$  s      c)  $5,98 \cdot 10^{24}$  kg  
 d)  $5,10 \cdot 10^{14}$  m<sup>2</sup>      e)  $1,08 \cdot 10^{21}$  m<sup>3</sup>      f)  $4,50 \cdot 10^9$  a

3. a)  $2,0 \cdot 10^{10}$  a      b)  $5,5 \cdot 10^7$  km      c)  $3,0875 \cdot 10^{13}$  km  
 d)  $1,39 \cdot 10^9$  m      e) 1)  $10^{14}$  Mark      2)  $10^{29}$  Pengö

12/4. a) 3 Mio.      b) 21 Mio.      c) 320 Mio.  
 d) 5000 Mio.      e) 8 Millionen Mio.      f) 100000 Mio.

5. a) 10 Mio. m      b) 100000 Mio. m      c) 100000 Mio. m      d) 0,1 Mio. m

6.  $4 \cdot 10^{10}$  Sesterzen

13/7. a)  $7,61 \cdot 10^6$  a      b)  $7,61 \cdot 10^{21}$  a

8. a)  $10^7$  km = 0,07 AE.      33 s      b)  $10^{22}$  km =  $6,7 \cdot 10^{13}$  AE.       $10^9$  a

9.  $\approx 1,4$  Mio. Dollar. Der Übersetzer hat das englische *billion* mit Billion statt mit Milliarde übersetzt.

### Aufgaben zu 1.2

17/1. a)  $2^3 = 8$       b)  $3^5 = 243$       c)  $(2+5)^2 = 7^2 = 49$   
 $3^2 = 9$        $5^3 = 125$        $2^2 + 5^2 = 4 + 25 = 29$

d)  $(17 - 12)^2 = 5^2 = 25$       e)  $(3 \cdot 5)^2 = 15^2 = 225$   
 $17^2 - 12^2 = 289 - 144 = 145$        $3 \cdot 5^2 = 3 \cdot 25 = 75$

f)  $(12 : 4)^2 = 3^2 = 9$   
 $12 : 4^2 = 12 : 16 = \frac{12}{16} = \frac{3}{4}$

2. a)  $\frac{1}{64}$       b)  $\frac{4}{9}$       c)  $\frac{2401}{625}$       d)  $-\frac{1024}{243}$       e) 0,09  
 f) -0,027      g) 0,0081      h) 0,0009      i) -6,25      j) 0,0625

3. a) 1      b) -1      c) 1      d) 1  
 e) 1      f) -1      g) -1      h) 1  
 i) -1 und +1. Bei geraden Exponenten ergibt sich +1, bei ungeraden -1.

4. a)  $\frac{1}{12}$       b)  $-\frac{5}{48}$       c)  $\frac{5}{36}$       d)  $\frac{1}{144}$       e)  $\frac{25}{576}$       f)  $\frac{25}{288}$

5. a) 0,01      b) 100      c) -0,001      d) -1000  
 e) 0,0001      f) -0,000001      g) 10000      h) -1000000

17/6. a)  $-x^2$       b)  $x^3$       c)  $x^2$       d)  $x^3$       19/2

7. a)  $6^3$       b)  $(-6)^3$       c)  $0,6^3$       d)  $0,5^2$       e)  $(-0,5)^3$       2  
 f)  $(-\frac{1}{2})^3$       g)  $(-0,2)^3$       h)  $(\frac{7}{3})^3$       i)  $2^{10}$       j)  $3^{10}$

18/8. a)  $8 \cdot 10^8$       b)  $3 \cdot 10^{10}$       c)  $2,7 \cdot 10^{12}$       d)  $10^{16}$       e)  $4,4979 \cdot 10^{16}$       2

9. a)  $x^9$       b)  $x^8$       c)  $(a+b)^8$       d)  $-z^6$       e)  $(ab)^8$       f)  $(\frac{r}{s})^8$       2

10. a)  $2^6 = 64$ ;  $2^8 = 256$       b)  $2^6 = 64$ ;  $2^9 = 512$       2  
 c)  $3^6 = 729$ ;  $3^8 = 6561$       d)  $3^6 = 729$ ;  $3^9 = 19683$       2

11. a)  $x^6$ ;  $x^8$       b)  $x^6$ ;  $x^8$       c)  $x^6$ ;  $-x^9$       d)  $x^6$ ;  $-x^9$       2

12. a)  $x^3 y^3 z^3$       b)  $x^8 y^4$       c)  $y^{18} z^8$       2

13. a)  $8,1 \cdot 10^9$       b)  $3,375 \cdot 10^{21}$       c)  $-7,776 \cdot 10^{43}$       d)  $6,25 \cdot 10^{14}$       Auf  
21/1

14. a)  $8x^6$ ;  $256x^8$       b)  $2x^6$ ;  $2x^8$       c)  $4x^6$ ;  $-512x^9$       d)  $2x^6$ ;  $-2x^9$       2

15. a)  $\frac{a^2 b^2}{c^2}$       b)  $\frac{a^6}{b^3 c^3}$       c)  $\frac{a^{10} b^5}{c^{15}}$       22/2

d)  $\frac{a^2 + 2ab + b^2}{a^2 b^2}$       e)  $\frac{a^2}{c^4}$       f)  $\frac{1}{a^3 b^{20}}$       2

16. a)  $\frac{1}{a^2}$       b)  $a^2$       c) 1      d)  $\frac{1}{8}$       e) 81      f)  $\frac{64}{125}$       g)  $\frac{1}{49}$       h)  $\frac{1}{16}$       2

17. a)  $a^1$       für  $n = 1$       b)  $\frac{1}{a^3 - m}$       für  $m = 1; 2$       c)  $u^{m-n}$       für  $m > n$   
 1      für  $n = 2$       1      für  $m = 3$       1      für  $m = 1$   
 $\frac{1}{a^{n-2}}$       für  $n \geq 3$        $a^{m-3}$       für  $m \geq 4$        $\frac{1}{u^{n-m}}$       für  $m < n$       2

d)  $v^{n-m+2}$       für  $n+2 > m$       e)  $3^{n-3}$       für  $n > 3$       f)  $\frac{1}{3^{n-3}}$       für  $n > 3$       g)  
 1      für  $n+2 = m$       1      für  $n = 3$       1      für  $n = 3$   
 $\frac{1}{v^{m-n-2}}$       für  $n+2 < m$        $\frac{1}{3^{3-n}}$       für  $n = 1; 2$        $3^{3-n}$       für  $n = 1; 2$       2

18. a)  $2 \cdot 10^4$       b)  $4 \cdot 10^{13}$       c) und d) Gleitkommadarstellung mit  
positivem Exponenten der  
Zehnerpotenz nicht möglich.      Auf  
26/2  
27/2

19/19. a)  $2,3 \cdot 10^6$       b)  $2,85 \cdot 10^4$       c)  $-1,8 \cdot 10^7$       d)  $-9,09 \cdot 10^3$

20. a)  $\frac{1}{2^{3n-2}}$       b)  $-\frac{1}{2^{2n+1}}$       c)  $\frac{8a^9}{b^9}$       d)  $(-4)^k \frac{14xz^{k+1}}{5y^{k+2}}$

19/21. a)  $a^6 - 1$       b)  $a^8 - 1$       c)  $a^6 + b^3$       d)  $a^6 - b^6$

5) <sup>3</sup> 22. a)  $x^{12} - x^8 + 3x^6 - x^4 + 1$   
 b)  $a^{15}b^3 + 7a^{12}b^7 + 7a^9b^{11} - 17a^6b^{15} + 6a^3b^{19}$   
 c)  $36x^{12}y^4 + 6x^{10}y^7 - 32x^8y^{10} - x^6y^{13} + x^4y^{16}$

· 10<sup>1</sup> 23. a)  $a^6 + 15a^5 + 75a^4 + 125a^3$       b)  $x^{12} - 3x^8 + 3x^4 - 1$   
 D (s) c)  $x^{12} - 4x^9 + 6x^6 - 4x^3 + 1$       d)  $a^{12} + 3a^{10} + 6a^8 + 7a^6 + 6a^4 + 3a^2 + 1$

24. a) 63 235,29      b) 3,26      c) 1) 499      2) 19 714      3) 193

25.  $1,26 \cdot 10^{23}$  km

26. a) 7 Häuser, 49 Katzen, 343 Mäuse, 2401 Ähren, 16807 Scheffel      b) 19 607

### Aufgaben zu 1.3

21/1. a)  $x^2 - 2x + 6$       b)  $3x^2 - x + 8$       c)  $5a^3 - a^2 + 1$       d)  $1,2x^2 - 0,1x + 0,5$   
 9 e)  $6(7x - 1)$

2. a)  $x^2 + 2x + 3$       b)  $x^2 - 4$       c)  $8a^2 - a - 5$       d)  $3b^2 - 2b + 1$

22/3. a)  $x^3 - 1$       b)  $-x^3 + 2x + 5$       c)  $2(x^3 + 2x - 1)$       d)  $2x^4 + x^3 - x^2 + 2x$   
 e)  $-0,2x^3 + 0,3x^2 - 0,1x + 1$

4. a)  $ab + a + b + 1 = (a + 1)(b + 1)$       b)  $a - b + 2$       c)  $x^3 - 3ax^2 + 3a^2x + a^3$   
 h) d)  $abc(a + c - b)$       e)  $3x^2 + 2ax - a^2$

5. a)  $4x^2 - 4x + 1$       b)  $2x - 1$       c)  $x^2 - xy + y^2$       d)  $x^2 + xy + y^2$   
 n > e)  $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$       f)  $64x^6 + 32x^5 + 16x^4 + 8x^3 + 4x^2 + 2x + 1$   
 n = 1 g)  $0,004x^4 + 0,02x^2 + 0,1$

6. a)  $2x^2 + 2x - 5 - \frac{3x^2 - 10x + 4}{x^3 + 2x - 1}$       b)  $6 + \frac{8x^2 - 8x - 4}{2x^3 + 4x - 1}$

g) c)  $2x^3 + 4x + 10 + \frac{8x^2 + 40x + 60}{x^3 - 2x - 5}$       d)  $11x + 11 - \frac{41x + 77}{x^2 - 2x + 7}$

e)  $4x^2 - x - 1 + \frac{2}{2x + 1}$

### Aufgaben zu 2.1

26/1. a) 1      b) 1      c) 1      d) 1      e) 1      f) -1      g) 1      h) -1

27/2. a)  $\frac{1}{2}$       b)  $\frac{1}{8}$       c) 1      d)  $\frac{1}{25}$       e)  $\frac{3}{2}$       f) 100

g)  $\frac{1}{10}$       h)  $\frac{1}{100}$       i) -0,064      k) -15,625      l) 15,625      m) 0,064

n) 0,0625      o) 16      p) 16      q)  $\frac{16}{9}$       r) 1      s) 1

t)  $\frac{1}{2}$       u) 9      v) 1      w)  $\frac{1}{4}$       x)  $\frac{1}{81}$       y) 1      z) 2

- 27/3. a)  $\frac{7}{4}$       b) 7      c)  $\frac{9}{100}$       d) 0      e)  $\frac{5}{8}(3 - \sqrt{5})$       28/
- f) 1      g) 0      h)  $-\frac{1}{32}$       i) 0      k)  $\frac{9}{2}$
4. a)  $\{-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\}$       b)  $\{-1; 1\}$       c)  $\{-\frac{4}{3}; \frac{4}{3}\}$       d)  $\{\}$       e)  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$       f)  $\{-1\}$
5. a)  $\{2; 3\}$       b)  $\{-1; 3\}$       c)  $\{1\}$   
 d)  $\{1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2}\}$       e)  $\{-3; -2; 2; 3\}$       f)  $\{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$
6. a)  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$       b)  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$       c)  $]-1; 1[$   
 Auf  
 d)  $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$       e)  $\mathbb{R} \setminus \{-2; 0; 2\}$       f)  $\mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$       31/
7. a)  $10^{-2}$       b)  $10^{-4}$       c)  $10^{-5}$       d)  $10^0$   
 e)  $10^{-6}$       f)  $10^{-12}$       g)  $10^{-7}$       h)  $10^{-11}$
8. a)  $7 \cdot 10^{-2}$       b)  $1,23 \cdot 10^{-4}$       c)  $1,001 \cdot 10^{-5}$   
 d)  $4,207 \cdot 10^{-7}$       e)  $1,002 \cdot 10^{-4}$       f)  $7,39 \cdot 10^{-9}$   
 g)  $3 \cdot 10^{-3}$       h)  $4 \cdot 10^{-8}$       i)  $7 \cdot 10^{-13}$
9. a) 0,03      b) 0,002      c) 0,0001  
 d) 0,00805      e) 0,0000001763      f) 0,0972  
 g) 0,0000022279      h) 0,000067808      i) 0,000402
- 28/10. a) 1,0001      b) 2,3      c) 3,07      d) 3,64008      e) 2,305      f) 6,400  
 32/
11. a)  $x = -2, y = -4, a = 1,23, b = 12300$   
 b)  $x = -5, y = -6, z = -4, a = 0,101, b = 0,00101, c = 10,1$
12. a)  $\frac{1}{3}$       b)  $\frac{1}{32}$       c) 9      d)  $\frac{1}{288}\sqrt{6}$
13. a) 4      b)  $10^6$       c) 16      d) -512
14. a)  $5^{-2}$       b)  $2^{-2}$       c)  $7^{-3}$       d)  $20^{-3}$       e)  $10^{-5}$
15. a)  $\frac{1}{x^2}$       b)  $\frac{1}{y^3}$       c)  $\frac{1}{(x+y)^4}$       d)  $\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}$       e)  $\frac{1}{(a-b)^2}$       f)  $(a -$   
 g)  $\frac{a^2 b^2}{b^2 - a^2}$       h)  $\frac{b}{a}$       i)  $\frac{b^2}{a^2} = \left(\frac{b}{a}\right)^2$       j)  $-\frac{b^3}{a^3} = \left(-\frac{b}{a}\right)^3$       k)  $a$
16. a)  $\frac{m}{s}$       b)  $\frac{kg}{m^3}$       c)  $\frac{1}{s}$       d)  $\frac{N}{m^2}$       e)  $\frac{J}{s}$       f)  $\frac{V}{A}$
17.  $\frac{1}{2}(10^2 + 10^{-2}) = 50,005$   
 $\sqrt{10^2 \cdot 10^{-2}} = 1$   
 $\frac{2 \cdot 10^2 \cdot 10^{-2}}{10^2 + 10^{-2}} = \frac{200}{10001}$

28/18. a)  $\{-\frac{1}{4}; \frac{1}{4}\}$       b)  $\{-100; 100\}$       c)  $\{2\}$       d)  $\{-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\}$

19. a) -1      b) 0      c) 0      d) -2      e) -3      f) -4  
 $\{-1\}$       g) -2      h) 4      i) -3

20. a) 0      b) 1      c) 1      d) 0      e) 1      f) 2  
 $\{-\}$       g) -      h) -      i) 1      j) -      k) 0      l) -

### Aufgaben zu 2.2

31/1. a)  $2^3 = 8$       b)  $3^{-4} = \frac{1}{81}$       c)  $5^3 = 125$       d)  $2^6 = 64$       e) 6  
 f) 1      g)  $10^{-3} = \frac{1}{1000}$       h) 1000      i)  $(\frac{3}{5})^3 = \frac{27}{125}$   
 k)  $(\frac{1}{5})^{-5} \cdot 5^{-2} = 5^5 \cdot 5^{-2} = 5^3 = 125$

2. a)  $a^3$       b)  $a^2$       c)  $x^5$       d)  $y$       e)  $u^{3k}$   
 f) 1      g)  $(a+b)^2$       h)  $(xy)^{-4}$       i) 1

3. a)  $a + \frac{1}{a}$       b)  $a^{-3} + 2a^{-2} + a^{-1}$       c)  $x^{-4} - 1$   
 d)  $ab + a^{-1}b^{-2}$       e)  $\frac{y^2}{x^2} - \frac{x^2}{y^2}$       f)  $x + x^3y^2 - x^{-2}y^{-3} - y^{-1}$   
 g)  $8m^3 + 20m^2 + 30m^{-2} - 18m^{-5}$       h)  $x^2 + \frac{1}{x^3}$

6,400 32/4. a)  $400 \text{ nm} = 4 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 4 \cdot 10^5 \text{ pm} = 4 \cdot 10^{-1} \mu\text{m}$   
 b)  $3,7 \text{ pF} = 3,7 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 3,7 \cdot 10^3 \text{ fF} = 3,7 \cdot 10^{-3} \text{ nF}$   
 c)  $0,007 \mu\text{s} = 7 \cdot 10^{-6} \text{ ms} = 7 \text{ ns} = 7 \cdot 10^3 \text{ ps}$

5. a)  $7 \cdot 10^{-2} \text{ mm}; 7 \cdot 10^{-5} \text{ m}$       b)  $10^{-4} \text{ mm}; 10^{-7} \text{ m}$   
 c)  $10^{-6} \text{ nm}; 10^{-13} \text{ cm}$       d)  $10^{-1} \text{ nm}; 10^{-8} \text{ cm}$   
 e)  $5,896 \cdot 10^{-4} \text{ mm}; 5,896 \cdot 10^{-6} \text{ dm}$       f)  $9,1091 \cdot 10^{-28} \text{ g}; 9,1091 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$   
 g)  $1,67 \cdot 10^{-21} \text{ mg}; 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

6. a)  $3^{-6}$       b)  $3^{-6}$       c)  $3^{-6}$       d)  $3^{-6}$       e)  $3^3$       f)  $4^4$       g) 1      h) 1

7. a) 1      b)  $a$       c)  $a^{-6}$       d)  $a^{-3n}$       e)  $a^{n-n^2}$

8. a)  $x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}$       b)  $y^{-12} + 3y^{-8} + 3y^{-4} + 1$       c) 4

9. a)  $a^2 + 2a + 3 + 2a^{-1} + a^{-2}$       b)  $x^2 + 2x - 1 - 2x^{-1} - x^{-2}$   
 c)  $z^4 + 2z^2 + 3 + 2z^{-2} + z^{-4}$

10. a)  $\frac{a-b}{a+b}$       b)  $\left(\frac{3a-4}{3a+4}\right)^2$       11. a) 1      b) -1

12. a)  $6^4 = 1296$       b)  $\frac{1}{2500}$       c)  $\frac{4}{3}$       d)  $\frac{3}{4} \sqrt[3]{6}$

32/13. a)  $6^{-2} = \frac{1}{36}$

b) 1536

c)  $\frac{3}{4}$

d) 1

34/3

14. a)  $m^{-7}$

b)  $n^7$

c)  $p^{-1}q^{-3}$

d)  $\frac{(x+1)^5}{y^{10}}$

3

15. a) 32

b) 64

c)  $\frac{243}{32}$

d) 1

16. a)  $2x^{-4}$

b)  $\frac{1}{8}x + \frac{1}{20}$

c)  $\frac{1}{5}x^{-6} + \frac{1}{2}x^{-5}$

17. a)  $4x^2$

b)  $x^{-4}$

c)  $10x^{-1}$

18. a)  $z^{n-1}$

b) 1

c)  $z^{-n}$

19. a)  $\frac{1}{32}x$

b)  $x$

c)  $\frac{1}{81}$

33/20. a)  $\frac{b^4}{16a^{12}}$

b)  $\frac{z^9}{x^6y^3}$

c) 1

d)  $\frac{10a^4}{c^6}$

e)  $a^n b^n c^n$

f)  $a^{n-n^2} b^{n^2-1} c^{2-2n}$

g)  $8^{k+1} x^{1-k-2k^2} y^{3+2k-k^2}$

h)  $\frac{x^{2n}}{y^{n+2}}$

21. a)  $\frac{1}{x^{8n+1} y^{7m+16}}$

b)  $\frac{b^{13m+6}}{a^{10k-3} c^{5n}}$

22. a)  $\frac{(x+y)^2}{x^n y^n}$

b)  $\frac{(az-y)^2}{y^{m-1} z^n}$

23. a) falsch, da  $100^{-10} = 10^{-20} \neq 10^{-100}$

b) wahr

c) wahr

d) wahr

e) wahr

24. a)  $7,7 \cdot 10^{-7}$

b)  $1,5 \cdot 10^{-6}$

c)  $7,9 \cdot 10^{-2}$

d)  $10^{-5}$

25. a)  $9 \cdot 10^{-2}$

b)  $9 \cdot 10^{-4}$

c)  $\sqrt{4,41 \cdot 10^{-4} \cdot 1,44 \cdot 10^{-4}} = 2,1 \cdot 10^{-2} \cdot 1,2 \cdot 10^{-2} = 2,52 \cdot 10^{-4}$

d)  $4^{-2} = \frac{1}{16}$

e)  $10^{-50}$

f)  $100^{-5} = 10^{-10}$

26. 1

27.  $\left( \frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2} \right)^2$

28. 2a

29.  $2b(1+a)$

34/30. a) eine Eins, gefolgt von 100 Nullen

b) eine Eins, gefolgt von 10 Milliarden Nullen

c) eine Fünf, gefolgt von 100 Nullen

d) eine Drei, gefolgt von 98 Nullen, einer Zwei und einer Drei

e) 10 Milliarden Neuner

f) eine Eins, gefolgt von 999999999 Nullen

g) null Komma, dann 99 Nullen, an der hundertsten Stelle eine Eins

h) null Komma, dann 999999999 Nullen, an der zehnmilliardsten Stelle eine Ein

34/31. a)  $3,3426587 \cdot 10^{16}$

b)  $2,9916 \cdot 10^{-5} \text{ g}$

32. a)  $1\% = 10 \text{ g/kg}$        $1\% = 1 \text{ g/kg}$

$1 \text{ ppm} = 10^{-3} \text{ g/kg} = 1 \text{ mg/kg}$

$1 \text{ ppb} = 10^{-6} \text{ g/kg} = 1 \mu\text{g/kg}$

$1 \text{ ppt} = 10^{-9} \text{ g/kg} = 1 \text{ ng/kg}$

$1 \text{ ppq} = 10^{-12} \text{ g/kg} = 1 \text{ pg/kg}$

b)  $x :=$  Masse des Weizens

$1 \text{ ppt} \cdot x = 0,5 \text{ g} \Leftrightarrow x = 5 \cdot 10^5 \text{ t}$

$5 \cdot 10^5 \text{ t}$

Man benötigt  $\frac{5 \cdot 10^5 \text{ t}}{2500 \text{ t/Güterzug}} = 200$  Güterzüge.


c)  $300 \frac{\text{mg}}{\text{t}} = 300 \cdot \frac{10^{-9} \text{ t}}{\text{t}} = 3 \cdot 10^{-7} = 3 \cdot 10^5 \cdot 10^{-12} = 3 \cdot 10^5 \text{ ppt}$

1000 ppt Cd sind 3,3% des natürlichen Vorkommens.

„c“

33.

Ereignis	vor ... EA	vor ... h min sec	Uhrzeit h min sec	Winkel
Entstehung	1 EA	24.00.00	0.00.00	$0^\circ 00' 00''$
Algen	$4,4 \cdot 10^{-1} \text{ EA} = 4,4 \text{ dEA}$	5.20.00	6.40.00	$200^\circ 00' 00''$
Wirbeltiere	$3,1 \cdot 10^{-1} \text{ EA} = 3,1 \text{ dEA}$	3.44.00	8.16.00	$248^\circ 00' 00''$
Landpflanzen	$2,7 \cdot 10^{-1} \text{ EA} = 2,7 \text{ dEA}$	3.12.00	8.48.00	$264^\circ 00' 00''$
Saurier	$2,0 \cdot 10^{-1} \text{ EA} = 2,0 \text{ dEA}$	2.24.00	9.36.00	$288^\circ 00' 00''$
Säuger	$1,3 \cdot 10^{-1} \text{ EA} = 1,3 \text{ dEA}$	1.36.00	10.24.00	$312^\circ 00' 00''$
Alpen	$4,4 \cdot 10^{-2} \text{ EA} = 4,4 \text{ cEA}$	0.32.00	11.28.00	$344^\circ 00' 00''$
Olduvai	$1,3 \cdot 10^{-4} \text{ EA} = 13,3 \text{ mEA}$	0.00.05,76	11.59.54,24	$359^\circ 57' 07''$
Neandertaler	$2,9 \cdot 10^{-5} \text{ EA} = 28,8 \mu\text{EA}$	1,248 s	11.59.58,752	$359^\circ 59' 23''$
homo sapiens	$8,9 \cdot 10^{-6} \text{ EA} = 8,9 \mu\text{EA}$	384,0 ms	11.59.59,616	$359^\circ 59' 48''$
Lascaux	$4,2 \cdot 10^{-6} \text{ EA} = 4,2 \mu\text{EA}$	182,4 ms	11.59.59,8176	$359^\circ 59' 55''$
Mammut	$3,3 \cdot 10^{-6} \text{ EA} = 3,3 \mu\text{EA}$	144,0 ms	11.59.59,8560	$359^\circ 59' 56''$
Jericho	$1,8 \cdot 10^{-6} \text{ EA} = 1,8 \mu\text{EA}$	76,8 ms	11.59.59,9232	$359^\circ 59' 57,70''$
Hochkulturen	$1,1 \cdot 10^{-6} \text{ EA} = 1,1 \mu\text{EA}$	48,0 ms	11.59.59,9520	$359^\circ 59' 58,56''$
Christi Geburt	$4,4 \cdot 10^{-7} \text{ EA} = 444 \text{ nEA}$	19,2 ms	11.59.59,9808	$359^\circ 59' 59,42''$
Physik	$7,7 \cdot 10^{-8} \text{ EA} = 77 \text{ nEA}$	3,36 ms	11.59.59,99664	$359^\circ 59' 59,90''$



ne Ein

### Aufgaben zu 3.1

- 46/1. a) 9      b) 3      c) 5      d) 0,5      e) 0,6      f) 0,5  
 g) 5      h) 0      i)  $\frac{2}{3}$
2. a)  $10^2$       b) 10      c) 8      d)  $10^{-2}$       e)  $\frac{1}{4}$       f) 1  
 g) 40      h) 7      i) 50      k) 0,2      l) 0,2      m)  $3,4 \cdot 10^4$
3. a)  $a^2$       b)  $b^2$       c)  $3a^2$       d)  $|a|$       e)  $|b|^3$       f)  $|a^{-3}|$
4. a)  $a \geq 0$ ;  $a$       b)  $a \leq 0$ ;  $-a$       c)  $a \leq 0$ ;  $-a$   
 d)  $a \leq 0$ ;  $2a^3$       e)  $a \neq 0$ ;  $2a^{-2}$       f)  $a > b$ ;  $\frac{1}{a-b}$
5. a)  $\{2\}$       b)  $\{ \}$       c)  $\{ \}$       d)  $\{a^2\}$       e)  $\{ \}$       f)  $\{a^{-2}\}$
6. a)  $[2,4; 2,5]$       b)  $[4,6; 4,7]$       c)  $[2,6; 2,7]$   
 d)  $[0,3; 0,4]$       e)  $[0; 0,1]$       f)  $[1,1; 1,2]$
7. a)  $[1; 2], [1; 1,5], [1,25; 1,5], [1,25; 1,375], [1,25; 1,3125], [1,25; 1,28125],$   
 $[1,25; 1,265625], [1,2578125; 1,265625], [1,2578125; 1,26171875],$   
 $[1,259765625; 1,26171875], [1,259765625; 1,2607421875]$

Die Zehntelstelle der Lösung ist gesichert, also  $x = 1,2 \dots$

b) 1)  $a:x = x:y \Leftrightarrow ay = x^2$       2)  $a:x = y:2a \Leftrightarrow xy = 2a^2$   $\Rightarrow x \cdot \frac{x^2}{a} = 2a^2 \Leftrightarrow x^3 = 2a^3$

2)  $y^3 = 4a^3$

Ein Würfel mit der Kantenlänge  $y$  hat das vierfache Volumen.

c) 1)  $a:x = x:y \Leftrightarrow y = \frac{1}{a}x^2$       (I)

$x:y = y:b \Leftrightarrow x = \frac{1}{b}y^2$       (II)

2) Für  $a = 1$  und  $b = 2$  ergibt sich

(I)  $y = x^2$  und (II)  $x = \frac{1}{2}y^2$ .


Zur Wertetabelle für  $x = \frac{1}{2}y^2$ : Man geht von  $y$ -Werten aus und bestimmt die zugehörige  $x$ .

$$y = x^2$$

x	y
0,9	0,81
0,95	0,9025
1	1
1,05	1,1025
1,1	1,21
1,15	1,3225
1,2	1,44
1,25	1,5625
1,3	1,69
1,35	1,8225

$$x = \frac{1}{2}y^2$$

y	x
0,8	0,32
0,9	0,405
1	0,5
1,1	0,605
1,2	0,72
1,3	0,845
1,4	0,98
1,5	1,125
1,6	1,28
1,7	1,445



d) Beweis des ERATOSTHENES:

Mehrfaache Anwendung der Strahlensätze auf die Strahlen [ZB und [ZC.

1. Teil:

- I     $BC \parallel YD \Rightarrow \overline{ZC} : \overline{ZD} = \overline{ZB} : \overline{ZY}$   
 II    $BD \parallel YE' \Rightarrow \overline{ZB} : \overline{ZY} = \overline{ZD} : \overline{ZE'}$   
 III    $BC \parallel YD \Rightarrow \overline{ZC} : \overline{ZD} = \overline{BC} : \overline{YD}$   
 IV    $YD \parallel XE' \Rightarrow \overline{ZD} : \overline{ZE'} = \overline{YD} : \overline{XE'}$

---

Also  $\overline{BC} : \overline{YD} \stackrel{\text{III}}{=} \overline{ZC} : \overline{ZD} =$   
 $\stackrel{\text{I}}{=} \overline{ZB} : \overline{ZY} =$   
 $\stackrel{\text{II}}{=} \overline{ZD} : \overline{ZE'} \stackrel{\text{IV}}{=} \overline{YD} : \overline{XE'}$ .

Das heißt,  $b : y = y : x$ .      (\*)

Nicht ausgeführt ist bei ERATOSTHENES der

2. Teil:

- I     $YD \parallel XE' \Rightarrow \overline{ZD} : \overline{ZE'} = \overline{ZY} : \overline{ZX}$   
 II    $YE' \parallel XF'' \Rightarrow \overline{ZY} : \overline{ZX} = \overline{ZE'} : \overline{ZF''}$   
 III    $YD \parallel XE' \Rightarrow \overline{ZD} : \overline{ZE'} = \overline{YD} : \overline{XE'}$   
 IV    $XE' \parallel AF'' \Rightarrow \overline{ZE'} : \overline{ZF''} = \overline{XE'} : \overline{AF''}$

---

Also  $\overline{YD} : \overline{XE'} \stackrel{\text{III}}{=} \overline{ZD} : \overline{ZE'} =$   
 $\stackrel{\text{I}}{=} \overline{ZY} : \overline{ZX} =$   
 $\stackrel{\text{II}}{=} \overline{ZE'} : \overline{ZF''} \stackrel{\text{IV}}{=} \overline{XE'} : \overline{AF''}$ .

Das heißt,  $y : x = x : a$ .      (\*\*)

(\*) und (\*\*) ergeben       $b : y = y : x = x : a$   
 oder       $a : x = x : y = y : b$ ,      q.e.d.

### Aufgaben zu 3.2

- 50/1. a) 2      b) 4      c) 5      d) 7      e) 6  
 f) 9      g) 8      h) 10      i) 1      k) 2  
 l) 2      m) 0      n) 3      o) 10      p) 2
- 54/2  
 2. a)  $\frac{1}{3}$       b)  $\frac{2}{5}$       c)  $\frac{3}{4}$       d)  $\frac{17}{18}$       e)  $\frac{1}{3}$   
 f) 0,5      g) 0,2      h) 0,5      i) 0,1      k) 0,5
3. a) -37      b) -6
4. a) 5      b) 3      c) 121      d) 8      e) 343
5. a)  $c$       b)  $3a^2$       c)  $a^{n-1}$       d)  $a^2b^2$       e)  $a^{n+1}$
6. a)  $a \geq 0$       b)  $a > 0$       c)  $a \in \mathbb{R}$       d)  $a \geq 0$       e)  $a \in \mathbb{R} \wedge b > 0$   
 f)  $(a \geq 0 \wedge b \geq 0) \vee (a \leq 0 \wedge b \leq 0)$   
 g) 1. Fall:  $n$  gerade  $\Rightarrow n+3$  ungerade:  $(a > 0 \wedge b \geq 0) \vee (a < 0 \wedge b \leq 0)$   
 2. Fall:  $n$  ungerade  $\Rightarrow n+3$  gerade:  $a > 0 \wedge b \in \mathbb{R}$   
 h)  $a > 0$   
 i) 1. Fall:  $n$  gerade:  $a \geq 0 \wedge b \in \mathbb{R}$   
 2. Fall:  $n = 1$ :  $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \wedge b \geq 0$   
 3. Fall:  $n$  ungerade  $\wedge n \neq 1$ :  $a \in \mathbb{R} \wedge b \geq 0$   
 k)  $(a \geq 0 \wedge b > 0) \vee (a \leq 0 \wedge b < 0)$
7. a) 1      b) 10      c)  $|a| - |b|$       d)  $a^2 + |a^3b| - |a^3b^5|$
8. a) 144      b) 1      c) 0,15      d) 1,5      e) 1,5  
 f)  $2 \cdot 10^{-2} \cdot 0,5^{-1} \cdot 3 = 0,12$
- 51/9. a) 3      b) 3      c)  $\frac{1}{3}$       d) 3      e) nicht definiert      f) nicht definiert  
 g) 3      h)  $\frac{1}{3}$       i) 1      j) 1      k) nicht definiert  
 l) 10      m)  $\frac{4}{9}$       n)  $\frac{4}{9}$       o)  $\frac{9}{25}$       p) nicht definiert
10. a)  $2 = \sqrt[3]{8}$       b) -2      c) -5;  $5 = \sqrt[4]{625}$       d)  $\{\}$   
 e)  $0 = \sqrt[7]{0}$       f) -5      g)  $4 = \sqrt[5]{2^{10}}$       h)  $4 = \sqrt[7]{0,5^{-14}}$

### Aufgaben zu 3.3

54/1. a)  $\sqrt[3]{2} = \frac{a}{b}$ ;  $a, b \in \mathbb{N} \Rightarrow 2 \cdot b^3 = a^3$

Die LS enthält  $(3k+1)$ -mal den Faktor 2, die RS hingegen  $3k'$ -mal,  $(k, k' \in \mathbb{N}_0$ ).  
 Widerspruch.

b)  $\sqrt[5]{p} = \frac{a}{b}; \quad p \text{ prim}; \quad a, b \in \mathbb{N} \Rightarrow p \cdot b^5 = a^5$

Die LS enthält  $(5k+1)$ -mal den Primfaktor  $p$ , die RS hingegen  $5k'$ -mal,  $(k, k' \in \mathbb{N}_0)$ ; Widerspruch.

$$\begin{array}{ll} 54/2. \quad \text{a) } d := N - a^3 = & d' = a'^3 - N = \\ & = a^3 - a^3 = \\ & = (x-a)^3 + 3x^2a - 3a^2x = \\ & = (x-a)^3 + 3ax(x-a) = \\ & = \xi^3 + 3ax\xi \end{array} \quad \begin{array}{l} \\ \\ = a'^3 - x^3 = \\ = (a'-x)^3 + 3a'^2x - 3a'x = \\ = (a'-x)^3 + 3a'x(a'-x) = \\ = \xi'^3 + 3a'x\xi' \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{b) } a'd = 3a'ax\xi & \text{I} \\ ad' = 3a'ax\xi' & \text{II} \end{array}$$


---


$$a'd + ad' = 3a'ax(\xi + \xi') \quad \text{III}$$

Damit erhält man aus I:III

$$\frac{\xi}{\xi + \xi'} = \frac{a'd}{a'd + ad'}.$$

Unter Benützung von  $a' - a = \xi + \xi'$  ergibt sich

$$x = a + \xi = a + \frac{\xi}{\xi + \xi'} (a' - a) = a + \frac{a'd}{a'd + ad'} (a' - a).$$

c)  $a = 4; \quad a' = 5$   
 $d = 36; \quad d' = 25$   
 $x = 4 + \frac{5 \cdot 36}{5 \cdot 36 + 4 \cdot 25} = 4\frac{4}{19} \approx 4,2105 \quad \text{relativer Fehler} = -9,2\%$

d) 1)  $a = 1; \quad a' = 2$   
 $d = 1; \quad d' = 6$   
 $x = 1 + \frac{2 \cdot 1}{2 \cdot 1 + 1 \cdot 6} = 1\frac{1}{4} = 1,25 \quad \text{relativer Fehler} = -7,87\%$

2)  $a = 4; \quad a' = 5$   
 $d = 1; \quad d' = 60$   
 $x = 4 + \frac{5 \cdot 1}{5 \cdot 1 + 4 \cdot 60} = 4\frac{1}{49} \approx 4,020408 \quad \text{relativer Fehler} = -7,90 \cdot 10^{-5}$

3)  $a = 4; \quad a' = 5$   
 $d = 56; \quad d' = 5$   
 $x = 4 + \frac{5 \cdot 56}{5 \cdot 56 + 4 \cdot 5} = 4\frac{19}{20} = 4,95 \quad \text{relativer Fehler} = 3,56\%$

4)  $a = 6; \quad a' = 7$   
 $d = 114; \quad d' = 13$   
 $x = 6 + \frac{7 \cdot 114}{7 \cdot 114 + 6 \cdot 13} = 6\frac{798}{967} \approx 6,825223 \quad \text{relativer Fehler} = -1,23\%$

e) 1)  $a = 0; \quad a' = 1$

$d = 0,8; \quad d' = 0,2$

$$x = 0 + \frac{1 \cdot 0,8}{1 \cdot 0,8 + 0 \cdot 0,2} = 1$$

relativer Fehler = 7,7%

Achtung: Mit  $a = 0$  und  $a' = 1$  erhält man für alle Zahlen aus  $]0; 1[$  den Näherungswert 1.

2)  $a = 0,8; \quad a' = 1$

$d = 0,288; \quad d' = 0,2$

$$x = 0,8 + \frac{1 \cdot 0,288}{0,288 + 0,8 \cdot 0,2} \cdot 0,2 = \frac{101}{70} \approx 1,44285$$

relativer Fehler = 55,4%

55/3. a)  $\sqrt[n]{1+\alpha} = 1 + \xi$

$$1 + \alpha = (1 + \xi)^n$$

$$1 + \alpha = 1 + n\xi + \dots$$

$$\frac{\alpha}{n} \approx \xi$$

b)  $\sqrt[n]{N} = \sqrt[n]{a^n + b} = \sqrt[n]{a^n \left(1 + \frac{b}{a^n}\right)} = a \sqrt[n]{1 + \frac{b}{a^n}} \approx a \left(1 + \frac{b}{na^n}\right) = a + \frac{b}{na^{n-1}}$

c) 1)  $\sqrt[3]{11} = \sqrt[3]{8+3} \approx 2 + \frac{3}{3 \cdot 4} = 2\frac{1}{4}$

$$\sqrt[3]{24} = \sqrt[3]{8+16} \approx 2 + \frac{16}{3 \cdot 4} = 3\frac{1}{3}$$

2)  $\sqrt[3]{24} = \sqrt[3]{27-3} \approx 3 - \frac{3}{3 \cdot 9} = 2\frac{8}{9}$

d) 1)  $\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{1+1} \approx 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \approx 1,33$

2)  $\sqrt[3]{65} = \sqrt[3]{64+1} \approx 4 + \frac{1}{3 \cdot 16} = 4\frac{1}{48} \approx 4,02$

3)  $\sqrt[3]{100} = \sqrt[3]{64+36} \approx 4 + \frac{36}{3 \cdot 16} = 4\frac{3}{4} = 4,75$

4)  $\sqrt[3]{120} = \sqrt[3]{125-5} \approx 5 - \frac{5}{3 \cdot 25} = 4\frac{14}{15} \approx 4,93$

5)  $\sqrt[3]{330} = \sqrt[3]{343-13} = 7 - \frac{13}{3 \cdot 49} = 6\frac{134}{147} \approx 6,91$

6)  $\sqrt[3]{0,8} = \sqrt[3]{1-0,2} = 1 - \frac{2}{30} = \frac{14}{15} \approx 0,933$

e) 1)  $\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{(\frac{4}{3})^3 - \frac{10}{27}} \approx \frac{4}{3} - \frac{\frac{10}{27}}{3 \cdot \frac{16}{9}} = \frac{91}{72} \approx 1,2638$

2)  $\sqrt[3]{65} = \sqrt[3]{(\frac{193}{48})^3 - \frac{577}{110592}} \approx \frac{193}{48} - \frac{577}{5363856} = 4 \frac{55585}{2681928} \approx 4,0207$

3)  $\sqrt[3]{100} = \sqrt[3]{(\frac{19}{4})^3 - \frac{459}{64}} \approx \frac{19}{4} - \frac{153}{1444} = 4 \frac{930}{1444} \approx 4,6440$

den 4)  $\sqrt[3]{120} = \sqrt[3]{(\frac{74}{15})^3 - \frac{224}{3375}} \approx \frac{74}{15} - \frac{56}{61605} = 4 \frac{57442}{61605} \approx 4,9324$

5)  $\sqrt[3]{330} = \sqrt[3]{(\frac{1016}{147})^3 - \frac{519506}{3176523}} \approx \frac{1016}{147} - \frac{259753}{227612448} = 6 \frac{207483456}{227612448} \approx 6,9115$

6)  $\sqrt[3]{0,8} = \sqrt[3]{(\frac{14}{15})^3 - \frac{44}{3375}} \approx \frac{14}{15} - \frac{11}{2205} = \frac{2047}{2205} \approx 0,92834$

f)  $x_{k+1} = x_k + \frac{b}{3x_k^2} \wedge \sqrt[3]{x_k^3 + b} = \sqrt[3]{N}$

$$x_{k+1} = \frac{3x_k^3 + b}{3x_k^2} \wedge b = N - x_k^3$$

$$x_{k+1} = \frac{N + 2x_k^3}{3x_k^2}$$

Wurzeln aus c):

$\sqrt[3]{11}$ : 2;  $2\frac{1}{4}$ ; 2,2242...; 2,223980132...

$$\sqrt[3]{11} = 2,22398009$$

relativer Fehler =  $1,9 \cdot 10^{-8}$

$\sqrt[3]{24}$ : 3;  $2\bar{8}$ ; 2,88450581...; 2,884499142...

$$\sqrt[3]{24} = 2,88449914$$

relativer Fehler =  $7,6 \cdot 10^{-10}$

Wurzeln aus d):

1) 1;  $\frac{4}{3}$ ; 1,2638; 1,259933491...

$$\sqrt[3]{2} = 1,25992105$$

relativer Fehler =  $9,87 \cdot 10^{-6}$

2) 4; 4,02083; 4,02072...; 4,020725759...

$$\sqrt[3]{65} = 4,02072576$$

relativer Fehler =  $-2,48 \cdot 10^{-10}$

3) 4; 4,75; 4,644044...; 4,641590143...

$$\sqrt[3]{100} = 4,64158883$$

relativer Fehler =  $2,83 \cdot 10^{-7}$

4) 5; 4,93...; 4,9324243...; 4,932424162...

$$\sqrt[3]{120} = 4,93242415$$

relativer Fehler =  $2,55 \cdot 10^{-9}$

5) 7; 6,9115...; 6,9104...; 6,910423228...

$$\sqrt[3]{330} = 6,91042323$$

relativer Fehler =  $-1,59 \cdot 10^{-10}$

6) 1; 0,93; 0,9283...; 0,92831776...

$$\sqrt[3]{0,8} = 0,92831776$$

relativer Fehler =  $7,97 \cdot 10^{-10}$

noch

$$55/3. \quad \text{g) 1)} \sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{1+1} \approx 1 + \frac{1}{4 \cdot 1} = 1\frac{1}{4} = 1,25$$

$$2) \sqrt[4]{65} = \sqrt[4]{2^4 + 49} \approx 2 + \frac{49}{4 \cdot 8} = 3\frac{17}{32} = 3,53125$$

$$3) \sqrt[4]{65} = \sqrt[4]{3^4 - 16} \approx 3 - \frac{16}{4 \cdot 27} = 2\frac{23}{27} = 2,\overline{851}$$

$$4) \sqrt[4]{100} = \sqrt[4]{3^4 + 19} \approx 3 + \frac{19}{4 \cdot 27} = 3\frac{19}{108} = 3,17\overline{592}$$

$$5) \sqrt[4]{5000} = \sqrt[4]{8^4 + 904} \approx 8 + \frac{904}{4 \cdot 512} = 8\frac{113}{256} = 8,4414\dots$$

$$6) \sqrt[4]{0,8} = \sqrt[4]{1-0,2} \approx 1 - \frac{0,2}{4 \cdot 1} = 0,95$$

$$\text{h) 1)} \sqrt[5]{2} = \sqrt[5]{1+1} \approx 1 + \frac{1}{5 \cdot 1} = 1,2$$

$$2) \sqrt[5]{65} = \sqrt[5]{2^5 + 33} \approx 2 + \frac{33}{5 \cdot 16} = 2\frac{33}{80} = 2,4125$$

$$3) \sqrt[5]{100} = \sqrt[5]{2^5 + 68} \approx 2 + \frac{68}{5 \cdot 16} = 2\frac{17}{20} = 2,85$$

$$4) \sqrt[5]{5000} = \sqrt[5]{5^5 + 1875} \approx 5 + \frac{1875}{5 \cdot 625} = 5\frac{3}{5} = 5,6$$

$$5) \sqrt[5]{0,8} = \sqrt[5]{1-0,2} \approx 1 - \frac{0,2}{5 \cdot 1} = 0,96$$

$$\text{i) 1)} \sqrt[7]{2} = \sqrt[7]{1+1} \approx 1 + \frac{1}{7 \cdot 1} = 1\frac{1}{7} = 1,\overline{142857}$$

$$2) \sqrt[7]{65} = \sqrt[7]{2^7 - 63} \approx 2 - \frac{63}{7 \cdot 64} = 1\frac{55}{64} = 1,859375$$

$$3) \sqrt[7]{100} = \sqrt[7]{2^7 - 28} \approx 2 - \frac{28}{7 \cdot 64} = 1\frac{15}{16} = 1,9375$$

$$4) \sqrt[7]{5000} = \sqrt[7]{3^7 + 2813} \approx 3 + \frac{2813}{7 \cdot 729} = 3\frac{2813}{5103} = 3,5512\dots$$

$$5) \sqrt[7]{0,8} = \sqrt[7]{1-0,2} \approx 1 - \frac{0,2}{7} = \frac{34}{35} = 0,97\overline{142857}$$

$$\text{j) 1)} \sqrt[11]{2} = \sqrt[11]{1+1} \approx 1 + \frac{1}{11} = 1\frac{1}{11} = 1,\overline{09}$$

$$2) \sqrt[11]{65} = \sqrt[11]{1+64} \approx 1 + \frac{64}{11 \cdot 1} = 6\frac{9}{11} = 6,\overline{81}$$

$$3) \sqrt[11]{100} = \sqrt[11]{1+99} \approx 1 + \frac{99}{11} = 10$$

$$4) \sqrt[11]{5000} = \sqrt[11]{2 + 2952} \approx 2 + \frac{2952}{11 \cdot 1024} = 2 \frac{369}{1408} \approx 2,26207\dots$$

$$5) \sqrt[11]{0,8} = \sqrt[11]{1 - 0,2} \approx 1 - \frac{0,2}{11} = \frac{54}{55} = 0,981$$

$$k) x_{k+1} = x_k + \frac{b}{nx_k^{n-1}} \wedge \sqrt[n]{x_k^n + b} = \sqrt[n]{N}$$

$$x_{k+1} = x_k + \frac{b}{nx_k^{n-1}} \wedge b = N - x_k^n$$

$$x_{k+1} = \frac{N + (n-1)x_k^n}{nx_k^{n-1}}$$

$$l) 1) \sqrt[4]{2}: 1; 1,25; 1,1935; 1,1892302\dots; 1,1892071\dots$$

$$\sqrt[4]{65}: 3; 2,851; 2,839426\dots; 2,8394115\dots$$

$$\sqrt[4]{100}: 3; 3,17\overline{592}; 3,1623654\dots; 3,1622777\dots$$

$$\sqrt[4]{5000}: 8; 8,4414062\dots; 8,4091507\dots; 8,4089642\dots$$

$$\sqrt[4]{0,8}: 1; 0,95; 0,9457702\dots; 0,9457416\dots$$

$$2) \sqrt[5]{2}: 1; 1,2; 1,1529012\dots; 1,1487289\dots; 1,1486984\dots$$

$$\sqrt[5]{65}: 2; 2,4125; 2,3137727\dots; 2,3046051\dots; 2,3045316\dots$$

$$\sqrt[5]{100}: 2; 2,85; 2,5831451\dots; 2,5157109\dots; 2,511898\dots; 2,5118864\dots$$

$$\sqrt[5]{5000}: 5; 5,6; 5,4968289\dots; 5,4928086\dots; 5,4928027\dots$$

$$\sqrt[5]{0,8}: 1; 0,96; 0,9563801\dots; 0,9563525\dots$$

$$3) \sqrt[7]{2}: 1; 1,\overline{142857}; 1,1078191\dots; 1,104127\dots; 1,1040895\dots$$

$$\sqrt[7]{65}: 2; 1,859375; 1,8184553\dots; 1,8154786\dots; 1,8154639\dots$$

$$\sqrt[7]{100}: 2; 1,9375; 1,930769\dots; 1,9306977\dots$$

$$\sqrt[7]{5000}: 3; 3,5512444\dots; 3,4000374\dots; 3,3766666\dots; 3,3761701\dots; 3,3761698\dots$$

$$\sqrt[7]{0,8}: 1; 0,97\overline{142857}; 0,9686492\dots; 0,9686251\dots$$

$$4) \sqrt[11]{2}: 1; 1,\overline{09}; 1,0678999\dots; 1,065079\dots; 1,0650411\dots$$

$$\sqrt[11]{65}: 1; 6,\overline{81}; 6,1983471\dots; 5,6348611\dots; 5,1226012\dots; 4,6569106\dots; 4,2335563\dots; 3,8486908\dots; 3,4988181\dots; 3,1807652\dots; 2,8916605\dots; 2,6289268\dots; 2,3903082\dots; 2,1739779\dots; 1,9788495\dots; 1,8053720\dots; 1,6573113\dots; 1,5444456\dots; 1,4805649\dots; 1,4627152\dots; 1,4615434\dots; 1,4615387\dots$$

$$\sqrt[11]{100}: 1; 10; 9,\overline{09}; 8,2644628\dots; 7,513148\dots; 6,8301346\dots;$$

6,2092133...; 5,6447394...; 5,1315816...; 4,6650749...; Aufgaben  
 4,2409790...; 3,8554403...; 3,5049583...; 3,1863582...; 60/1  
 2,8967735...; 2,6336490...; 2,3947926...; 2,1785495...;  
 1,9842747...; 1,8134931...; 1,6722593...; 1,5733940...;  
 1,5281342...; 1,5201288...; 1,5199112...; 1,5199111... 2

$\sqrt[11]{5000}$ : 2; 2,2620739...; 2,1860023...; 2,1696943...;  
 2,1690531...; 2,1690522... 3

$\sqrt[11]{0,8}$ : 1; 0,981; 0,9799369...; 0,9799186... 4

57/4. a)  $\sqrt{6765201} = 2601$  4

$$\begin{array}{r}
 -4 \\
 \hline
 276 \\
 -276 \quad 46 \cdot 6 \\
 \hline
 52 \\
 -0 \quad 520 \cdot 0 \\
 \hline
 5201 \quad 5201 \cdot 1
 \end{array}$$

b) 2)  $10^3 = 1000$ ;  $100^3 = 1000000$ ; also 2 Stellen vor dem Komma. 5

Startwert: 60

60; 62,067407...; 62,000073...; 62

3) Radikand =  $9,16 \dots \cdot 10^8$ ; Wurzelwert 2stellig. 6

Startwert: 60

60; 62,137852234...; 62,00061038...; 61,99999999... = 62 7

4) Radikand =  $3,521 \dots \cdot 10^{12}$ ; Wurzelwert 2stellig. 61/8

Startwert: 60

60; 62,211489...; 62,002145...; 62

5) Radikand =  $4,594 \dots \cdot 10^{16}$ ; Wurzelwert 3stellig. 61/8

Startwert: 100

100; 144,93716...; 131,095...; 123,3397...;  
 121,14958...; 121,00064...; 121

57/5. 1) Radikand =  $4,7 \dots \cdot 10^7$ ; Wurzelwert 2stellig. 7

Startwert: 80

80; 83,173008...; 83,000539...; 83

2) Radikand =  $2,8 \dots \cdot 10^{20}$ ; Wurzelwert 3stellig. 7

Startwert: 800

800; 838,65545...; 834,07681...; 834,00002...; 834

3) Radikand =  $7,516 \dots \cdot 10^{18}$ ; Wurzelwert 2stellig. 7

Startwert: 50

50; 52,452064...; 52,018986...; 52,000035...; 52

Aufgaben zu 3.4

- 60/1. a) 2      b)  $\frac{1}{3}$       c)  $\frac{1}{8}$       d) 4      e) 2  
 f)  $\frac{1}{5}$       g) 3      h) 2      i)  $\frac{1}{7}$       k) 2
2. a)  $\frac{1}{2}$       b) 5      c)  $\frac{2}{3}$       d)  $\frac{1}{2}$       e)  $\frac{5}{3}$   
 f) 2      g)  $\frac{5}{2}$       h) 0,3      i)  $\frac{2}{3}$       k)  $\frac{3}{2}$
3. a) 4      b)  $\frac{1}{27}$       c) 81      d) 8      e)  $\frac{1}{3125}$   
 f) 32      g)  $\frac{1}{27}$       h) 100 000      i)  $\frac{1}{100}$       k) 128
4. a)  $\frac{8}{125}$       b)  $\frac{9}{25}$       c) 0,01024      d)  $\frac{64}{25}$       e) 6,25  
 f) 1000      g) 0,2401      h) 0,000 001      i) 125      k)  $\frac{243}{32}$
5. a) 7      b)  $\frac{1}{2}$       c) 3      d)  $\frac{1}{2}$       e) 125  
 f) 2      g)  $\frac{1}{81}$       h)  $\frac{1}{125}$       i) 512      k)  $\frac{1}{128}$
6. a)  $2^{-6} = \frac{1}{64}$  bzw.  $2^{-8} = \frac{1}{256}$       b)  $2^{-6} = \frac{1}{64}$  bzw.  $2^{-9} = \frac{1}{512}$   
 c)  $3^{-4} = \frac{1}{81}$  bzw.  $3^{-4} = \frac{1}{81}$       d)  $2^{-6} = \frac{1}{64}$  bzw.  $2^{\frac{1}{8}} = \sqrt[8]{2}$   
 e)  $2^{-6} = \frac{1}{64}$  bzw.  $2^{\frac{1}{9}} = \sqrt[9]{2}$       f)  $3^{-4} = \frac{1}{81}$  bzw.  $3^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{3}$   
 g)  $2^6 = 64$  bzw.  $2^{-\frac{1}{8}} = \frac{1}{\sqrt[8]{2}}$       h)  $2^6 = 64$  bzw.  $2^{-\frac{1}{9}} = \frac{1}{\sqrt[9]{2}}$   
 i)  $3^4 = 81$  bzw.  $3^{-\frac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt[4]{3}}$       j)  $3^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{3}$  bzw.  $3^{-\frac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt[4]{3}}$
7. a)  $2^{\frac{1}{7}}$       b)  $4^{\frac{1}{5}}$       c)  $9^{-\frac{1}{3}}$       d)  $128^{\frac{1}{10}}$       e)  $(\frac{8}{343})^{\frac{1}{4}}$   
 f)  $25^{\frac{1}{3}}$       g)  $2^{-\frac{1}{3}}$       h)  $(\frac{3}{4})^{\frac{1}{3}}$       i)  $5^{-\frac{3}{4}}$       k)  $0,3^{\frac{1}{3}}$

- 61/8. a)  $\mathbb{R}$ ;  $\sqrt[6]{x^4} = \sqrt[6]{|x|^4} = |x|^{\frac{4}{6}} = |x|^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{|x|^2} = \sqrt[3]{x^2}$   
 $\mathbb{R}$ ;  $\sqrt[4]{x^6} = \sqrt[4]{|x|^6} = |x|^{\frac{6}{4}} = |x|^{\frac{3}{2}} = \sqrt[3]{|x|^3} = |x| \sqrt[3]{|x|}$
- b)  $\mathbb{R}$ ;  $\sqrt[8]{x^2} = \sqrt[8]{|x|^2} = |x|^{\frac{2}{8}} = |x|^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{|x|}$   
 $\mathbb{R}_0^+$ ;  $\sqrt[8]{x^3}$  kann nicht vereinfacht werden.  
 $\mathbb{R}$ ;  $\sqrt[8]{x^4} = \sqrt[8]{|x|^4} = |x|^{\frac{4}{8}} = |x|^{\frac{1}{2}} = \sqrt{|x|}$   
 $\mathbb{R}_0^+$ ;  $\sqrt[8]{x^5}$  kann nicht vereinfacht werden.  
 $\mathbb{R}$ ;  $\sqrt[8]{x^6} = \sqrt[8]{|x|^6} = |x|^{\frac{6}{8}} = |x|^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{|x|^3}$   
 $\mathbb{R}_0^+$ ;  $\sqrt[8]{x^7}$  kann nicht vereinfacht werden.

- c) Alle Terme sind in  $\mathbb{R}$  definiert.

$$\sqrt{x^8} = \sqrt{(x^4)^2} = x^4$$

$$\sqrt[4]{x^8} = \sqrt[4]{(x^2)^4} = x^2$$

$$\sqrt[6]{x^8} = \sqrt[6]{|x|^8} = |x|^{\frac{8}{6}} = |x|^{\frac{4}{3}} = \sqrt[3]{|x|^4} = \sqrt[3]{x^4}$$

$\sqrt[3]{x^8}$ ,  $\sqrt[5]{x^8}$ ,  $\sqrt[7]{x^8}$  und auch  $\sqrt[3]{x^4}$  können nur weiter vereinfacht werden mit der Methode des teilweisen Radizierens (Aufgabe 68/19):

$$\sqrt[3]{x^8} = \sqrt[3]{x^6 \cdot x^2} = \sqrt[3]{x^6} \cdot \sqrt[3]{x^2} = x^2 \cdot \sqrt[3]{x^2}$$

$$\sqrt[3]{x^4} = \sqrt[3]{|x|^3 \cdot |x|} = |x| \sqrt[3]{|x|}$$

$$\sqrt[5]{x^8} = \sqrt[5]{|x|^5 \cdot |x|^3} = |x| \sqrt[5]{|x|^3}$$

$$\sqrt[7]{x^8} = \sqrt[7]{|x|^7 \cdot |x|} = |x| \sqrt[7]{|x|}$$

- 61/9. a) äquivalent,  $D = \mathbb{R}_0^+$   
 b) nicht äquivalent, da  $\sqrt[3]{a^2}$  in  $\mathbb{R}$ ,  $a^{\frac{2}{3}}$  in  $\mathbb{R}_0^+$  definiert  
 c) äquivalent,  $D = \mathbb{R}$   
 d) nicht äquivalent, da  $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$  bzw.  $\mathbb{R}^+$  ist  
 e) äquivalent,  $D = \mathbb{R}_0^+$   
 f) nicht äquivalent, da  $D = \mathbb{R}$  bzw.  $\mathbb{R}_0^+$  ist  
 g) nicht äquivalent, da  $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$  bzw.  $\mathbb{R}^+$  ist  
 h) nicht äquivalent, da  $D = \mathbb{R}^+$  bzw.  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  ist  
 i) äquivalent,  $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$   
 k) nicht äquivalent, da  $\sqrt[3]{(1+a)^2}$  in  $\mathbb{R}$ ,  $(1+a)^{\frac{2}{3}}$  in  $[-1; +\infty[$  definiert  
 l) äquivalent,  $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$   
 m) nicht äquivalent, da  $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$  bzw.  $\{(a|b) | a \geqq b\}$  ist

10. a)  $a^{\frac{1}{3}}$       b)  $|x|^{\frac{2}{5}}$       c)  $y^{\frac{3}{4}}$       d)  $|z|^{-\frac{2}{3}}$       e)  $m^{-\frac{3}{2}}$   
 f)  $|x|^{-\frac{6}{7}}$       g)  $|a|^{\frac{1}{3}}$       h)  $|a|^{-\frac{3}{4}}$       i)  $|x|^{\frac{7}{10}}$       k)  $|y|^{\frac{3}{4}}$

11. a)  $9 \cdot 2^{\frac{3}{4}}$       b) 0      c)  $a^{\frac{2}{3}}$       d)  $2x^{-\frac{1}{5}}$

12. a)  $\{9\}$       b)  $\{\sqrt[4]{2}\}$       c)  $\{1\}$   
 d)  $\{1; 2\sqrt[3]{2}\}$       e)  $\{243\}$       f)  $\{2\}$   
 g)  $\{4^{\frac{3}{4}}\} = \{\sqrt[4]{64}\}$       h)  $\{ \}$       i)  $\{3^{\frac{100}{17}}\} = \{243\sqrt[17]{3^{15}}\}$

### Aufgaben zu 3.5

- 63/1.  $a:b = b:c =: \lambda$ . Somit gilt

$$\left. \begin{array}{l} a = \lambda b \\ b = \lambda c \end{array} \right\} \Rightarrow a = \lambda^2 c \Leftrightarrow a:c = \lambda^2 = (a:b)^2$$

2.  $a:b = b:c = c:d =: \lambda$ . Somit gilt

$$\left. \begin{array}{l} a = \lambda b \\ b = \lambda c \\ c = \lambda d \end{array} \right\} \Rightarrow a:d = \lambda^3 = (a:b)^3$$

### Aufgaben zu 3.6

66/1. a) 4      b) 2      c) 9      d) 625  
 e) 2      f) 5      g) 1

2. a) 3      b)  $\frac{1}{36}$       c)  $\frac{1}{2}$       d)  $17^{\frac{23}{12}} = 17 \sqrt[12]{17^{11}}$

3. a)  $a^{\frac{11}{10}}$       b)  $x^{-\frac{5}{12}}$       c)  $b^{\frac{7}{12}}$       d)  $y^{\frac{5}{8}}$   
 e)  $a^{-\frac{13}{5}}$       f)  $m^{\frac{14}{15}}$       g)  $x^{\frac{11}{12}}$       h)  $z$

4. a) 4      b)  $\frac{1}{125}$       c) 4      d) 729  
 e)  $a^{-\frac{1}{2}}$       f)  $b^{\frac{1}{3}}$       g)  $x^{\frac{1}{4}}$       h)  $z^{\frac{3}{10}}$

5. a)  $= 16^{\frac{3}{4}} \cdot 64^{\frac{3}{4}} = 2^3 \cdot 2^{\frac{18}{4}} = 2^3 \cdot 2^{\frac{9}{2}} = 2^3 \cdot 2^4 \cdot 2^{\frac{1}{2}} = 128\sqrt{2}$

b)  $= \frac{1}{5 \cdot \sqrt[3]{17}} = \frac{\sqrt[3]{289}}{85}$

c)  $= (2^5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3^3 \cdot 2^4 \cdot 3^2)^{\frac{2}{5}} = (2^{10} \cdot 3^6)^{\frac{2}{5}} = 2^4 \cdot 3^{\frac{12}{5}} = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 3^{\frac{2}{5}} = 144 \cdot \sqrt[5]{9}$

d)  $= \frac{16^{\frac{1}{2}}}{25^{\frac{1}{2}}} = \frac{4}{5}$       e)  $= \frac{81^{\frac{2}{3}}}{64^{\frac{2}{3}}} = \frac{3^{\frac{8}{3}}}{4^2} = \frac{9\sqrt[3]{9}}{16}$

f)  $= \left(\frac{2}{9}\right)^{\frac{5}{4}} = \frac{2}{9} \sqrt[4]{\frac{2}{9}} = \frac{2}{9} \sqrt[4]{\frac{18}{81}} = \frac{2}{27} \sqrt[4]{18}$

6. a)  $a^{\frac{5}{2}}b^5$       b)  $x^{\frac{9}{2}}y^{\frac{3}{2}}$       c)  $u^2v^{-\frac{3}{2}}$       d)  $a^2b^{-6}c^{-\frac{2}{3}}$   
 e)  $y^{\frac{1}{8}}z^{-\frac{1}{2}}$       f)  $\frac{z^2}{xy^2}$       g)  $\frac{a^{\frac{17}{2}}}{b^{\frac{5}{2}}} = \frac{a^8}{b^3} \sqrt{ab}$       h)  $\frac{p^4\sqrt{r}}{q^3r^2}$

67/7. a)  $2^{\frac{1}{3}} \cdot \frac{3}{2} = 2^{\frac{1}{3}} \cdot (\frac{27}{8})^{\frac{1}{3}} = (2 \cdot \frac{27}{8})^{\frac{1}{3}} = (\frac{27}{4})^{\frac{1}{3}}$       b)  $\frac{3}{2} : 2^{\frac{1}{3}} = (\frac{27}{8})^{\frac{1}{3}} : 2^{\frac{1}{3}} = (\frac{27}{8} : 2)^{\frac{1}{3}} = (\frac{27}{16})^{\frac{1}{3}}$   
 c)  $2^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{\frac{1}{3}} = 8^{\frac{1}{6}} \cdot 9^{\frac{1}{6}} = (8 \cdot 9)^{\frac{1}{6}} = 72^{\frac{1}{6}}$       d)  $3^{\frac{1}{3}} : 2^{\frac{1}{2}} = 9^{\frac{1}{6}} : 8^{\frac{1}{6}} = (\frac{9}{8})^{\frac{1}{6}}$

8. a)  $(\frac{81}{16})^{\frac{3}{4}} = ((\frac{3}{2})^4)^{\frac{3}{4}} = (\frac{3}{2})^3 = \frac{27}{8}$

b)  $(\frac{3}{2})^x = \frac{729}{64} \Leftrightarrow (\frac{3}{2})^x = (\frac{3}{2})^6$

$x = 6$

$$\text{c)} \quad \left(\frac{27}{8}\right)^x = \frac{2187}{128}$$

$$\left(\left(\frac{3}{2}\right)^3\right)^x = \left(\frac{3}{2}\right)^7$$

$$\left(\frac{3}{2}\right)^{3x} = \left(\frac{3}{2}\right)^7$$

$$3x = 7$$

$$x = \frac{7}{3}$$

$$67/9. \quad \text{a)} \quad \left(\frac{ab}{c}\right)^2$$

$$\text{b)} \quad \frac{1}{648} m^{\frac{1}{8}} n^{-\frac{3}{4}}$$

$$10. \quad \text{a)} \quad x + 2x^{\frac{3}{4}} + x^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{b)} \quad \frac{1}{y} - y$$

$$\text{c)} \quad t^{\frac{3}{2}} - s^7$$

$$11. \quad a^{\frac{11}{6}} - 2a^{\frac{5}{24}} + a^{-\frac{5}{24}} + 3a^{-\frac{5}{8}} + 4a^{-\frac{11}{6}} - 12a^{-\frac{9}{4}} + 9a^{-\frac{8}{3}}$$

$$12. \quad \text{a)} \quad 4 \quad \text{b)} \quad (256 \cdot 10^{-8})^{\frac{1}{8}} = 2 \cdot 10^{-1} = 0,2 \quad \text{c)} \quad (3^{12})^{\frac{1}{30}} = \sqrt[5]{9} \quad \text{d)} \quad 6$$

$$13. \quad \text{a)} \quad 2 \quad \text{b)} \quad 3 \quad \text{c)} \quad 6 \quad \text{d)} \quad 2 \quad \text{e)} \quad 2 \quad \text{f)} \quad 6 \quad \text{g)} \quad 2$$

$$14. \quad 1) \quad \sqrt[4]{45949729863572161} = 214358881$$

$$\begin{array}{r} -4 \\ \hline 59 \\ -41 \\ \hline 1849 \\ -1696 \\ \hline 15372 \\ -12849 \\ \hline 252398 \\ -214325 \\ \hline 3807363 \\ -3429664 \\ \hline 37769957 \\ -34297344 \\ \hline 347261321 \\ -342974144 \\ \hline 428717761 \\ -428717761 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} 2^2 = 4 \\ 41 \cdot 1 \\ 424 \cdot 4 \\ 4283 \cdot 3 \\ 42865 \cdot 5 \\ 428708 \cdot 8 \\ 4287168 \cdot 8 \\ 42871768 \cdot 8 \\ 428717761 \cdot 1 \end{array}$$

$$2) \sqrt{214358881} = 14641$$

$$\begin{array}{r}
 \underline{-1} \\
 114 \\
 -96 \\
 \hline
 1835 \\
 -1716 \\
 \hline
 11988 \\
 -11696 \\
 \hline
 29281 \\
 -29281 \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 24 \cdot 4 \\
 286 \cdot 6 \\
 2924 \cdot 4 \\
 29281 \cdot 1
 \end{array}$$

$$3) \sqrt{14641} = 121$$

$$\begin{array}{r}
 \underline{-1} \\
 46 \\
 -44 \\
 \hline
 241 \\
 -241 \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 22 \cdot 2 \\
 241 \cdot 1
 \end{array}$$

$$\text{Also: } \sqrt[8]{45949729863572161} = 121$$

67/15. a)  $4a$       b)  $a^2$       c)  $2|a|^3$       d)  $|ab| = ab$       e)  $xy^2$       f)  $\frac{2m^2}{n}$

68/16. a)  $\frac{a}{b^2}$       b)  $\frac{x^2}{|y|^3}$       c)  $\frac{2|n|^3}{m^2}$       d)  $\frac{pq^2}{r^4}$

l) 6      e)  $\frac{|a|}{b^2}$       f)  $2|xy|$       g)  $\frac{3u^3}{vw^5}$

17. a) 2      b)  $\frac{1}{2}$       c)  $\frac{5}{2}$       d)  $\frac{1}{2}$

18. a)  $a$       b)  $\frac{1}{b}$       c)  $|b|$       d)  $\frac{2}{ab}$

19. a)  $3\sqrt[3]{2}$       b)  $2\sqrt[5]{5}$       c)  $2\sqrt[4]{10}$       d)  $4\sqrt{11}$       e)  $3\sqrt[6]{10}$   
 f)  $5\sqrt[4]{2}$       g)  $2,5\sqrt{10}$       h)  $0,7\sqrt[3]{5}$       i)  $0,3\sqrt[5]{100}$       k)  $1,1\sqrt{11}$

20. a)  $a\sqrt{a}$       b)  $a\sqrt[4]{a^3}$       c)  $|a|b^2\sqrt[5]{|a|}$   
 d)  $a^3b^2\sqrt[3]{a^2b^2}$       e)  $|a|b^2\sqrt[10]{a^3b^5c^7}$       f)  $(a-b)\sqrt[3]{(a-b)^2}$   
 g)  $|a+b|\sqrt[3]{|a+b|}$       h)  $|a-2b|(b+c)\sqrt[5]{|a-2b|^3(b+c)^2}$

21. a)  $\frac{1}{3}\sqrt{3}$       b)  $\frac{1}{2}\sqrt[3]{4}$       c)  $\frac{1}{2}\sqrt[3]{2}$       d)  $\frac{1}{2}\sqrt[6]{2}$   
 e)  $\sqrt[4]{125}$       f)  $2\sqrt[5]{9}$       g)  $\frac{1}{3}\sqrt[3]{12}$       h)  $\sqrt[4]{156}$

22. a)  $\frac{\sqrt[4]{6a}}{2a}$       b)  $\frac{\sqrt[4]{22a^3}}{2a}$       c)  $\frac{\sqrt[3]{|a|}}{|a|}$       d)  $\frac{\sqrt[3]{|a|b^2}}{|b|}$

e)  $\frac{\sqrt[5]{|a^2-b^2|}}{|a-b|}$       [ $a = -2, b = 4$  macht die Beträge verständlich.]

f)  $\sqrt[7]{a^2b^2}$       g)  $2|a|b\sqrt[4]{2a^2b}$       h)  $\frac{\sqrt[3]{3|a|b(a+b)^2}}{2|a|(a+b)^4}$

69/23. a) 128      b) 27      c) 16      d) 49      e) 512  
 f)  $2\sqrt[3]{2}$       g) 3      h)  $2\sqrt[5]{2}$       i)  $24\sqrt{3}$       j) 0,36

70/3

24. a)  $(13\frac{1}{3})^{\frac{1}{2}} = 13\frac{1}{6} = \sqrt[6]{13}$        $((12\frac{1}{5})^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{3}} = 12\frac{1}{30} = \sqrt[30]{12}$   
 b) 1)  $\sqrt[6]{a}$       2)  $\sqrt[10]{b^3}$       3)  $\sqrt[12]{2}$       4)  $\sqrt[20]{2ab}$       5)  $\sqrt[36]{x}$

3

25.  $= ((a^{\frac{1}{k}})^{\frac{1}{n}})^{\frac{1}{m}} = a^{\frac{1}{k} \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{m}} = a^{\frac{1}{n} \cdot \frac{1}{m} \cdot \frac{1}{k}} = ((a^{\frac{1}{n}})^{\frac{1}{m}})^{\frac{1}{k}} = \sqrt[k]{\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}}$

3

26. a)  $\sqrt[4]{2}$       b)  $\sqrt[4]{2}$       c)  $\sqrt[7]{3}$       d)  $\sqrt[5]{2}$   
 e)  $\sqrt[3]{a^2}$       f)  $\sqrt[5]{|a|}$       g)  $\sqrt[10]{x^3}$       h)  $\sqrt[3]{|a|}$

4

27. a)  $\sqrt[4]{a}$       b)  $|a| \sqrt[4]{|a|}$       c)  $a^2 \sqrt{b}$       d)  $\sqrt[4]{|a^3 b^5 c|}$

4

28. a)  $\sqrt[4]{2}$       b)  $\sqrt[3]{3}$       c)  $\sqrt[3]{4}$       d)  $\sqrt[4]{6}$   
 e)  $\sqrt[4]{27}$       f)  $\sqrt[5]{25}$       g)  $\sqrt[3]{0,09}$       h)  $\sqrt[3]{0,4}$

4

29. Produkt:

$$\sqrt[mn]{a} \cdot \sqrt[mn]{b} = a^{\frac{1}{mn}} \cdot b^{\frac{1}{mn}} = a^{\frac{m}{mn}} \cdot b^{\frac{n}{mn}} = (a^m)^{\frac{1}{mn}} \cdot (b^n)^{\frac{1}{mn}} = (a^m \cdot b^n)^{\frac{1}{mn}} = \sqrt[mn]{a^m b^n}$$

71/5

Quotient:

$$\frac{\sqrt[mn]{a}}{\sqrt[mn]{b}} = a^{\frac{1}{mn}} \cdot b^{-\frac{1}{mn}} = a^{\frac{m}{mn}} \cdot b^{-\frac{n}{mn}} = (a^m)^{\frac{1}{mn}} \cdot (b^{-n})^{\frac{1}{mn}} = (a^m \cdot b^{-n})^{\frac{1}{mn}} = \sqrt[mn]{\frac{a^m}{b^n}}$$

2

30. a)  $\sqrt[4]{8}$       b)  $\sqrt[6]{2}$       c)  $\sqrt[12]{\frac{16}{27}}$       d)  $\sqrt[15]{5^8}$   
 e) 7      f)  $\sqrt[4]{\frac{324}{5}}$       g)  $\sqrt[20]{\frac{9}{2}}$

4

31. a)  $\sqrt[6]{x^7}$       b)  $\frac{1}{\sqrt[6]{y}}$       c)  $\sqrt[12]{a^{11}}$       d)  $\frac{1}{\sqrt[12]{a}}$   
 e)  $\sqrt[5]{b}$       f)  $\sqrt[4]{n^5}$

4

70/32. a)  $\sqrt[4]{12}$       b)  $\sqrt[6]{5}$       c)  $\sqrt[6]{81}$       d)  $\sqrt[15]{2^7}$   
 e)  $\sqrt[3]{a^2}$       f)  $\frac{1}{\sqrt[4]{b^3}}$       g)  $\sqrt[24]{a^{23} b^9}$       h)  $\sqrt[30]{a^{6m+2n+p}}$

2

33. a)  $5\sqrt{5}$       b)  $6(\sqrt[3]{3} + \sqrt{6})$

34. a)  $-24(10\sqrt[3]{4} - 9)$       b)  $207 + 18\sqrt{3}$

35. a)  $3\sqrt[4]{2}$       b)  $4\sqrt[3]{2}$

70/36. a)  $-\sqrt[2]{2}$       b)  $8\sqrt[3]{3} - 3\sqrt[6]{10}$

37. a)  $3\sqrt[4]{a^3}(a-1)$       b)  $4\sqrt[3]{a^2}(a-1)$

38. a)  $a\sqrt[4]{ab^3}$       b)  $\frac{x^2}{y}(x^2 + 2y^2)\sqrt[5]{\frac{x}{y}} = \frac{x^2}{y^2}(x^2 + 2y^2)\sqrt[5]{xy^4}$

39. a)  $\sqrt[12]{a}(1+3a)$       b)  $\sqrt[12]{a}(a-2)$

40. a)  $x^3 \cdot \sqrt[24]{x}$       b)  $\sqrt[72]{y^{71}}$

41. a)  $\sqrt[3]{\frac{c}{a}}$       b)  $\sqrt[4]{\frac{c}{b}}$

42. a)  $\{9\}$       b)  $\{32\}$       c)  $\{-9; 9\}$       d)  $\{16\}$   
 e)  $\{a^2b + b^2a - 2ab\sqrt{ab}\}$       f)  $\{-a-b; b-a\}$   
 g)  $\{\frac{1}{3}\sqrt[4]{a^3b}\}$       h)  $\{-\frac{1}{4}\sqrt[4]{a^2b^3}; \frac{1}{2}\sqrt[4]{a^2b^3}\}$       i)  $\mathbb{R}_0^+$       k)  $\mathbb{R}^+$

71/43.  $x$

44.  $a^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{a^3} = \sqrt{a \sqrt{a}}$

45. 1

$$\begin{aligned}
 46. &= \frac{(\sqrt{x} - x)^{\frac{1}{6}}}{\left(\frac{1}{\sqrt[4]{x}} + \sqrt[4]{x}\right)^{\frac{1}{3}}} \cdot \frac{(\sqrt[3]{x} + \sqrt[6]{x^5})^{\frac{1}{2}}}{(\sqrt{x} - x)^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{\frac{(\sqrt{x} - x)^{\frac{1}{3}}}{(\sqrt{x} + x)^{\frac{1}{6}}}}{=} \\
 &= \frac{(\sqrt{x} - x)^{\frac{1}{6} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}} \cdot (\sqrt[3]{x} + \sqrt[6]{x^3 x^2})^{\frac{1}{2}}}{\left(\frac{1}{\sqrt[4]{x}} + \sqrt[4]{x}\right)^{\frac{1}{3}} \cdot (\sqrt{x} + x)^{\frac{1}{6}} (\sqrt{x} - x)^{\frac{1}{3}}} = \\
 &= \frac{(\sqrt[3]{x} + \sqrt{x} \sqrt[3]{x})^{\frac{1}{2}}}{\sqrt[6]{\left(\frac{1}{\sqrt[4]{x}} + \sqrt[4]{x}\right)^2} (\sqrt{x} + x) \sqrt{x}} = \\
 &= \frac{\sqrt[6]{x} (1 + \sqrt{x})^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{x} \sqrt[6]{\left(\frac{1}{\sqrt[4]{x}} + 2 + \sqrt{x}\right) (\sqrt{x} + x)}} = \\
 &= \frac{\sqrt[6]{x} (1 + \sqrt{x})^{\frac{1}{2}}}{\sqrt[6]{x} \sqrt[6]{(1 + \sqrt{x})^3}} = \\
 &= \frac{1}{\sqrt[3]{x}}
 \end{aligned}$$

72/47. a) Nennt man die 11 Zwischentöne  $t_1, t_2, \dots, t_{11}$ , dann muß gelten

$$\frac{t_1}{a^1} = \frac{t_2}{t_1} = \dots = \frac{t_{11}}{t_{10}} = \frac{a^2}{t_{11}} =: \lambda.$$

Also

$$t_1 = \lambda a^1, \quad t_2 = \lambda t_1, \dots, \quad a^2 = \lambda t_{11}.$$

Setzt man der Reihe nach ein, so erhält man

$$t_2 = \lambda^2 a^1, \quad t_3 = \lambda^3 a^1, \dots, \quad a^2 = \lambda^{12} a^1.$$

Wegen  $a^2 : a^1 = 2$  gilt also  $\lambda^{12} = 2$  bzw.  $\lambda = \sqrt[12]{2}$ .

Halbtonschritt  $\sqrt[12]{2}$ ; Ganztonschritt  $\sqrt[6]{2}$

b)  $a^2: 880 \text{ Hz} \quad a^3: 1760 \text{ Hz}$

$$a: 220 \text{ Hz} \quad A: 110 \text{ Hz} \quad A_1: 55 \text{ Hz}$$

c)  $a^1: 440 \text{ Hz}$

$$b^1: 466,16 \text{ Hz} \approx 466 \text{ Hz}$$

$$h^1: 493,88 \text{ Hz} \approx 494 \text{ Hz}$$

$$c^2: 523,25 \text{ Hz} \approx 523 \text{ Hz}$$

$$cis^2: 554,36 \text{ Hz} \approx 554 \text{ Hz}$$

$$d^2: 587,32 \text{ Hz} \approx 587 \text{ Hz}$$

$$dis^2: 622,25 \text{ Hz} \approx 622 \text{ Hz}$$

$$e^2: 659,25 \text{ Hz} \approx 659 \text{ Hz}$$

$$f^2: 698,45 \text{ Hz} \approx 698 \text{ Hz}$$

$$fis^2: 739,98 \text{ Hz} \approx 740 \text{ Hz}$$

$$g^2: 783,99 \text{ Hz} \approx 784 \text{ Hz}$$

$$gis^2: 830,60 \text{ Hz} \approx 831 \text{ Hz}$$

$$a^2: 879,99 \text{ Hz} \approx 880 \text{ Hz}$$

d) 1)  $d^2: 586 \frac{2}{3} \text{ Hz} \quad e^2: 660 \text{ Hz}$

2)  $d^2: 587,32 \text{ Hz} \quad e^2: 659,25 \text{ Hz}$

e) Die 12. Quinte hat zum Ausgangston das Frequenzverhältnis

$$((\sqrt[12]{2})^7)^{12} : 1 = ((\sqrt[12]{2})^{12})^7 : 1 = 2^7 : 1.$$

Das ist das Frequenzverhältnis zur 7. Oktave.

Reine Stimmung:

$$12. \text{ Quinte} : \text{Grundton} = (\frac{3}{2})^{12} : 1 = 129,74$$

$$7. \text{ Oktave} : \text{Grundton} = 2^7 : 1 = 128$$

75/2.

3.

4.

5.

6.

Aufg

83/1

### Aufgaben zu 3.7

75/1. a) 1) 4,711113133...

2) 442,335006...

3) 3,15647077...

4) 36,46215961...

b) 1)  $2^2 = 4$

2)  $10^2 = 100$

$$2^{2,2} = 4,5$$

$$10^{2,6} = 398$$

$$2^{2,23} = 4,6$$

$$10^{2,64} = 436$$

$$2^{2,236} = 4,710891$$

$$10^{2,645} = 441$$

$$2^{2,2360} = 4,710891$$

$$10^{2,6457} = 442$$

3)  $\sqrt[3]{2}^3 = 2,8$

$\sqrt[3]{2}^{3,3} = 3,13$

$\sqrt[3]{2}^{3,31} = 3,14$

$\sqrt[3]{2}^{3,316} = 3,155$

$\sqrt[3]{2}^{3,3166} = 3,156$

4)  $\pi^3 = 31$

$\pi^{3,1} = 34$

$\pi^{3,14} = 36,3$

$\pi^{3,141} = 36,43$

$\pi^{3,1415} = 36,458$

75/2. a) 4      b) 5      c) 27      d) 243      e) 100      f)  $\frac{1}{5}$

3. a)  $\sqrt{2} \approx 1,414$       b)  $3^{-6} = \frac{1}{729} \approx 0,001$       c)  $\sqrt{1,1} \approx 1,049$





4. a)  $a^{10\sqrt{2}-47}$       b)  $x^2$       c)  $y^{\sqrt{2}}$       d)  $c$   
 e)  $a^2 b^{\sqrt[3]{2}}$       f)  $\sqrt[3]{a}$       g)  $m^{-3}$


5. a)  $\{\sqrt[3]{3}\}$       b)  $\{3\}$       c)  $\{3\sqrt{2}\}$       d)  $\{0\}$       e)  $\{-1\}$   
 f)  $\{-\sqrt[3]{2,5}\}$       g)  $\{-\frac{1}{2}\sqrt{3}; \frac{1}{2}\sqrt{3}\}$       h)  $\{-\sqrt{2}; \sqrt{2}\}$       i)  $\{-1; 1\}$

6. a)  $3^{\frac{1}{7}\sqrt{7}} \approx 1,51$       b)  $2^{-\frac{1}{2\pi}} \approx 0,90$       c)  $10^{\sqrt{3}} \approx 53,96$       d)  $x_1 = 0; x_2 = 1$   
 e)  $x_1 = (3 - 2\sqrt{2})^{\frac{1}{5}\sqrt{5}} \approx 0,45; x_2 = (3 + 2\sqrt{2})^{\frac{1}{5}\sqrt{5}} \approx 2,20$   
 f)  $x_1 = (\frac{1}{2})^{\sqrt{2}} \approx 0,38; x_2 = 4^{\sqrt{2}} \approx 7,10$




### Aufgaben zu 4.1






83/1.





83/2.





3. Neun Graphen  $x \mapsto x^\varrho$ ,  $x \in [0; 1]$ ,  $\varrho > 1$ , wurden samt  $x \mapsto x^{\frac{1}{\varrho}}$ , d.h. ihren Spiegeln an der Winkelhalbierenden des 1. Quadranten, an der  $x$ -Achse, der  $y$ -Achse und am Ursprung gespiegelt. 84/


4. a) 3      b) -      c) -      d) 3

5. a) 4      b) 4      c) 2      d)  $\frac{1}{2}$       e)  $\frac{1}{3}$       f) -2

6. a)  $\mathbb{R}$       b)  $2k, k \in \mathbb{Z}$       c) -      d)  $2k+1, k \in \mathbb{Z}$   
 e)  $\mathbb{R}^+$       f) -      g) -      h) -      i) 0

7. a)

$x$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{5}{2}$	3	$\frac{7}{2}$	4	5	6
$x^{\frac{3}{4}}$	0	0,59	1	1,35	1,68	1,98	2,27	2,55	2,82	3,34	3,81




b) 1) 0,8      2) 1,3      3) 2      4) 2,3      5) 2,4

c) 1) 0,4      2) 1      3) 2,5      4) 4,3      5) 5,3


d)  $y = x^{\frac{3}{4}} \Leftrightarrow y^{\frac{4}{3}} = x$

1) Ausgehend von  $y = 0,5$  erhält man  $x \approx 0,4$ .      2) 3,4      3) 5,8


8. a)




b)




c)




d)



84/9. a)



b)



Durch Spiegelung des Graphen  $|y| = x^{3/2}$  an der Winkelhalbierenden des 1. und 3. Quadranten entsteht der Graph  $|x| = y^{2/3}$ , dessen Gleichung mit  $|x|^{2/3} = y$  äquivalent ist.

10. a)  $\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^{\frac{3}{2}} \Leftrightarrow \frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{r_1^3}{r_2^3}$

b)  $T: r \mapsto Cr^{\frac{3}{2}}$

Der Graph von  $T = Cr^{\frac{3}{2}}$  ist eine Neilsche Parabel.


Wegen  $T_n = C(nr)^{\frac{3}{2}} = n^{\frac{3}{2}}Cr^{\frac{3}{2}} = n^{\frac{3}{2}}T_1$  gilt:

Bei doppeltem Bahnradius ergibt sich die  $2\sqrt{2}$  fache Umlaufzeit,

bei dreifachem Bahnradius die  $3\sqrt{3}$  fache und

bei vierfachem Bahnradius die 8 fache Umlaufzeit.


85/11.  $p = \frac{c}{V}$




12. a)  $a:x = x:y \Leftrightarrow ay = x^2$

$a:x = y:b \Leftrightarrow xy = ab$




Der Schnittpunkt hat die Koordinaten  $(\sqrt[3]{a^2b} | \sqrt[3]{ab^2})$ .




$x$	1	1,05	1,1	1,2	1,25	1,3	1,35
$x^2$	1	1,10	1,21	1,44	1,56	1,69	1,82
$\frac{2}{x}$	2	1,90	1,82	1,67	1,60	1,53	1,48





- 85/13.






85/1



1






Die Gleichung besitzt genau 1 Lösung.  
Graphische Näherung:  $x \approx 0,55$

$$0,55^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} = 1,241 \dots$$


$$0,55^{-\frac{1}{3}} = 1,220 \dots$$

$$\left. \begin{array}{l} 0,535^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} = 1,2314 \dots \\ 0,535^{-\frac{1}{3}} = 1,2318 \dots \\ 0,536^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} = 1,2321 \dots \\ 0,536^{-\frac{1}{3}} = 1,2310 \dots \end{array} \right\} \Rightarrow x = 0,535 \dots$$



Die Gleichung besitzt genau 1 Lösung.  
Graphische Näherung:  $x \approx 0,156$

$$\left. \begin{array}{l} 0,156^{\frac{1}{3}} = 0,5383 \dots \\ 0,156^{-\frac{1}{2}} - 2 = 0,5318 \dots \\ 0,155^{\frac{1}{3}} = 0,5371 \dots \\ 0,155^{-\frac{1}{2}} - 2 = 0,5400 \dots \end{array} \right\} \Rightarrow x = 0,155 \dots$$



Die Gleichung besitzt genau 1 Lösung 88/4,  
Graphische Näherung:  $x \approx 0,35$  89/5,

$$0,35^{\frac{3}{2}} + 0,5 = 0,7070\dots$$

$$0,35^{-\frac{1}{2}} - 1 = 0,6903\dots$$

$$0,345^{\frac{3}{2}} + 0,5 = 0,7026\dots$$


$$0,345^{-\frac{1}{2}} - 1 = 0,7025\dots$$

$$0,344^{\frac{3}{2}} + 0,5 = 0,7017\dots$$

$$0,344^{-\frac{1}{2}} - 1 = 0,7049\dots$$

6

$$\left. \begin{array}{l} 0,345^{\frac{3}{2}} + 0,5 = 0,7026\dots \\ 0,345^{-\frac{1}{2}} - 1 = 0,7025\dots \\ 0,344^{\frac{3}{2}} + 0,5 = 0,7017\dots \\ 0,344^{-\frac{1}{2}} - 1 = 0,7049\dots \end{array} \right\} \Rightarrow x = 0$$



Die Gleichung besitzt genau 1 Lösung 11,  
Graphische Näherung:  $x \approx 2,1$

$$2,058^{\frac{2}{3}} - 1 = 0,6179\dots$$

$$2,058^{-\frac{2}{3}} = 0,6180\dots$$

$$2,059^{\frac{2}{3}} - 1 = 0,6184\dots$$

$$2,059^{-\frac{2}{3}} = 0,6178\dots$$

$$\text{Exakte Lösung: } \sqrt{2 + \sqrt{5}}$$

(Quadratische Gleichung für  $u = x^{2/3}$ )

- 88/1. a)  $3^{10} < 4^{10}$       b)  $(\frac{1}{4})^{10} < (\frac{1}{3})^{10}$       c)  $1,77^{13} < 1,78^{13}$   
 d)  $0,98^5 < 0,99^5$       e)  $7^9 < 7^{12}$       f)  $(\frac{1}{7})^{12} < (\frac{1}{7})^9$   
 g)  $18^{-4} < 18^{-3}$       h)  $0,18^{-3} < 0,18^{-4}$       i)  $(-1)^{-4} = (-1)^{-6}$   
 k)  $16^5 < 16^6 < 17^6$       l)  $(\frac{1}{2})^6 < (\frac{2}{3})^6 < (\frac{2}{3})^5$       m)  $2^{-4} > 2^{-6} > 3^{-6}$

2. a)  $5^{0,3} < 5^{\frac{3}{8}} < 5^{\frac{2}{5}}$       b)  $1,1^{-\frac{8}{3}} < 1,1^{-\frac{5}{2}} < 1,1^{-\frac{13}{6}}$

c)  $(\frac{2}{3})^{1,3} < (\frac{2}{3})^{\frac{9}{7}} < (\frac{2}{3})^{\frac{6}{5}} < (\frac{2}{3})^{-\frac{4}{3}}$

d)  $10^{\frac{4}{3}} = 0,1^{-\frac{4}{3}}; 100^{-\frac{9}{16}} = 0,1^{\frac{9}{16}}$

$$-\frac{4}{3} < -\frac{4}{5} < \frac{9}{8} < \frac{5}{4} \Rightarrow 0,1^{\frac{5}{16}} < 100^{-\frac{9}{16}} < 0,1^{-\frac{4}{5}} < 10^{\frac{4}{3}}$$

3. a)  $\frac{1}{3} < \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow (\frac{1}{3})^{\frac{1}{2}} < (\frac{1}{2})^{\frac{1}{2}} < 1 \Leftrightarrow \frac{1}{3}\sqrt{3} < \frac{1}{2}\sqrt{2} < 1 \Rightarrow 2^{\frac{1}{3}\sqrt{3}} < 2^{\frac{1}{2}\sqrt{2}}$

b)  $\pi < \frac{22}{7} \Rightarrow (\frac{12}{11})^\pi < (\frac{12}{11})^{\frac{22}{7}}$

c)  $10^3 < 2^{10} \Rightarrow 10^{\frac{3}{7}} < 2^{\frac{10}{7}} \Rightarrow 5^{10^{\frac{3}{7}}} < 5^{2^{\frac{10}{7}}}$

d)  $-\sqrt{6} < -\sqrt{5} \Rightarrow (\sqrt[3]{2})^{-\sqrt{6}} < (\sqrt[3]{2})^{-\sqrt{5}}$

e)  $\sqrt[4]{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2}\sqrt[4]{2} \Rightarrow 0,9^{\frac{1}{2}\sqrt[4]{2}} = 0,9^{\sqrt[4]{\frac{1}{8}}}$

f)  $-\sqrt{10} < -\pi \Rightarrow \left(\frac{\pi}{4}\right)^{-\pi} < \left(\frac{\pi}{4}\right)^{-\sqrt{10}}$

ösull 88/4. a)  $1,5^{\sqrt[7]{3}} < 1,6^{\sqrt[7]{3}}$       b)  $0,87^{\sqrt[3]{5}} < (\frac{7}{8})^{\sqrt[3]{5}}$       c)  $(\frac{15}{16})^{1-\sqrt{3}} < (\frac{14}{15})^{1-\sqrt{3}}$

5 89/5. a)  $a^2 < b^2$       b)  $a^{1,2} < b^{1,2}$       c)  $a^{0,1} < b^{0,1}$   
 d)  $b^{-4} < a^{-4}$       e)  $b^{-\frac{3}{8}} < a^{-\frac{3}{8}}$       f)  $b^{-0,01} < a^{-0,01}$

6. Wegen des 2. Monotoniegesetzes müßte man die Beziehungen zwischen  $a$ ,  $b$  und 1 kennen.

a) 1. Fall:  $1 < a < b$

Dann gilt  $a^2 < a^3 < b^3$ .

Beispiel:  $a = 2, b = 3 \Rightarrow 2^2 = 4 < 3^3 = 27$

2. Fall:  $0 < a < 1 < b$

Dann ist  $a^2 < 1$  und  $b^3 > 1$ , also  $a^2 < b^3$ .

Beispiel:  $a = \frac{1}{2}, b = \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{1}{4} < \frac{27}{8}$

3. Fall:  $0 < a < b < 1$

Dann ist zwar  $a^3 < a^2 < b^2$  und  $a^3 < b^3 < b^2$ , wohingegen  $a^2 < b^3$  nicht eintreten muß.

Beispiel:

$a = 0,5; b = 0,7 \Rightarrow a^2 < b^3$ , weil  $0,25 < 0,343$ .

$a = 0,5; b = 0,6 \Rightarrow a^2 > b^3$ , weil  $0,25 > 0,216$ .

b) 1. Fall:  $1 < a < b$

Es ist zwar  $a^{0,5} < b^{0,5}$  und  $b^{0,2} < b^{0,5}$ , wohingegen  $a^{0,5} < b^{0,2}$  nicht eintreten muß.

Beispiel:

$a = 2^{10}; b = 3^{10} \Rightarrow a^{0,5} > b^{0,2}$ , weil  $32 > 9$ .

$a = 2^{10}; b = 6^{10} \Rightarrow a^{0,5} < b^{0,2}$ , weil  $32 < 36$ .

2. Fall:  $0 < a < 1 < b$

Dann gilt  $a^{0,5} < 1 \wedge 1 < b^{0,2}$ , also  $a^{0,5} < b^{0,2}$ .

Beispiel:  $a = \frac{1}{2^{10}}, b = 2^{10} \Rightarrow \frac{1}{32} < 4$

3. Fall:  $0 < a < b < 1$

Dann gilt  $a^{0,5} < a^{0,2}$  und  $a^{0,2} < b^{0,2}$ , also  $a^{0,5} < b^{0,2}$

Beispiel:  $a = 0,25, b = 0,32768 \Rightarrow 0,5 < 0,8$

7. a)  $0,1 < \frac{2}{3} \wedge 0 < x < 1 \Rightarrow x^{\frac{2}{3}} < x^{0,1}$       b)  $0 < x < 1 \Rightarrow x^{0,1} < 1$       c)  $0 < x < 1 \Rightarrow 1 < x^{-\frac{1}{5}}$

$0 < x < y \Rightarrow x^{0,1} < y^{0,1}$        $1 < y \Rightarrow 1 < y^{\frac{2}{3}}$

$1 < y \Rightarrow 0 < y^{-3} < 1$        $y^{-3} < x^{-\frac{1}{5}}$

89/8. a)  $\sqrt{a} < \sqrt{b}$

b)  $0 < a < b \Leftrightarrow 0 < a^2 < ab \Leftrightarrow 0 < \frac{a}{b} < \sqrt{ab}$

c)  $0 < a < b \Leftrightarrow 0 < a^2 b < ab^2 \Leftrightarrow 0 < a\sqrt{b} < b\sqrt{a}$

d)  $\sqrt[3]{a^2} < \sqrt[3]{b^2}$

e)  $0 < a < b \Leftrightarrow 0 < \frac{a^2}{b} < a \Leftrightarrow \sqrt[4]{a^2 b^{-1}} < \sqrt[4]{a}$

f)  $0 < a < b \Leftrightarrow 0 < a^{p+1} b^q < a^p b^{q+1} \Leftrightarrow \sqrt[n]{a^{p+1} b^q} < \sqrt[n]{a^p b^{q+1}}$

9. a)  $a > 1 \Leftrightarrow a^{\frac{1}{n}} > 1^{\frac{1}{n}} \Leftrightarrow \sqrt[n]{a} > 1$

Beispiel:  $4 > 1 \Leftrightarrow \sqrt[4]{4} > 1 \Leftrightarrow 2 > 1$

b)  $0 \leq a < 1 \Leftrightarrow 0^{\frac{1}{n}} \leq a^{\frac{1}{n}} < 1^{\frac{1}{n}} \Leftrightarrow \sqrt[n]{a} < 1$

Beispiel:  $0 < \frac{4}{9} < 1 \Leftrightarrow \sqrt[4]{\frac{4}{9}} < 1 \Leftrightarrow \frac{2}{3} < 1$

c)  $a > 1$   
 $m > n \Leftrightarrow \frac{1}{m} < \frac{1}{n}$  }  $\Rightarrow a^{\frac{1}{m}} < a^{\frac{1}{n}} \Leftrightarrow \sqrt[m]{a} < \sqrt[n]{a}$

Beispiel:  $1024 > 1$  }  $\Rightarrow 4 = \sqrt[5]{1024} < \sqrt[2]{1024} = 32$

d)  $0 \leq a < 1$   
 $m > n \Leftrightarrow \frac{1}{m} < \frac{1}{n}$  }  $\Rightarrow a^{\frac{1}{n}} < a^{\frac{1}{m}} \Leftrightarrow \sqrt[n]{a} < \sqrt[m]{a}$

Beispiel:  $0 \leq \frac{1}{729} < 1$  }  $\Rightarrow \frac{1}{27} = \sqrt[2]{\frac{1}{729}} < \sqrt[3]{\frac{1}{729}} = \frac{1}{9}$

e)  $1 \leq a < b$   
 $m > n \Leftrightarrow \frac{1}{m} < \frac{1}{n}$  }  $\Rightarrow a^{\frac{1}{m}} < a^{\frac{1}{n}} < b^{\frac{1}{n}} \Rightarrow \sqrt[m]{a} < \sqrt[n]{b}$

Beispiel:  $1 \leq 64 < 729$  }  $\Rightarrow 4 = \sqrt[3]{64} < \sqrt[2]{729} = 27$


f)  $0 \leq a < b \leq 1$   
 $m > n \Leftrightarrow \frac{1}{m} < \frac{1}{n}$  }  $\Rightarrow a^{\frac{1}{n}} < a^{\frac{1}{m}} < b^{\frac{1}{m}} \Rightarrow \sqrt[n]{a} < \sqrt[m]{b}$

Beispiel:  $0 \leq \frac{1}{729} < \frac{1}{64} \leq 1$  }  $\Rightarrow \frac{1}{27} = \sqrt[2]{\frac{1}{729}} < \sqrt[3]{\frac{1}{64}} = \frac{1}{4}$


10. a)  $0 < x_1 < x_2 < 1 \Leftrightarrow 0 < x_1^{\varrho} < x_2^{\varrho} < 1$

$0 < x_1 < 1 < x_2 \Leftrightarrow 0 < x_1^{\varrho} < 1 < x_2^{\varrho}$

$1 < x_1 < x_2 \Leftrightarrow 1 < x_1^{\varrho} < x_2^{\varrho}$



- b)  $0 < x_1 < x_2 < 1 \Leftrightarrow 1 < x_2^\varrho < x_1^\varrho$   
 $0 < x_1 < 1 < x_2 \Leftrightarrow 0 < x_2^\varrho < 1 < x_1^\varrho$   
 $1 < x_1 < x_2 \Leftrightarrow 0 < x_2^\varrho < x_1^\varrho < 1$




- 89/11. a) echt monoton zunehmend  
 b) echt monoton abnehmend  
 c) keine Monotonie in  $D$   
 d) konstant  
 e) echt monoton abnehmend  
 f) echt monoton abnehmend  
 g) keine Monotonie in  $D$   
 h) keine Monotonie in  $D$

### Aufgaben zu 4.3


93/1.

$x$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	2	3	4	5	10	16
$x^{-2}$	16	4	$\frac{16}{9}$	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{256}$



93/2.

$x$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	93/5
$x^{\frac{2}{3}}$	0	0,40	0,63	0,83	1	1,31	1,59	1,84	2,08	2,30	2,52	



3. a)  $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}\sqrt{2(x-3)}$ ,  $D_{f^{-1}} = [3; +\infty[$ ,  $W_{f^{-1}} = \mathbb{R}_0^+$

b)  $f^{-1}(x) = 3 + \sqrt[5]{x}$ ,  $D_{f^{-1}} = \mathbb{R}_0^+$ ,  $W_{f^{-1}} = [3; +\infty[$


c)  $f^{-1}(x) = 3 - \sqrt[5]{|x|}$ ,  $D_{f^{-1}} = \mathbb{R}^-$ ;  $W_{f^{-1}} = ]-\infty; 3[$


d)  $f^{-1}(x) = [\frac{1}{5}(x+4)]^{\frac{1}{2}\sqrt{2}}$ ,  $D_{f^{-1}} = [-4; +\infty[$ ,  $W_{f^{-1}} = [-2; +\infty[$

e)  $f^{-1}(x) = [5(x - \sqrt[3]{5})]^{-\frac{10}{3}}$ ,  $D_{f^{-1}} = ]\sqrt[3]{5}; +\infty[$ ,  $W_{f^{-1}} = \mathbb{R}^+$

f)  $f^{-1}(x) = \left(\frac{6}{x-5}\right)^3$ ;  $D_{f^{-1}} = [7; 8]$ ;  $W_{f^{-1}} = [8; 27]$

4.  $f^{-1}(x) = (x - \frac{3}{2})^{\frac{3}{2}} - 2$ ,  $D_{f^{-1}} = [\frac{3}{2}; +\infty[$ ,  $W_{f^{-1}} = [-2; +\infty[$




93/5. a)  $y$ 


b)  $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}; D_{f^{-1}} = \mathbb{R}_0^+, W_{f^{-1}} = \mathbb{R}_0^+$

c)  $y = \sqrt[3]{x}$

d) 
$$g^{-1}(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x} & \text{für } x \in \mathbb{R}_0^+ \\ -\sqrt[3]{-x} & \text{für } x \in \mathbb{R}^- \end{cases}, D_{g^{-1}} = \mathbb{R}, W_{g^{-1}} = \mathbb{R}$$




6. a)




b)  $f^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}, D_{f^{-1}} = \mathbb{R}^+, W_{f^{-1}} = \mathbb{R}^+$

c)  $y = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$

d)  $g^{-1}(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} & \text{für } x \in \mathbb{R}^+ \\ -\frac{1}{\sqrt[3]{-x}} & \text{für } x \in \mathbb{R}^- \end{cases}$ ,  $D_{g^{-1}} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ,  $W_{g^{-1}} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$



93/7. a) und c)

b)  $f^{-1}(x) = x^{-1} = f(x)$ ,  $D_{f^{-1}} = \mathbb{R} \setminus \{0\} = W_{f^{-1}}$

93/8.  $n = -2k+1, k \in \mathbb{N}$

$$f_{-2k+1}^{-1}(x) = \begin{cases} x^{-\frac{1}{2k+1}} & \text{für } x \in \mathbb{R}^+ \\ -(-x)^{-\frac{1}{2k+1}} & \text{für } x \in \mathbb{R}^- \end{cases}, \quad W_{f_{-2k+1}^{-1}} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Aufgaben zu 5.1

98/1. a)  $\{8\}$       b)  $\{-5; 5\}$       c)  $\{2\}$

2. a)  $\{-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\}$       b)  $\{\frac{7}{4}\}$       c)  $\{\frac{4}{3}\}$

3. a)  $\{-\frac{1}{3}\sqrt{3}; \frac{1}{3}\sqrt{3}\}$       b)  $\{-\sqrt{2}; \sqrt{2}\}$       c)  $\{\sqrt[9]{129}\}$

99/4. a)  $\{-1\}$       b)  $\{\}$       c)  $\{-2\}$

5. a)  $\{-\frac{1}{5}\sqrt[4]{125}; \frac{1}{5}\sqrt[4]{125}\}$       b)  $\{-\sqrt[3]{4}; \sqrt[3]{4}\}$   
c)  $\{-\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\}$       d)  $\{-2\sqrt[5]{2}\}$

6. a)  $\{-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\}$       b)  $\{\frac{3}{2}\}$       c)  $\{-2\}$

7. a)  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$       b)  $\{\frac{1}{2}\}$       c)  $\{-\sqrt[3]{2}; \sqrt[3]{2}\}$

8. a)  $\{-1; 1\}$       b)  $\{-\frac{1}{5}; \frac{1}{5}\}$       c)  $\{-\sqrt[5]{2}; \sqrt[5]{2}\}$

9. a) Gemeinsame Punkte von  $y = x^2$  und  $y = x^3$  sind  $(0|0)$  und  $(1|1)$ .

Also ist das System nur lösbar für  $a = 0$  oder für  $a = 1$ .

Es besitzt dann die Lösung 0 bzw. 1.

I  $x^2 = a$

II  $x^3 = a$


I'  $x^2 = a$

II'  $x^2(x-1) = 0$

$L_{\text{II}'} = \{0; 1\}$

$$L_{\text{I}'} = \begin{cases} \{\}, & \text{falls } a < 0 \\ \{0\}, & \text{falls } a = 0 \\ \{-\sqrt{a}; \sqrt{a}\}, & \text{falls } a > 0. \end{cases}$$

$$L = L_{\text{I}'} \cap L_{\text{II}'} = \begin{cases} \{\}, & \text{falls } a < 0 \\ \{0\}, & \text{falls } a = 0 \\ \{1\}, & \text{falls } a = 1 \\ \{\}, & \text{falls } a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}. \end{cases}$$



- noch **b)** Gemeinsame Punkte von  $y = x^2$  und  $y = x^4$  sind  $(-1|1)$ ,  $(0|0)$  und  $(1|1)$ .

99/9. Also ist das System nur für  $a = 0$  oder  $a = 1$  lösbar.

Es besitzt dann die Lösung 0 bzw. die Lösungen  $-1$  und  $1$ .

$$\text{I } x^2 = a$$

$$\text{II } x^4 = a$$

$$\text{I}' x^2 = a$$

$$\text{II}' x^2(x^2 - 1) = 0$$

$$L_{\text{II}'} = \{-1; 0; 1\}$$

$$L_{\text{I}'} = \begin{cases} \{\}, & \text{falls } a < 0 \\ \{0\}, & \text{falls } a = 0 \\ \{-\sqrt{a}; \sqrt{a}\}, & \text{falls } a > 0. \end{cases}$$

Für  $a > 0$  ist  $L = L_{\text{I}'} \cap L_{\text{II}'} \neq \{\}$ , wenn  $-\sqrt{a} = -1 \vee \sqrt{a} = 1$ , d.h., wenn  $a = 1$ . mit gilt

$$L = \begin{cases} \{\}, & \text{falls } a < 0 \\ \{0\}, & \text{falls } a = 0 \\ \{-1; 1\}, & \text{falls } a = 1 \\ \{\}, & \text{falls } a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}. \end{cases}$$

- c)** Gemeinsame Punkte von  $y = x^3$  und  $y = x^7$  sind  $(-1|-1)$ ,  $(0|0)$  und  $(1|1)$ .

Also ist das System nur lösbar für  $a = -1 \vee a = 0 \vee a = 1$ .

Es besitzt dann die Lösung  $-1$  bzw.  $0$  bzw.  $1$ .

$$\text{I } x^3 = a$$

$$\text{II } x^7 = a$$

$$\text{I}' x^3 = a$$


$$\text{II}' x^3(x^4 - 1) = 0$$

$$L_{\text{II}'} = \{-1; 0; 1\}$$


$$L_{\text{I}'} = \begin{cases} \{-\sqrt[3]{-a}\}, & \text{falls } a < 0 \\ \{0\}, & \text{falls } a = 0 \\ \{\sqrt[3]{a}\}, & \text{falls } a > 0. \end{cases}$$

$L = L_{\text{I}'} \cap L_{\text{II}'} \neq \{\}$ , wenn  $-\sqrt[3]{-a} = -1 \vee \sqrt[3]{a} = 1 \Leftrightarrow a = -1 \vee a = 1$ . Somit gilt

$$L = \begin{cases} \{-1\}, & \text{falls } a = -1 \\ \{0\}, & \text{falls } a = 0 \\ \{1\}, & \text{falls } a = 1 \\ \{\} & \text{sonst.} \end{cases}$$



99.



d) Gemeinsame Punkte von  $y = x$  und  $y = x^3$  sind  $(-1|-1)$ ,  $(0|0)$  und  $(1|1)$ .

Also ist das System nur lösbar für  $a = -1 \vee a = 0 \vee a = 1$ .

Es besitzt dann die Lösung  $-1$  bzw.  $0$  bzw.  $1$ .

$$\text{I} \quad x = a$$

$$\text{II} \quad x^3 = a$$

$$\text{I}' \quad x = a$$

$$\text{II}' \quad x(x^2 - 1) = 0$$

$$L_{\text{II}'} = \{-1; 0; 1\}$$

$$L_{\text{I}'} = \{a\}$$


$L = L_{\text{I}'} \cap L_{\text{II}'} \neq \{\}$ , wenn  $a = -1 \vee a = 0 \vee a = 1$ . Also

$$L = \begin{cases} \{-1\}, & \text{falls } a = -1 \\ \{0\}, & \text{falls } a = 0 \\ \{1\}, & \text{falls } a = 1 \\ \{\} & \text{sonst.} \end{cases}$$

$$99/10. \text{ a) I} \quad x^n = a \quad \Leftrightarrow \quad \text{I}' \quad x^n = a \\ \text{II} \quad x^{n+1} = a \quad \Leftrightarrow \quad \text{II}' \quad x^n(x-1) = 0$$

$$L_{\text{II}'} = \{0; 1\}$$

Für  $L_{\text{I}'}$  erhält man mit  $k \in \mathbb{N}$  folgendes Schema:



$$L = L_{\text{I}'} \cap L_{\text{II}'}$$

$a = 0$ :  $L = \{0\}$ , eine Lösung

$a < 0$ :  $L = \{\}$ , keine Lösung

$a > 0$ :  $L \neq \{\}$ , wenn  $\sqrt[n]{a} = 1 \Leftrightarrow a = 1$ . Also

$a = 1$ :  $L = \{1\}$ , eine Lösung

$a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ :  $L = \{\}$ , keine Lösung

Zusammenfassung:

$a$	$-\infty < a <$	$0$	$< a <$	$1$	$< a < +\infty$
$L$	$\{\}$	$\{0\}$	$\{\}$	$\{1\}$	$\{\}$

$$\text{b) I } x^n = a \quad \Leftrightarrow \quad \text{I}' \quad x^n = a \\ \text{II } x^{n+2} = a \quad \Leftrightarrow \quad \text{II}' \quad x^n(x^2 - 1) = 0$$

$L_{\text{I}'}$  stimmt mit  $L_{\text{I}'}$  aus Aufgabe a) überein.

$$L_{\text{II}'} = \{-1; 0; 1\}$$

$$L = L_{\text{I}'} \cap L_{\text{II}'}$$

$a = 0$ :  $L = \{0\}$ , eine Lösung

$a < 0$ :  $L \neq \{\}$ , wenn  $\sqrt[n]{-a} = -1 \Leftrightarrow a = -1$

$a = -1$ :  $L = \{-1\}$ , eine Lösung

$a \in \mathbb{R}^- \setminus \{-1\}$ :  $L = \{\}$ , keine Lösung

$a > 0$ :  $L \neq \{0\}$ , wenn  $\sqrt[n]{a} = -1 \vee \sqrt[n]{a} = 1 \Leftrightarrow a = 1$

$a = 1$ :  $L = \{-1; 1\}$ , zwei Lösungen

$a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ :  $L = \{\}$ , keine Lösung

Zusammenfassung:

$a$	$-\infty < a <$	$-1$	$< a <$	$0$	$< a <$	$1$	$< a < +\infty$
$L$	$\{\}$	$\{-1\}$	$\{\}$	$\{0\}$	$\{\}$	$\{-1; 1\}$	$\{\}$

$$\text{c) I } x^n = a \quad \Leftrightarrow \quad \text{I}' \quad x^n = a \\ \text{II } x^{n+m} = a \quad \Leftrightarrow \quad \text{II}' \quad x^n(x^m - 1) = 0$$

$L_{\text{I}'}$  wie in Aufgabe a).

$$L_{\text{II}'} = \begin{cases} L_{\text{II}'} & \text{aus Aufgabe a), falls } m \text{ ungerade} \\ L_{\text{II}'} & \text{aus Aufgabe b), falls } m \text{ gerade} \end{cases}$$

Somit gilt

$$L = \begin{cases} L & \text{aus Aufgabe a), falls } m \text{ ungerade} \\ L & \text{aus Aufgabe b), falls } m \text{ gerade} \end{cases}$$

99/11. Sie ist nur richtig im Fall  $n$  ungerade und  $a \geq 0$ .

Im Fall  $n$  ungerade und  $a < 0$  muß sie lauten:

Die Gleichung  $x^n = a$  hat die Lösung  $\sqrt[n]{-a}$ .

Im Fall  $n$  gerade und  $a \geq 0$  muß sie lauten:

Die Gleichung  $x^n = a$  hat die Lösungen  $-\sqrt[n]{a}$  und  $\sqrt[n]{a}$ .

Im Fall  $n$  gerade und  $a < 0$  muß sie lauten:

Die Gleichung  $x^n = a$  hat keine Lösung in  $\mathbb{R}$ .

$$12. \text{ a) } a \neq 0: \quad \{-a; a\} \quad \text{b) } \{a\} \\ a = 0: \quad \{0\}$$

$$\text{c) } a \neq 0: \quad \left\{ -\frac{1}{\sqrt[n]{|a|}}, \frac{1}{\sqrt[n]{|a|}} \right\}$$

$a = 0$ : Die Gleichung ist nicht definiert.

d)  $a < 0$ :  $\{ \}$

$a = 0$ :  $\{0\}$

$a > 0$ :  $\{-\sqrt{a}; \sqrt{a}\}$

e)  $\{\operatorname{sgn} a \cdot \sqrt[3]{|a|}\}$

f)  $a \neq 0$ :  $\left\{-\frac{1}{a^2}\sqrt{|a|}; \frac{1}{a^2}\sqrt{|a|}\right\}$

$a = 0$ :  $\{ \}$

g) Nur definiert für  $a \geq 0$ .

$a = 0$ :  $\{ \}$

$a > 0$ :  $\left\{\frac{1}{\sqrt[3]{a}}\right\}$

h) Nur definiert für  $a \geq 0$ .

$a = 0$ :  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

$a = 1$ :  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

$a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ :  $\{ \}$

i)  $a = 0$ :  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

$a \neq 0$ :  $\{\operatorname{sgn} a \cdot \sqrt[9]{|a|}\}$

99/13. a)  $\{-2; -\sqrt{3}; \sqrt{3}; 2\}$

b)  $\{-1; 2\}$

c)  $\{-1; \frac{1}{2}\}$

d)  $\{-3; 0\}$

e)  $\{-\sqrt[3]{7}; -\frac{1}{2}\sqrt{2}; \frac{1}{2}\sqrt{2}\}$

f)  $\{-1; 1\}$

14. a)  $]-10; +\infty[$

b)  $]-2; +\infty[$

c)  $]-\sqrt{3}; \sqrt{3}[$

d)  $]-\infty; \frac{3}{4}[$

e)  $\{ \}$

f)  $]-\infty; -\frac{1}{2}\sqrt[3]{4}] \cup \mathbb{R}^+$

g)  $\mathbb{R} \setminus \left]-\frac{1}{5}\sqrt[4]{125}; \frac{1}{5}\sqrt[4]{125}\right[$

h)  $]-\sqrt[5]{7}; \sqrt[5]{11}[$

i)  $]-2\sqrt{5}; -1] \cup [1; 2\sqrt{5}[$

15. a)  $[\frac{2}{9}\sqrt{6}; +\infty[$

b)  $]-0; 243[$

c)  $]-2; +\infty[$

d)  $]-1; 2\sqrt[4]{4}[$

e)  $\mathbb{R}_0^+$


f)  $\{ \}$

100/16.

b) 1)  $x < 0$ :  $LS = x \cdot (-1) = -x$ ;  $RS = -x$

$x = 0$ :  $LS = 0$ ;  $RS = 0$

$x > 0$ :  $LS = x \cdot (+1) = x$ ;  $RS = x$



2)  $x < 0$ :  $LS = -x \cdot (-1) = x = RS$

$x = 0$ :  $LS = 0 \cdot 0 = 0 = RS$

$x > 0$ :  $LS = x \cdot (+1) = x = RS$

3)  $x = 0 \vee y = 0$ :  $LS = 0 = RS$

$x > 0 \wedge y > 0$ :  $LS = (+1) \cdot (+1) = 1$ ;  $RS = +1 = 1$

$x > 0 \wedge y < 0$ :  $LS = (+1) \cdot (-1) = -1$ ;  $RS = -1$

$x < 0 \wedge y > 0$ :  $LS = (-1) \cdot (+1) = -1$ ;  $RS = -1$

$x < 0 \wedge y < 0$ :  $LS = (-1) \cdot (-1) = +1$ ;  $RS = +1$

4)  $y \neq 0$

$$x = 0: \quad LS = 0 = RS$$

$$x > 0 \wedge y > 0: \quad LS = \frac{+1}{+1} = 1; \quad RS = +1 = 1$$

$$x > 0 \wedge y < 0: \quad LS = \frac{+1}{-1} = -1; \quad RS = -1$$

$$x < 0 \wedge y > 0: \quad LS = \frac{-1}{+1} = -1; \quad RS = -1$$

$$x < 0 \wedge y < 0: \quad LS = \frac{-1}{-1} = +1; \quad RS = +1$$

5)  $x > 0: \quad LS = +1 = RS$

$$x = 0: \quad LS = \operatorname{sgn}(0^n) = \operatorname{sgn} 0 = 0; \quad RS = 0^n = 0$$

$$x < 0: \quad n \text{ gerade:} \quad n \text{ ungerade:}$$

$$LS = +1; \quad RS = (-1)^n = +1$$

$$LS = -1; \quad RS = (-1)^n = -1$$

6)  $x > 0: \quad LS = \frac{1}{+1} = 1 = RS$

$$x < 0: \quad LS = \frac{1}{-1} = -1 = RS$$

103/22

100/17. a)  $f^{-1}(x) = \operatorname{sgn} x \cdot \sqrt[3]{|x|}$

b)  $f^{-1}(x) = \operatorname{sgn} x \cdot |x|^{\frac{1}{2z+1}}$

Dabei gilt:  $D_{f^{-1}} = \mathbb{R}$  für  $z \in \mathbb{N}_0$

$D_{f^{-1}} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$  für  $z \in \mathbb{Z}^-$

### Aufgaben zu 5.2

103/1. a)  $\xi_1 = -2$

b) 
$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline x_0 & \frac{1}{x} & \times & 1 & 0 & + & 9 & = & \sqrt{\phantom{x}} & +/ - \\ \hline \end{array}$$

$$x_{12} = -2,0009524 \dots$$

c)  $f(x) := x^3 - 9x - 10$

$x$	-3	-2	-1,5	-1	0	1	2	3	4
$f(x)$	-10	0	0,125	-2	-10	-18	-20	-10	18

Lösungen liegen in  $]-1,5; -1[$  und in  $]3; 4[$ .

1)  $x^3 - 9x - 10 = 0$

$$x = \frac{10}{x^2 - 9} \Rightarrow x_{n+1} = \frac{10}{x_n^2 - 9}$$

$$x_0 \quad x^2 \quad - \quad 9 \quad = \quad \div \quad 1 \quad 0 \quad = \quad \frac{1}{x}$$

$$x_0 = -1,5$$

8

$$x_{10} = -1,449 \dots$$

Da  $f(-1,449) < 0$  und  $f(-1,450) > 0$ , gilt  $\xi_2 = -1,449 \dots$

(Näherung für  $\xi_2 = 1 - \sqrt{6}$ )

$$2) \quad x = \sqrt[3]{9x + 10} \quad \Rightarrow \quad x_{n+1} = \sqrt[3]{9x_n + 10}$$

$x_0$     $\times$    9    $+$    1   0   =   INV    $y^x$    3   =

$$x_0 = 3$$

•

$$x_5 = 3,449 \dots$$

Da  $f(3,449) < 0$  und  $f(3,450) > 0$ , gilt  $\xi_3 = 3,449 \dots$

(Näherung für  $\xi_3 = 1 + \sqrt{6}$ )

$$103/2. \text{ a) } x_0 \boxed{x} \boxed{(+x^2)} \boxed{+} \boxed{6} \boxed{)} \boxed{-} \boxed{6} \boxed{0} \boxed{=} \boxed{+/-} \boxed{\div} \boxed{3} \boxed{6} \boxed{=} \boxed{\frac{1}{x}}$$

$$x_4 = 0,6443 \dots$$

Da  $f(0,6443) > 0$  und  $f(0,6444) < 0$ , gilt  $\xi_1 \approx 0,6443$ .

b)  $x_0$    $\times$     $-$     $=$   $\div$   $($    $x^2$   $+$    $)$   $=$    $\checkmark$

$$x_2 = 3,0998 \dots$$

Da  $f(3,0998) < 0$  und  $f(3,0999) > 0$ , gilt  $\xi_2 \approx 3,0998$ .

c)  $x_0$   $\boxed{M}$   $\times$   $1$   $0$   $-$   $\boxed{\text{MR}}$   $x^2$   $-$   $6$   $=$   $\times$   $6$   $=$   $\boxed{\text{INV}}$   $y^x$   $4$   $=$

$$x_5 = 3,0998 \dots$$

Da  $f(3,0998) < 0$  und  $f(3,0999) > 0$ , gilt  $\xi_2 \approx 3,0998$ .


$$3. \quad \frac{1}{3}x^2\pi(3r-x) = \frac{4}{3}r^3\pi\rho, \quad 0 \leq x \leq 2r$$

$$x^3 - 3rx^2 + 4r^3\rho = 0$$

$$r = 1 \text{ dm}, \quad \rho = 0.75 \text{ kg/dm}^3 \quad \text{liefert} \quad x^3 - 3x^2 + 3 = 0$$

$x$	0	1	2
$x^3 - 3x^2 + 3$	3	1	-1

$$x^2(x-3)+3=0 \quad \Rightarrow \quad x_{n+1} = \sqrt{\frac{3}{3-x_n}}$$



Startwert  $x_0 = 1,5$

$x_{10} = 1,347316 \dots$

Da  $LS(1,34725) > 0$  und  $LS(1,34735) < 0$ , gilt  $x \approx 1,3473$ .

**Zur Fußnote:**

$$\frac{\frac{1}{3}(2r-x)^2\pi(r+x)}{\frac{1}{3}x^2\pi(3r-x)} = \frac{m}{n}$$

$$3rx^2 - x^3 = 4 \frac{n}{m+n} r^3$$

**Aufgaben zu 5.3**

109/1. a)  $\{-2; 1; 2\}; (x+2)(x-1)(x-2)$

b)  $\{-1; 2\}; (x+1)^2(x-2)$

c)  $\{-3; -1; 2\}; (x+3)(x+1)^2(x-2)$

2. a)  $x^3 - 3x^2 - x + 3 = 0$

b)  $x^3 + 5x^2 - 25x - 125 = 0$

c)  $x^3 - \frac{7}{2}x^2 + \frac{7}{2}x - 1 = 0$

d)  $x^4 - 5x^3 + 4x^2 + 10x - 12 = 0$

e)  $x^5 - 10x^4 + 35x^3 - 50x^2 + 24x = 0$

3. a) 1fach

b) 2fach

c) 3fach

4.  $(\sqrt{2})^3 - 3\sqrt{2} - a = 0 \Leftrightarrow a = -\sqrt{2}$

I  $-(\sqrt{2} + x_2 + x_3) = 0$

II  $-\sqrt{2}x_2x_3 = \sqrt{2}$

$x_2$  und  $x_3$  sind die Lösungen von  $x^2 + \sqrt{2}x - 1 = 0$ :

$x_2 = -\frac{1}{2}\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1), \quad x_3 = \frac{1}{2}\sqrt{2}(\sqrt{3} - 1)$

5.  $x_2 = -x_1 \Rightarrow \begin{cases} \text{I} & -(x_1 + x_2 + x_3) = a \Leftrightarrow x_3 = -a \\ \text{II} & -(-x_1 x_2 x_3) = 160 \Leftrightarrow x_1^2 x_3 = 160 \end{cases}$

Ferner: III  $x_3 = -a$  ist Lösung  $\Leftrightarrow -a^3 + a^3 + 16a + 160 = 0$

III'  $a = -10$

I'  $x_3 = -10$

II'  $x_1^2 = 16 \Leftrightarrow x_1 = -4 \vee x_1 = 4$

Somit  $a = -10$  und  $L = \{-10; -4; 4\}$

$$109/6. (x - x_1)^3(x - x_4) = x^4 - x^3(3x_1 + x_4) + 3x^2(x_1 x_4 + x_1^2) - x(3x_1^2 x_4 + x_1^3) + x_1^3 x_4$$

Koeffizientenvergleich:

$$I \quad 3x_1 + x_4 = 5$$

$$II \quad 3(x_1 x_4 + x_1^2) = 6$$

$$III \quad -(3x_1^2 x_4 + x_1^3) = a$$

$$IV \quad x_1^3 x_4 = b$$

$$1. \text{Lösung: } a = -\frac{11}{4}, \quad b = \frac{7}{16}; \quad x_1 = x_2 = x_3 = \frac{1}{2}, x_4 = \frac{7}{2}$$

$$2. \text{Lösung: } a = 4, \quad b = -8; \quad x_1 = x_2 = x_3 = 2, x_4 = -1$$

$$7. \text{ a) } a = -2; \quad b = -1; \quad c = 2$$

$$\text{b) } a = -4; \quad b = 5; \quad c = -2$$

$$\text{c) } x_1 = -x_2 \wedge x_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, i \in \{1; 2\}$$

$$\left. \begin{array}{l} a = -x_3 \\ b = -x_1^2 \\ c = -x_1^2 x_3 \end{array} \right\} \Rightarrow c = ab$$

$b$  muß eine negative ganze Quadratzahl sein, also  $b = -k^2, k \in \mathbb{N}$ .

Dann ist  $c = -ak^2$  und  $a$  beliebig aus  $\mathbb{R}$ .

Die Gleichung lautet somit

$$x^3 + ax^2 - k^2 x - ak^2 = 0$$

$$x^2(x + a) - k^2(x + a) = 0$$

$$(x^2 - k^2)(x + a) = 0$$

$$L = \{-k; k; -a\}$$

$$\text{Beispiel: } x^3 + \frac{2}{7}x^2 - 9x - \frac{18}{7} = 0$$

$$110/8. \text{ 1) a) } y := 2x \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}y$$

$$2\left(\frac{y}{2}\right)^3 - \left(\frac{y}{2}\right)^2 - 18 \cdot \frac{y}{2} + 9 = 0$$

$$y^3 - y^2 - 36y + 36 = 0$$

$-6, 1, 6$  sind Lösungen, wie man durch Einsetzen nachweist.

$$\text{b) } y := \frac{1}{2}x \Leftrightarrow x = 2y$$

$$16y^3 - 4y^2 - 36y + 9 = 0$$

Lösungen sind  $-\frac{3}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{2}$ .

$$\text{c) } y := x + 1 \Leftrightarrow x = y - 1$$

$$2(y - 1)^3 - (y - 1)^2 - 18(y - 1) + 9 = 0$$

$$2y^3 - 7y^2 - 10y + 24 = 0$$

Lösungen sind  $-2, \frac{3}{2}, 4$ .

$$2) \text{ a) } y := 2x \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}y$$

$$y^4 - 2y^3 + 8y^2 - 6y + 2 = 0$$

b)  $y := \frac{1}{2}x \Leftrightarrow x = 2y$   
 $128y^4 - 64y^3 + 64y^2 - 12y + 1 = 0$

c)  $y := x + 1 \Leftrightarrow x = y - 1$   
 $8y^4 - 40y^3 + 88y^2 - 94y + 39 = 0$

110/9. a)  $y := x - 3 \Leftrightarrow x = y + 3$   
 $y^4 + 16y^3 + 71y^2 - 4y - 420 = 0$

b)  $y := x + 3 \Leftrightarrow x = y - 3$   
 $y^4 - 8y^3 - y^2 + 8y = 0$

10.  $y := x\sqrt{3} \Leftrightarrow x = \frac{y}{\sqrt{3}}$   
 $y^3 - 3y^2 + \frac{26}{9}y - \frac{8}{9} = 0$   
 $9y^3 - 27y^2 + 26y - 8 = 0$

$\frac{p}{q}$  ist Lösung, wenn  $p$  Teiler von  $-8$  und  $q$  Teiler von  $9$  ist.

Das ergibt folgende Möglichkeiten:

$$\begin{aligned} &\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8 \\ &\pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}, \pm \frac{4}{3}, \pm \frac{8}{3} \\ &\pm \frac{1}{9}, \pm \frac{2}{9}, \pm \frac{4}{9}, \pm \frac{8}{9} \end{aligned}$$

$y_1 = 1: 9 - 27 + 26 - 8 = 0$ . Also ist  $y_1 = 1$  Lösung.

Die Polynomdivision liefert

$$9y^3 - 27y^2 + 26y - 8 = (y - 1) \cdot (9y^2 - 18y + 8)$$

$$9y^2 - 18y + 8 = 0 \text{ liefert } y_2 = \frac{2}{3}, y_3 = \frac{4}{3}$$

$$\text{Damit ist } x_1 = \frac{1}{3}\sqrt{3}, x_2 = \frac{2}{9}\sqrt{2}, x_3 = \frac{4}{9}\sqrt{3}.$$

11. a) Nach Satz 108.1 muß  $q$  Teiler von  $a_3 = 1$ ,  $p$  Teiler von  $-27$  sein.

Also ist  $\frac{p}{q}$  ganz.

b)  $\pm 1, \pm 3, \pm 9, \pm 27$

c) Durch Probieren:  $x_1 = -1$  ist Lösung.

Nach Satz 106.2 ergibt sich

$$\begin{aligned} -(-1 + x_2 + x_3) &= 7 \Leftrightarrow x_2 + x_3 = -6 \\ -(-1 \cdot x_2 x_3) &= -27 \Leftrightarrow x_2 x_3 = -27 \end{aligned}$$

d.h.,  $x_2$  und  $x_3$  sind die Lösungen von

$$x^2 + 6x - 27 = 0, \text{ also } x_2 = -9, x_3 = 3.$$

Somit ist  $L = \{-9, -1, 3\}$ .

12.  $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 = 0$ ,  $a_i$  ganz.

Ist  $\frac{p}{q}$  Lösung, wobei die ganzen Zahlen  $p$  und  $q$  teilerfremd sind, so muß nach Satz 108.1  $q$  Teiler von  $a_n = 1$  sein; also gilt:  $q = -1 \vee q = 1$ . Somit ist  $\frac{p}{q}$  ganz.

110/13. a) Mögliche Lösungen:  $\pm 1$

$$x_1 = -1$$

$$(x^3 - 2x - 1) : (x + 1) = x^2 - x - 1$$

$$L = \{-1; \frac{1}{2}(1 - \sqrt{5}); \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})\}$$

$$(x + 1)(x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{5})(x - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{5})$$

b) Mögliche Lösungen:  $\pm 1, \pm 3, \pm 9$

$$x_1 = -3$$

$$(x^3 + 2x^2 - 6x - 9) : (x + 3) = x^2 - x - 3$$

$$L = \{-3; \frac{1}{2}(1 - \sqrt{13}); \frac{1}{2}(1 + \sqrt{13})\}$$

$$(x + 3)(x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{13})(x - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{13})$$

c) Mögliche Lösungen:  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12, \pm 24$

$$x_1 = 2$$

$$(x^3 - 9x^2 + 26x - 24) : (x - 2) = x^2 - 7x + 12$$

$$L = \{2, 3, 4\}$$

$$(x - 2)(x - 3)(x - 4)$$

d) Mögliche Lösungen:  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$

$$x_1 = 1$$

$$(x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6) : (x - 1) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$$

Weitere mögliche Lösungen:  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$

$$x_2 = -1$$

$$(x^3 + 2x^2 - 5x - 6) : (x + 1) = x^2 + x - 6$$

$$L = \{-3, -1, 1, 2\}$$

$$(x + 3)(x + 1)(x - 1)(x - 2)$$

14. a) Mögliche Lösungen:  $\pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{4}$

$$x_1 = -1$$

$$(4x^5 - 9x^3 - 4x^2 + 2x + 1) : (x + 1) = 4x^4 - 4x^3 - 5x^2 + x + 1$$

Weitere mögliche Lösungen:  $\pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{4}$

$$x_2 = \frac{1}{2}$$

$$(4x^4 - 4x^3 - 5x^2 + x + 1) : (x - \frac{1}{2}) = 4x^3 - 2x^2 - 6x - 2$$

Weitere mögliche Lösungen:  $\pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{4}$ , wobei  $\pm 2$  ausscheidet.

$$x_3 = -\frac{1}{2}$$

$$(4x^3 - 2x^2 - 6x - 2) : (x + \frac{1}{2}) = 4x^2 - 4x - 1$$

$$L = \{-1; \frac{1}{2}(1 - \sqrt{5}); -\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})\}$$

$$4(x + 1)(x + \frac{1}{2})(x - \frac{1}{2})(x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{5})(x - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{5}) =$$

$$= (x + 1)(x + \frac{1}{2})(x - \frac{1}{2})(2x - 1 + \sqrt{5})(2x - 1 - \sqrt{5})$$

b) Mögliche Lösungen:  $\pm 1, \pm \frac{1}{2}$

$$x_1 = -1$$

$$(2x^3 - x + 1) : (x + 1) = 2x^2 - 2x + 1$$

Diskriminante  $= 4 - 8 < 0$ ; es existieren keine weiteren reellen Lösungen.

$$L = \{-1\}$$

$$(x+1)(2x^2 - 2x + 1)$$

c) Mögliche Lösungen:  $\pm 1, \pm 3, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$

$$x_1 = \frac{3}{2}$$

$$(2x^3 - 3x^2 + 2x - 3) : (x - \frac{3}{2}) = 2x^2 + 2$$

Es existieren keine weiteren reellen Lösungen.

$$L = \{\frac{3}{2}\}$$

$$(x - \frac{3}{2})(2x^2 + 2) = (2x - 3)(x^2 + 1)$$

d) Mögliche Lösungen:  $\pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}, \pm \frac{1}{9}, \pm \frac{2}{9}, \pm \frac{1}{27}, \pm \frac{2}{27}$

$$x_1 = 1$$

$$(27x^4 - 27x^3 - 9x^2 + 11x - 2) : (x - 1) = 27x^3 - 9x + 2$$

$$x_2 = \frac{1}{3}$$

$$(27x^3 - 9x + 2) : (x - \frac{1}{3}) = 27x^2 + 9x - 6$$

$$x_3 = -\frac{2}{3}; \quad x_4 = \frac{1}{3}$$

$$L = \{-\frac{2}{3}; \frac{1}{3}; 1\}$$

$$27(x - \frac{1}{3})^2(x + \frac{2}{3})(x - 1) = (3x - 1)^2(3x + 2)(x - 1)$$

## Lösungen von 111/15–19 ab der 4. Auflage siehe Seite 110

111/15. a)  $+ - - + + -$  3 Wechsel: 3 oder 1 positive Lösung  
2 Wiederholungen: 2 oder 0 negative Lösungen

Ganzzahlig möglich:  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$

$$x_1 = 1$$

$$(x^5 - 3x^4 - 5x^3 + 15x^2 + 4x - 12) : (x - 1) = x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12$$

$$x_2 = -1$$

$$(x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12) : (x + 1) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$$

$$x_3 = 2$$

$$(x^3 - 3x^2 - 4x + 12) : (x - 2) = x^2 - x - 6$$

$$x_4 = -2, \quad x_5 = 3$$

$$L = \{-2, -1, 1, 2, 3\}$$

b)  $+ + - - +$  2 Wechsel: 2 oder 0 positive Lösungen  
2 Wiederholungen: 2 oder 0 negative Lösungen

Ganzzahlig möglich:  $\pm 1, \pm 2, \pm 4$

$$x_1 = 1$$

$$(x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4) : (x - 1) = x^3 + 3x^2 - 4$$

$$x_2 = 1$$

$$(x^3 + 3x^2 - 4) : (x - 1) = x^2 + 4x + 4$$

$$x_3 = x_4 = -2$$

$$L = \{-2; 1\}$$

c)  $+$   $-$   $+$   $+$   $-$  3 Wechsel: 3 oder 1 positive Lösung

1 Wiederholung: 1 negative Lösung

Ganzzahlig möglich:  $\pm 1, \pm 3, \pm 9$

$$x_1 = 1$$

$$(x^4 - 6x^3 + 8x^2 + 6x - 9) : (x - 1) = x^3 - 5x^2 + 3x + 9$$

$$x_2 = -1$$

$$(x^3 - 5x^2 + 3x + 9) : (x + 1) = x^2 - 6x + 9$$

$$x_3 = x_4 = 3$$

$$L = \{-1; 1; 3\}$$

d)  $+$   $\bullet$   $\bullet$   $+$

$+$   $+$   $+$   $+$  kein Wechsel: 0 positive Lösungen

3 Wiederholungen: 3 oder 1 negative Lösung

$+$   $-$   $+$   $+$  2 Wechsel: 2 oder 0 positive Lösungen

1 Wiederholung: 1 negative Lösung

Also: 1 negative Lösung, keine positive Lösung

$$L = \{-1\}$$

e)  $+$   $\bullet$   $-$   $\bullet$   $+$   $\bullet$   $-$

$+$   $-$   $-$   $-$   $+$   $-$   $-$  3 Wechsel: 3 oder 1 positive Lösung

3 Wiederholungen: 3 oder 1 negative Lösung

Auch die anderen Besetzungen der Leerstellen ergeben keine andere Aussage.

Ganzzahlig möglich:  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 9, \pm 12, \pm 18, \pm 36$

$$x_1 = 1$$

$$(x^6 - 14x^4 + 49x^2 - 36) : (x - 1) = x^5 + x^4 - 13x^3 - 13x^2 + 36x + 36$$

$$x_2 = -1$$

$$(x^5 + x^4 - 13x^3 - 13x^2 + 36x + 36) : (x + 1) = x^4 - 13x^2 + 36$$

Biquadratische Gleichung, also

$$x^2 = 4 \vee x^2 = 9 \Leftrightarrow x_3 = -2, x_4 = 2, x_5 = -3, x_6 = 3$$

Somit  $L = \{-3, -2, -1, 1, 2, 3\}$ .

f)  $+$   $\bullet$   $\bullet$   $\bullet$   $-$   $+$

$+$   $+$   $+$   $+$   $-$   $+$  2 Wechsel: 2 oder 0 positive Lösungen

3 Wiederholungen: 3 oder 1 negative Lösung

$+$   $-$   $+$   $-$   $-$   $+$  4 Wechsel: 4, 2 oder 0 positive Lösungen

1 Wiederholung: 1 negative Lösung

Somit: 1 negative Lösung, 2 oder 0 positive Lösungen

Ganzzahlig möglich:  $\pm 1, \pm 2, \pm 11, \pm 22$

$$x_1 = -2$$

$$(x^5 - 5x + 22) : (x + 2) = x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 8x + 11$$

Die möglichen positiven ganzzahligen Lösungen 1 und 11 sind keine Lösungen.

Es gilt sogar: Es gibt überhaupt keine positive Lösung.


Beweis:

$$x^5 = 5x - 22 \Leftrightarrow x^5 = 5(x - 4,4)$$

1)  $0 < x \leq 4,4$ : LS > 0, RS  $\leq 0$

2) Für  $x > 4,4$  gilt:

$$\text{LS} = x^5 = x^4 \cdot x > 5x > 5x - 22 = \text{RS}$$



111

Anschaulich: Der Graph  $y = x^5$  liegt für  $x > 0$  immer über dem Graphen  $y = 5x - 22$ .

ab 4. Auflage: siehe Seite 110

**111/16. a)** + + + - 1 Wechsel: 1 positive Lösung  
2 Wiederholungen: 2 oder 0 negative Lösungen

Möglich:  $\pm \frac{1}{3}, \pm 1$

$$x_1 = \frac{1}{3}$$

$$(3x^3 + 5x^2 + 7x - 3) : (x - \frac{1}{3}) = 3x^2 + 6x + 9$$

$$\text{Diskriminante} = 36 - 4 \cdot 3 \cdot 9 < 0$$

$$L = \{\frac{1}{3}\}$$

**b)** + + - - 1 Wechsel: 1 positive Lösung  
2 Wiederholungen: 2 oder 0 negative Lösungen

Möglich:  $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm \frac{1}{2}$

$$x_1 = 2$$

$$(2x^3 + x^2 - 8x - 4) : (x - 2) = 2x^2 + 5x + 2$$

$$L = \{-2, -\frac{1}{2}, 2\}$$

**c)** + - - + 2 Wechsel: 2 oder 0 positive Lösungen  
1 Wiederholung: 1 negative Lösung

Möglich:  $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}, \pm \frac{4}{3}, \pm \frac{1}{9}, \pm \frac{2}{9}, \pm \frac{4}{9}$

$$x_1 = 1$$

$$(9x^3 - 9x^2 - 4x + 4) : (x - 1) = 9x^2 - 4$$

$$L = \{-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, 1\}$$

**d)** + - + - + 4 Wechsel: 4, 2 oder 0 positive Lösungen  
0 Wiederholungen: 0 negative Lösungen

Möglich:  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}, \frac{1}{64}$

$$x_1 = \frac{1}{2}$$

$$(64x^4 - 128x^3 - 84x^2 - 20x + 1) : (x - \frac{1}{2}) = 64x^3 - 96x^2 + 36x - 2$$

$+$   $-$   $+$   $-$       3 Wechsel:      3 oder 1 positive Lösung  
 0 Wiederholung:      keine negative Lösung

$$x_2 = \frac{1}{2}$$

$$(64x^3 - 96x^2 + 36x - 2) : (x - \frac{1}{2}) = 64x^2 - 64x + 4$$

$$L = \{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\sqrt{3}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{3}\}$$

↑  
x

111/17. a)  $+$   $\bullet$   $\bullet$   $\bullet$   $+$   $+$

$+$   $+$   $+$   $+$   $+$   $+$       kein Wechsel:      keine positive Lösung

$+$   $-$   $+$   $-$   $+$   $+$       1 Wiederholung: 1 negative Lösung


Rationale Lösungen können nur  $-1$  oder  $1$  sein.

Beide Werte erfüllen die Gleichung nicht.

22

ab 4. Auflage: siehe Seite 110

b) 1)



2)  $x_0 = -0,75$

$$x_1 = -0,7578583 \dots \quad x_{13} = -0,7548866 \dots$$

$$x_2 = -0,7530329 \dots \quad x_{14} = -0,7548722 \dots$$

$$x_3 = -0,7560105 \dots \quad x_{15} = -0,7548810 \dots$$

$$x_4 = -0,7541786 \dots \quad x_{16} = -0,7548756 \dots$$

$$x_5 = -0,7553077 \dots \quad x_{17} = -0,7548789 \dots$$

$$x_6 = -0,7546126 \dots \quad x_{18} = -0,7548769 \dots$$

$$x_7 = -0,7550409 \dots \quad x_{19} = -0,7548782 \dots$$

$$x_8 = -0,7547771 \dots \quad x_{20} = -0,7548774 \dots$$

$$x_9 = -0,7549396 \dots \quad x_{21} = -0,7548779 \dots$$

$$x_{10} = -0,7548395 \dots \quad x_{22} = -0,7548776 \dots$$

$$x_{11} = -0,7549012 \dots \quad x_{23} = -0,7548777 \dots$$

$$x_{12} = -0,7548632 \dots \quad x_{24} = -0,7548776 \dots$$

Da  $f(-0,7548785) < 0$  und  $f(-0,7548775) > 0$ , gilt als Näherungswert  
 $x = -0,754878$ .

3)  $x_0 = -0,75$

$$x_1 = -0,7626953 \dots \quad x_4 = -0,7200456 \dots$$

$$x_2 = -0,7419194 \dots \quad x_5 = -0,8064469 \dots$$

$x_3 = -0,7752066 \dots$       Die Folge divergiert.

$$\begin{aligned} \text{c)} \quad x^5 + x + 1 &=: (x^2 + \alpha x + 1)(x^3 + Ax^2 + Bx + 1) = \\ &= x^5 + (A + \alpha)x^4 + (\alpha A + B + 1)x^3 + (A + \alpha B + 1)x^2 + (\alpha + B)x + 1 \end{aligned}$$

Koeffizientenvergleich:

- I  $A + \alpha = 0$
- II  $\alpha A + B + 1 = 0$
- III  $A + \alpha B + 1 = 0$
- IV  $\alpha + B = 1$

Aus I, II und IV erhält man

$$\alpha^2 + \alpha - 2 = 0 \Leftrightarrow \alpha = -2 \vee \alpha = 1.$$

Damit ergibt sich  $(A = 2 \wedge B = 3) \vee (A = -1 \wedge B = 0)$ .

Die 1. Möglichkeit erfüllt III nicht, die 2. jedoch. Somit gilt

$$x^5 + x + 1 = (x^2 + x + 1)(x^3 - x^2 + 1).$$

$x^2 + x + 1 = 0$  hat keine reelle Lösung, da die Diskriminante  $= -3$  ist.

$$x^3 - x^2 + 1 = 0 \text{ wird mit } x = y + \frac{1}{3} \text{ zu } y^3 - \frac{1}{3}y + \frac{25}{27} = 0.$$

Die einzige reelle Lösung liefert schließlich

$$x = \frac{1}{3} - \sqrt[3]{\frac{25}{54} - \frac{1}{18}\sqrt{69}} - \sqrt[3]{\frac{25}{54} + \frac{1}{18}\sqrt{69}}.$$

**111/18.** + ● + ● + ● +

+ + + + + + + kein Wechsel: 0 positive Lösungen

+ - + - + - + keine Wiederholung: 0 negative Lösungen

Leichter sieht man das so ein:

$$2x^6 + 10x^4 + 7x^2 = -1$$

LS  $\geq 0$ , RS  $< 0$ , also  $L = \{ \}$ .

ab 4. Auflage: siehe Seite 110

- 19.** Eine algebraische Gleichung vom Grad  $2k - 1$ ,  $k \in \mathbb{N}$ , hat  $2k$  Koeffizienten. Es gibt also  $2k - 1$  Stellen, an denen eine Vorzeichenwiederholung oder ein Vorzeichenwechsel stattfinden können. Da die Anzahl der Wechsel und die Anzahl der Wiederholungen den Grad der Gleichung ergeben, ist eine dieser Anzahlen immer ungerade. Somit gibt es mindestens eine positive oder mindestens eine negative Lösung.

#### Aufgaben zu 5.4

##### 114/Fußnote\*\*\*

$$y^4 + 6y^2 + 36 = 60y$$

Die linke Seite wird ein Quadrat durch Addition von  $6y^2$ :

$$y^4 + 12y^2 + 36 = 6y^2 + 60y$$

$$(y^2 + 6)^2 = 6y^2 + 60y$$

Das linke Binom  $y^2 + 6$  wird durch Addition von  $\eta$  zu einem Trinom  $y^2 + 6 + \eta$ . Dabei soll  $\eta$  so gewählt werden, daß die rechte Seite auch in ein Quadrat verwandelt werden kann.

$$(y^2 + 6 + \eta)^2 = 6y^2 + 60y + 2y^2\eta + 12\eta + \eta^2$$

$$(y^2 + 6 + \eta)^2 = (2\eta + 6)y^2 + 60y + (12\eta + \eta^2) \quad (*)$$

Damit die rechte Seite als Quadrat  $\alpha^2 y^2 + 2\alpha\beta y + \beta^2$  geschrieben werden kann, muß für  $\eta$  gelten:

$$4\alpha^2\beta^2 = 60^2$$

$$4(2\eta + 6)(12\eta + \eta^2) = 3600$$

$$\eta^3 + 15\eta^2 + 36\eta = 450$$

Durch die Substitution  $\zeta := \eta + 5$  verwandelt man diese kubische »Resolvente« in  $\zeta^3 - 39\zeta - 380 = 0$ .

Die Formel von CARDANO liefert dann

$$\zeta = \sqrt[3]{190 + \sqrt{33903}} + \sqrt[3]{190 - \sqrt{33903}}. \quad (**)$$

Mit  $\eta = \zeta - 5$  wird (\*) zu

$$(y^2 + \zeta + 1)^2 = (y\sqrt{2\zeta - 4} + \sqrt{(\zeta - 5)(\zeta + 7)})^2$$

$$y^2 + \zeta + 1 = \pm (y\sqrt{2\zeta - 4} + \sqrt{(\zeta - 5)(\zeta + 7)})$$

$$y^2 \mp y\sqrt{2\zeta - 4} + \zeta + 1 \mp \sqrt{(\zeta - 5)(\zeta + 7)} = 0$$

Die Diskriminante ergibt sich zu

$$-2\zeta - 8 \pm 4\sqrt{(\zeta - 5)(\zeta + 7)}.$$

Diese wird für das untere Vorzeichen negativ, so daß nur das obere Vorzeichen reelle Lösungen liefern kann:

$$y_{1,2} = \frac{1}{2} \left\{ \sqrt{2\zeta - 4} \pm \sqrt{4\sqrt{(\zeta - 5)(\zeta + 7)} - 2\zeta - 8} \right\}$$

Setzt man hier den Wert für  $\zeta$  aus (\*\*) ein, so hat man die beiden Lösungen exakt durch Wurzeln ausgedrückt.

Als Näherungswerte liefert der Taschenrechner

$$\zeta = 9,009791228$$

$$y_1 = 3,099874424$$

$$y_2 = 0,644398864.$$

Dazu gehören die beiden anderen Zahlen

$$x_1 \approx 1,935562278 \quad \text{und} \quad z_1 \approx 4,964563299 \quad \text{bzw.}$$

$$x_2 \approx 9,311003374 \quad \text{und} \quad z_2 \approx 0,044597761.$$

120/1. a)	$n$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	$n^3 + n^2$	2	12	36	80	150	252	392	576	810

b) 1) I  $z = 12x$

II  $xy + xyz = 1\frac{1}{6}$

III  $y = \frac{2}{3}$

$z^3 + z^2 = 252$

$z = 6$  [Ellen]

$$2) (z^3 + z^2 - 252) : (z - 6) = z^2 + 7z + 42$$

$$\text{Diskriminante} = 49 - 4 \cdot 42 < 0$$

Keine weitere reelle Lösung

$$3) x = \frac{1}{2} \text{ [GAR]}; \quad y = \frac{1}{3} \text{ [GAR]}$$

$$c) \begin{array}{l} \text{I} \quad 12x + 1 = z \\ \text{II} \quad x^2 z = 1 \frac{3}{4} \end{array}$$

$$\underline{48x^3 + 4x^2 = 7 \quad || \cdot 36}$$

$$1728x^3 + 144x^2 = 252$$

$$(12x)^3 + (12x)^2 = 252$$

Aus der Tabelle ergibt sich

$$12x = 6, \quad \text{also} \quad x = \frac{1}{2} \text{ [GAR]} \quad \text{und} \quad z = 7 \text{ [Ellen]}$$

$$121/2. \quad \begin{array}{l} \text{I} \quad 3uv = -p \\ \text{II} \quad u^3 + v^3 = -q \end{array}$$

$$\underline{\text{I}' \quad 3uv = -p}$$

$$\underline{\text{II}' \quad u^3 + \left(-\frac{p}{3u}\right)^3 = -q, \quad \text{falls } u \neq 0}$$

$$\text{NR für II': } u^6 + qu^3 - \left(\frac{p}{3}\right)^3 = 0$$

$$u^3 = -\frac{q}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3} =: R_1, \quad \text{falls } D := \left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3 \geq 0$$

$$\text{Aus II: } v^3 = -\frac{q}{2} \mp \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3} =: R_2.$$

Bei der Wahl der unteren Vorzeichen vertauschen  $u$  und  $v$  ihre Rolle. Wir können uns also auf das obere Vorzeichen beschränken, da die Gleichungen I und II in  $u$  und  $v$  symmetrisch sind.

Wir erhalten

$$u = \text{sgn}(R_1) \cdot \sqrt[3]{|R_1|}$$

$$v = \text{sgn}(R_2) \cdot \sqrt[3]{|R_2|}.$$

Einsetzen in I liefert

$$\text{LS} = 3uv =$$

$$= 3 \text{sgn}(R_1) \cdot \text{sgn}(R_2) \cdot \sqrt[3]{|R_1|} \sqrt[3]{|R_2|} =$$

$$= 3 \text{sgn}(R_1 \cdot R_2) \cdot \sqrt[3]{|R_1| \cdot |R_2|} =$$

$$= 3 \text{sgn} \left( \left( -\frac{q}{2} + \sqrt{D} \right) \left( -\frac{q}{2} - \sqrt{D} \right) \right) \cdot \sqrt[3]{|R_1 R_2|} =$$

$$= 3 \text{sgn} \left( \left( -\frac{q}{2} \right)^2 - \left( \frac{q}{2} \right)^2 - \left( \frac{p}{3} \right)^3 \right) \cdot \sqrt[3]{\left| \left( -\frac{q}{2} \right)^2 - \left( \frac{q}{2} \right)^2 - \left( \frac{p}{3} \right)^3 \right|} =$$

$$\begin{aligned}
&= 3 \operatorname{sgn} \left( -\left( \frac{p}{3} \right)^3 \right) \cdot \sqrt[3]{\left| -\left( \frac{p}{3} \right)^3 \right|} = \\
&= -3 \operatorname{sgn}(p) \cdot \sqrt[3]{\left| \frac{p}{3} \right|^3} = \\
&= -3 \operatorname{sgn}(p) \cdot \left| \frac{p}{3} \right| = \\
&= -3 \operatorname{sgn}(p) \cdot \frac{1}{3} |p| = \\
&= -\operatorname{sgn}(p) \cdot |p| = \\
&= -p = \\
&= \text{RS.}
\end{aligned}$$

Also erfüllen  $u$  und  $v$  das System I  $\wedge$  II.

*Sonderfall:*  $u = 0$

Nur möglich, wenn  $p = 0$ . Die Gleichung hat dann die Form  $x^3 + q = 0$ , ist also eine reine kubische Gleichung mit der Lösung  $\operatorname{sgn}(-q) \cdot \sqrt[3]{| -q |}$ .

121/3. a)  $+$   $+$   $+$   $-$  1 Vorzeichenwechsel, also eine positive Lösung;  $x = 2$

b)  $D = \left( \frac{q}{2} \right)^2 + \left( \frac{p}{3} \right)^3 = (-10)^2 + 2^3 = 108$

$$R_1 = 10 + \sqrt[3]{108}; \quad \operatorname{sgn} R_1 = +1$$

$$R_2 = 10 - \sqrt[3]{108}; \quad \operatorname{sgn} R_2 = -1$$

$$\begin{aligned}
x &= \operatorname{sgn} R_1 \sqrt[3]{|R_1|} + \operatorname{sgn} R_2 \sqrt[3]{|R_2|} = \\
&= \sqrt[3]{\sqrt[3]{108} + 10} - \sqrt[3]{\sqrt[3]{108} - 10} = \sqrt[3]{6\sqrt[3]{3} + 10} - \sqrt[3]{6\sqrt[3]{3} - 10} \approx \\
&\approx 2,732050810 - 0,732050808 = 2,000000002
\end{aligned}$$

4. 1)  $x^3 + 3x - 10 = 0$

a) Teiler von  $-10$  sind  $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$ .

$x$	1	-1	2	-2	5	-5	10	-10
LS	-6	-14	4	-24	130	-150	1020	-1040

Keiner der Teiler ist Lösung.

b)  $x = \sqrt[3]{\sqrt[3]{26} + 5} - \sqrt[3]{\sqrt[3]{26} - 5}$

c)  $x \approx 1,69888$

$$\text{LS} = -6,4 \cdot 10^{-5}$$

2)  $x^3 + x - 11 = 0$

a) Teiler von  $-11$  sind  $\pm 1$  und  $\pm 11$ .

$x$	1	-1	11	-11
LS	-9	-13	1331	-1353

Keiner der Teiler ist Lösung.

b)  $x = \sqrt[3]{\frac{1}{18} \sqrt{9813 + \frac{11}{2}}} - \sqrt[3]{\frac{1}{18} \sqrt{9813 - \frac{11}{2}}}$

c)  $x \approx 2,07432$

$LS = -2,9 \cdot 10^{-4}$

3)  $x^3 - 12x - 20 = 0$

a) Teiler von  $-20$  sind  $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5, \pm 10, \pm 20$ .

$x$	1	-1	2	-2	4	-4	5	-5	10	-10	20	-20
LS	-31	-9	-36	-4	-4	-36	45	-8	860	-900	7740	-7780

Keiner der Teiler ist Lösung.

b)  $x = 2\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}$

c)  $x \approx 4,10724$

$LS = -1,2 \cdot 10^{-4}$

121/5.  $\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3 = \left(\frac{-10}{2}\right)^2 + \left(-\frac{9}{3}\right)^3 = 25 - 27 < 0$

$x_1 = -2$  ist Lösung.

$(x^3 - 9x - 10) : (x + 2) = x^2 - 2x - 5$

$x_2 = 1 - \sqrt{6}; \quad x_3 = 1 + \sqrt{6}$

6. a) 6;  $x^2 + 6x + 4 = 0$ ;  $-3 \pm \sqrt{5}$   
 b) -3;  $x^2 - 3x - 7 = 0$ ;  $\frac{1}{2}(3 \pm \sqrt{37})$   
 c) -6;  $x^2 - 6x + 2 = 0$ ;  $3 \pm \sqrt{7}$   
 d) 1;  $x^2 + x - 18 = 0$ ;  $\frac{1}{2}(-1 \pm \sqrt{73})$   
 e) 4;  $x^2 + 4x - 2 = 0$ ;  $-2 \pm \sqrt{6}$

7. a)  $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$

$$\left(y - \frac{a}{3}\right)^3 + a\left(y - \frac{a}{3}\right)^2 + b\left(y - \frac{a}{3}\right) + c = 0$$

$$y^3 + y\left(b - \frac{a^2}{3}\right) + \frac{2a^3}{27} - \frac{ab}{3} + c = 0$$

b)  $y - 2 := x$

$y^3 + 8y - 124 = 0$

$y = \sqrt[3]{\frac{10}{9} \sqrt{3129} + 62} - \sqrt[3]{\frac{10}{9} \sqrt{3129} - 62}$

$y \approx 4,45408$

$x \approx 2,45408$  ergibt  $LS - 100 = -3,6 \cdot 10^{-3}$ .

121/8. a)  $y - \frac{1}{3} := z$

$$y^3 - \frac{1}{3}y - \frac{6802}{27} = 0$$

$$y = \frac{1}{3} \sqrt[3]{3401 + \sqrt{11566800}} + \frac{1}{3} \sqrt[3]{3401 - \sqrt{11566800}} = \\ = \frac{1}{3} \sqrt[3]{3401 + 180 \sqrt{357}} + \frac{1}{3} \sqrt[3]{3401 - 180 \sqrt{357}} \approx$$

$$\approx \frac{1}{3} \cdot 18,999998 \dots,$$

was den Versuch  $y = \frac{19}{3}$  nahelegt. Die Probe zeigt die Richtigkeit dieses Ansatzes.

Also ist  $z = 6$ .

b)  $x^3 + \frac{1}{12}x^2 - \frac{7}{48} = 0; \quad x =: y - \frac{1}{36}$

$$y^3 - \frac{1}{432}y - \frac{3401}{23328} = 0$$

$$y = \frac{1}{36} \sqrt[3]{3401 + \sqrt{11566800}} + \frac{1}{36} \sqrt[3]{3401 - \sqrt{11566800}} = \\ = \frac{1}{36} \sqrt[3]{3401 + 180 \sqrt{357}} + \frac{1}{36} \sqrt[3]{3401 - 180 \sqrt{357}} \approx$$

$$\approx \frac{1}{36} \cdot 18,999998 \dots$$

Der Ansatz  $y = \frac{19}{36}$  erweist sich als richtig, also  $x = \frac{1}{2}$ .

9. a) 1)  $x = 1: \quad \text{LS} = 13 \neq \text{RS}$ .

Da  $\text{LS} > 10x$  für  $x \in \mathbb{R}^+$ , gilt für

$x \geq 2: \quad \text{LS} > 20 = \text{RS}$ .

2) Angenommen,  $\frac{m}{n}$  sei Lösung. Dann muß

$$m^3 + 2m^2n + 10mn^2 = 20n^3$$

sein, woraus folgt, daß  $n$  ein Teiler von  $m$  sein muß.

3) LS irrational, RS rational.

b) Da  $\text{LS}(1) = 13 < 20$  und  $\text{LS}(2) = 36 > 20$ , liegt eine Nullstelle in  $]1; 2[$ .

Aus  $\frac{y+7}{x-1} = \frac{16+7}{2-1} \Leftrightarrow y = 23x - 30$  gewinnt man für  $y = 0$  den Näherungswert

$x_0 = \frac{30}{23} \approx 1,304378$ . Das Iterationsverfahren liefert

$x_{18} = 1,368 \dots$  und  $x_{19} = 1,369 \dots$

Da  $\text{LS}(x_{18}) < 20$  und  $\text{LS}(x_{19}) > 20$ , gilt

$x = 1,368 \dots$

NB:  $x_{72} = 1,368808107 \dots$

c)  $\xi = 1 \frac{17207111080}{46656000000} =$

$$= 1,368\,808\,107\,853\,223\,593\,964\,334\,703\,840\,877\,791\,489\,\overline{476\,680\,371\,742\,112} \\ 482\,281\,001\,370\,507\,544\,581\,433\,470\,384\,087\,791\,489$$

d) + + + -

1 Vorzeichenwechsel  $\Rightarrow$  1 positive Lösung

2 Vorzeichenwiederholungen  $\Rightarrow$  2 oder 0 negative Lösungen

e)  $x^3 + 2x^2 + 10x - 20 = 0$ ;  $x =: y - \frac{2}{3}$  ergibt

$$(y - \frac{2}{3})^3 + 2(y - \frac{2}{3})^2 + 10(y - \frac{2}{3}) - 20 = 0$$

$$y^3 + \frac{26}{3}y - \frac{704}{27} = 0$$

$$\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3 = \left(-\frac{704}{27 \cdot 2}\right)^2 + \left(\frac{26}{3 \cdot 3}\right)^3 = \frac{5240}{27} > 0$$

Der casus irreducibilis liegt nicht vor.


Für die einzige reelle Lösung ergibt sich:

$$x = \frac{1}{3} \left\{ \sqrt[3]{6\sqrt{3930} + 352} - \sqrt[3]{6\sqrt{3930} - 352} - 2 \right\} \approx 1,3688081\dots$$


### Aufgaben zu 6.1



129/1.

130/




130/2. a)






130/3. Es ist die Funktion  $x \mapsto a^x$  mit  $a =$

- a) 3      b)  $\sqrt{7}$       c)  $\frac{1}{3}$       d) 4      e) 2      f) 1      g) 4      h) 3  
 4. a) nein      b) ja, jede Exp.-Fkt.      c) nein      d) ja,  $x \mapsto \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^x$       e) nein




b) Verschiebung um den Vektor  $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ c \end{pmatrix}$




b) Verschiebung um den Vektor  $\vec{v} = \begin{pmatrix} -c \\ 0 \end{pmatrix}$

130/7. a)



$$y = 1,5^{2x}$$

b)



$$y = 1,728^x$$

$$y = 1,2^{3(x-4)}$$

+4

$$y = 1,5^{2x} = (1,5^2)^x = 2,25^x \quad y = (1,2^3)^{x-4}; \quad \text{also } a = 1,2^3 = 1,728; \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{c)} \quad y = 1,2^{3x-4} = 1,2^{3(x-\frac{4}{3})} = (1,2^3)^{x-\frac{4}{3}}; \quad \text{also } a = 1,2^3 = 1,728; \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$$


$$\text{d)} \quad y = u^{vx+w} = u^v(x+\frac{w}{v}) = (u^v)^{x+\frac{w}{v}}; \quad \text{also } a = u^v, \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} -\frac{w}{v} \\ 0 \end{pmatrix}$$

8. a) Übereinstimmende Wertetabellen.

Wegen  $2^{x-2} = 2^x \cdot 2^{-2} = 2^x \cdot \frac{1}{4} = 0,25 \cdot 2^x$  sind die beiden Funktionen identisch.

$$\text{b)} \quad y = u^{vx+w} = u^{vx} \cdot u^w = (u^w) \cdot (u^v)^x; \quad \text{also } a = u^v, \quad c = u^w$$

9. a)



$$y = 3x + 1$$


Ab  $n = 4$  gilt  $2^n > 3n + 1$ .b) Die kleinste natürliche Zahl, für die  $2^x > mx + 1$  gilt, ist

- 1) 6      2) 14      3) 22

c) Die kleinste natürliche Zahl, für die  $a^x > mx + 1$  gilt, ist


- 1) 97      2) 1174      3) 1424

131/10. a)



b)	x	$2^x$	$x^3$
	0	1	0
	1	2	1
	2	4	8
	3	8	27
	4	16	64
	5	32	125
	6	64	216
	7	128	343
	8	256	512
	9	512	729
	10	1024	1000
	11	2048	1331

$2^n > n^3$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , gilt für  
n = 1 oder  $n \geq 10$ .



Für  $x \geq 4$  gilt  $2^x \geq x^2$ .

c)	x	0	1	10	100	1000	600	700
	$1,1^x$	1	1,1	$2,5\dots$	$1,3\dots \cdot 10^4$	$2,4\dots \cdot 10^{41}$	$6,8\dots \cdot 10^{24}$	$9,4\dots \cdot 10^{28}$
	$x^{10}$	0	1	$10^{10}$	$10^{20}$	$10^{30}$	$6,0\dots \cdot 10^{27}$	$2,8\dots \cdot 10^{28}$

$1,1^{100n} > (100n)^{10}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , gilt ab  $n = 7$ .

11. a) Zins =  $K_0 \cdot \frac{p}{100}$ ; Kapital + Zins =  $K_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)$ ; also  $q = 1 + \frac{p}{100}$ .

b)  $K_n = K_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$

- 1) 1216,65 DM      2) 1480,24 DM      3) 1469,33 DM

- c) 1) um 61%, 2) um 63%, 3) um 159% (jeweils auf ganze Prozente gerundet)

- 137/1. **d)** Es dauert ungefähr 26 Jahre. Verdoppelung nach etwa 13 Jahren.  
**e)** Es dauert ungefähr 18 Jahre. Verdoppelung nach etwa 9 Jahren.

**132/12.**  $y = 2 = 2^1$  für  $x = 4$ ;  $y = 4 = 2^2$  für  $x = 8$ ;  
 $y = 8 = 2^3$  für  $x = 12$ ; d.h., es dauert 4 bzw. 8 bzw. 12 Tage.

**13.**  $I_0 = 0,38 \text{ A}$ ;  $I_1 = 0,38 \text{ A} \cdot 10^{-2}$  nach  $t_1 = \frac{1}{81} \text{ s}$ ;  
 $I_2 = 0,38 \text{ A} \cdot 10^{-3}$  nach  $t_2 = \frac{1}{54} \text{ s}$ .

**14. a)**  $N(t) = N_0 \cdot (\frac{1}{2})^t$  für  $t = \frac{1}{0,086} \text{ d} \approx 11,6 \text{ d}$ .

Die Halbwertszeit beträgt etwa 11,6 Tage.

**b)**  $N(100 \text{ d}) = N_0 \cdot (\frac{1}{2})^{8,6} \approx N_0 \cdot 0,00258$ .

Nach 100 Tagen sind noch etwa 2,6% der Radiumatome vorhanden.

**15. a)**  $2^{c \cdot 1620 \text{ a}} = 2^{-1} \Rightarrow c = -\frac{1}{1620 \text{ a}}$

**b) 1)**  $N(1000 \text{ a}) = N_0 \cdot 2^{-\frac{1000}{1620}} \approx N_0 \cdot 0,652$

**2)**  $N(2000 \text{ a}) = N_0 \cdot 2^{-\frac{2000}{1620}} \approx N_0 \cdot 0,425$

**3)**  $N(10000 \text{ a}) = N_0 \cdot 2^{-\frac{10000}{1620}} \approx N_0 \cdot 0,014$

Also sind nach 1000 Jahren noch 65,2%, nach 2000 Jahren noch 42,5% und nach 10000 Jahren noch 1,4% der ursprünglichen Menge von Radium 226 vorhanden.

**16. a)**  $T(1875) = 82 \cdot 0,9955^{50} \approx 65,4$ ; also 65,4 Arbeitsstunden pro Woche  
 $T(1960) = 82 \cdot 0,9955^{135} \approx 44,6$ ; also 44,6 Arbeitsstunden pro Woche  
 $T(1980) = 82 \cdot 0,9955^{155} \approx 40,8$ ; also 40,8 Arbeitsstunden pro Woche

**b)**  $T(2000) = 82 \cdot 0,9955^{175} \approx 37,2$ . Für das Jahr 2000 ergäbe sich eine wöchentliche Arbeitszeit von etwa 37 Stunden, was durchaus realistisch erscheint.





**133/17. a)**  $5,3 \cdot q^{10} = 6,0 \Rightarrow q = 1,01248\dots$ ; etwa 12,5% jährliche Zunahme.

**b)**  $5,3 \cdot 1,034^{10} = 7,40\dots$

Die Weltbevölkerung würde auf 7,4 Milliarden anwachsen.

## Aufgaben zu 6.2

- 137/1. **a)** 5; 10; 20; 40; 80      **b)**  $-3; -\frac{3}{2}; -\frac{3}{4}; -\frac{3}{8}; -\frac{3}{16}$   
**c)** 1; -2; 4; -8; 16      **d)** 10; -2; 0,4; -0,08; 0,016  
**e)** 8;  $8\sqrt{2}$ ; 16;  $16\sqrt{2}$ ; 32      **f)** -8;  $8\sqrt[3]{3}$ ;  $-8\sqrt[3]{9}$ ; 24;  $-24\sqrt[3]{3}$
2. **a)**  $a = 1; q = -4$       **b)**  $a = 16; q = \frac{1}{2}$   
**c)**  $a = \frac{1}{12}; q = 3$  oder  $a = -\frac{1}{12}; q = -3$   
**d)**  $a = -\frac{3}{4}; q = -2$



4.  $a = 31$  Finger,  $q = 2$ ,  $s_n = 465$  Finger  $\Rightarrow n = 4$

Die Gesamtstrecke ist aus vier Stücken zusammengesetzt. Es wurde 3mal verdoppelt.

- 138/5. a)  $l_n$  und  $b_n$  seien Länge und Breite des  $n$ -ten Rechtecks ( $n \in \mathbb{N}$ ).

Es gilt:  $l_1 = l$ ,  $b_1 = b$  und  $l_2 = b_1 = b$ ,  $b_2 = \frac{1}{2}l_1 = \frac{l}{2}$ .

Aus  $l_1 : b_1 = l_2 : b_2$  (Ähnlichkeit) folgt  $l^2 = 2b^2 \Leftrightarrow l = b \cdot \sqrt{2}$ .

Allgemein ist  $l_{n+1} = b_n$

$$b_{n+1} = \frac{1}{2}l_n, \quad n \in \mathbb{N}$$

Damit erhält man die Folgen

$$b_1 = b; \quad b_2 = \frac{b}{\sqrt{2}}; \quad b_3 = \frac{b}{2}; \quad b_4 = \frac{b}{2\sqrt{2}}; \quad \dots$$

$$l_1 = b\sqrt{2}; \quad l_2 = b; \quad l_3 = \frac{b}{\sqrt{2}}; \quad l_4 = \frac{b}{2}; \quad \dots,$$

also geometrische Folgen mit  $q = \frac{1}{\sqrt{2}}$ .

- b) 1) Aus  $l_0 \cdot b_0 = 10^6 \text{ mm}^2$  und  $l_0 = b_0\sqrt{2}$  folgt  $b_0 \approx 841 \text{ mm}$ ,  $l_0 \approx 1189 \text{ mm}$ .

$$2) l_4 \cdot b_4 = 1 \text{ m}^2 : 2^4 = 625 \text{ cm}^2, \quad b_4 \approx 210 \text{ mm}, \quad l_4 = 297 \text{ mm};$$

$$l_5 \cdot b_5 = 1 \text{ m}^2 : 2^5 = 312,5 \text{ cm}^2, \quad b_5 \approx 149 \text{ mm}, \quad l_5 = 210 \text{ mm}.$$

6. a) 3,2 mm      b)  $10,24 \text{ cm} \approx 10 \text{ cm}$       c)  $3,2768 \text{ m} \approx 3 \text{ m}$

138/7. a) 31      b) 1023      c)  $19\frac{3}{8} = 19,375$   
d)  $19\frac{251}{256} = 19,98046875$       e) 0      f) 5

8. a)  $a = 4$ ;  $s_5 = 52,75$       b)  $q = -\frac{1}{2}$ ;  $s_{10} \approx 66,60$   
c)  $a = 125$ ;  $a_5 = 16,2$       d) Aus  $a + aq + aq^2 = 7$  und  $aq^2 = 1$  folgt  
 $q = \frac{1}{2}$ ,  $a = 4$ , also  $a_1 = 4$ ,  $a_2 = 2$ , oder  
 $q = -\frac{1}{3}$ ,  $a = 9$ , also  $a_1 = 9$ ,  $a_2 = -3$ .

9. Mit  $a > 0$  gilt

I  $\frac{25}{a} + \frac{25}{aq} + \frac{25}{aq^2} = a + aq + aq^2$

II  $\frac{25}{a} + \frac{25}{aq} + \frac{25}{aq^2} = a \cdot aq \cdot aq^2$

---

I'  $\frac{25(q^2 + q + 1)}{aq^2} = a(1 + q + q^2) \quad \parallel : \frac{1 + q + q^2}{aq^2}$ . Beachte:  $1 + q + q^2 > 0$

II'  $\frac{25(q^2 + q + 1)}{aq^2} = (aq)^3$

---

I''  $25 = (aq)^2 \Rightarrow aq = 5$ ; denn nach II' ist  $aq > 0$ .

II''  $\frac{25(q^2 + q + 1)}{5q} = 125 \Leftrightarrow q^2 - 24q + 1 = 0$   
 $q_1 = 12 + \sqrt{143}$ ;  $q_2 = 12 - \sqrt{143}$

Also entweder  $q = 12 + \sqrt{143}$ ,  $a = \frac{5}{12 + \sqrt{143}}$  und damit

$a_1 = \frac{5}{12 + \sqrt{143}}$ ,  $a_2 = 5$ ,  $a_3 = 5(12 + \sqrt{143})$

oder  $q = 12 - \sqrt{143}$ ,  $a = \frac{5}{12 - \sqrt{143}}$  und damit

$a_1 = \frac{5}{12 - \sqrt{143}}$ ,  $a_2 = 5$ ,  $a_3 = 5(12 - \sqrt{143})$ .

NB: Wegen  $\frac{5}{12 - \sqrt{143}} = 5(12 + \sqrt{143})$  erscheinen in der zweiten Lösung die drei Glieder lediglich in umgekehrter Reihenfolge!

10.  $a, aq, aq^2$  mit  $q > 0$

I  $a + aq + aq^2 = 119$

II  $(a + aq^2)[(aq^2 - aq) + (aq - a)] = 4335$

---

I'  $a = \frac{119}{1 + q + q^2}$  Beachte:  $1 + q + q^2 > 0$

II'  $a^2(q^4 - 1) = 4335$

Setzt man  $a$  aus I' in II' ein, so erhält man

$$\frac{119^2}{(1+q+q^2)^2} (q^4 - 1) = 4335 \quad \parallel \cdot \frac{(1+q+q^2)^2}{289}$$

$$49(q^4 - 1) = 15(1+q+q^2)^2$$

$$34q^4 - 30q^3 - 45q^2 - 30q - 64 = 0 \quad (*)$$

Nach Satz 107.1 ist jede ganzzahlige Lösung von (\*) Teiler von  $-64$ .

$q = 2$  ist Lösung. Dazu gehört nach I' das Anfangsglied  $a = 17$ .

Die drei Glieder heißen 17, 34, 68.

Nach der Vorzeichenregel von DESCARTES (Satz 108.2) hat (\*) eine einzige positive Lösung, was man ohne die Vorzeichenregel folgendermaßen einsehen kann.

Dividiert man das Gleichungspolynom von (\*) durch  $q - 2$ , so erhält man die Gleichung

$$34q^3 + 38q^2 + 31q + 32 = 0 \quad (**)$$

Die linke Seite von (\*\*) ist für  $q \geq 0$  stets  $\geq 32$ , kann also für positives  $q$  nicht null werden.

$$139/11. \frac{a+aq}{aq^2} + \frac{a+aq^2}{aq} + \frac{aq+aq^2}{a} = 13, \quad a \neq 0$$

$$q^4 + 2q^3 + 2q + 1 = 13q^2 \quad (\blacksquare)$$

### 1) Methode von CARDANO:

Mache die rechte Seite zu einem Quadrat und prüfe, ob die linke Seite dann auch ein Quadrat ist.

$$q^4 + 2q^3 + 3q^2 + 2q + 1 = 16q^2 \quad (*)$$

Ansatz:

$$\begin{aligned} \text{LS} &= (q^2 + Aq + 1)^2 = \\ &= q^4 + 2Aq^3 + (A^2 + 2)q^2 + 2Aq + 1 \end{aligned}$$

Koeffizientenvergleich:

$$\left. \begin{array}{l} 2A = 2 \Leftrightarrow A = 1 \\ A^2 + 2 = 3 \Leftrightarrow |A| = 1 \\ 2A = 2 \Leftrightarrow A = 1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow A = 1$$

Somit wird (\*) zu

$$(q^2 + q + 1)^2 = 16q^2$$

$$|q^2 + q + 1| = 4|q|$$

$$q^2 + q + 1 = -4q \vee q^2 + q + 1 = 4q$$

$$q^2 + 5q + 1 = 0 \vee q^2 - 3q + 1 = 0$$

Das ergibt

$$q_1 = -\frac{1}{2}(5 + \sqrt{21}) \quad q_3 = \frac{1}{2}(3 - \sqrt{5})$$

$$q_2 = -\frac{1}{2}(5 - \sqrt{21}) \quad q_4 = \frac{1}{2}(3 + \sqrt{5}).$$

Man erhält keine Aussage für  $a$ . Es gibt im wesentlichen 4 geometrische Folgen, von denen CARDANO nur die letzte kennt:

$$\begin{aligned}
 a, \quad & \frac{1}{2}a(-5 - \sqrt{21}), \quad \frac{1}{2}a(23 + 5\sqrt{21}) \\
 a, \quad & \frac{1}{2}a(-5 + \sqrt{21}), \quad \frac{1}{2}a(23 - 5\sqrt{21}) \\
 a, \quad & \frac{1}{2}a(3 - \sqrt{5}), \quad \frac{1}{2}a(7 - 3\sqrt{5}) \\
 a, \quad & \frac{1}{2}a(3 + \sqrt{5}), \quad \frac{1}{2}a(7 + 3\sqrt{5})
 \end{aligned}$$

## 2) Übliches Verfahren

Die Gleichung (■)  $q^4 + 2q^3 - 13q^2 + 2q + 1 = 0$  ist eine reziproke Gleichung 1. Art geraden Grades (siehe *Algebra 3*).

Division durch  $q^2$  ergibt die äquivalente Gleichung

$$\left(q^2 + \frac{1}{q^2}\right) + 2\left(q + \frac{1}{q}\right) - 13 = 0$$

Die Substitution  $z := q + \frac{1}{q}$  liefert

$$z^2 + 2z - 15 = 0$$

$$z = -5 \vee z = 3$$

$$q + \frac{1}{q} = -5 \vee q + \frac{1}{q} = 3$$

$$q = \frac{1}{2}(-5 \pm \sqrt{21}) \vee q = \frac{1}{2}(3 \pm \sqrt{5})$$

Wie unter 1) hat man damit die 4 Lösungen  $q_1, q_2, q_3, q_4$ .  
Siehe dort für die weitere Behandlung.

139/12. a)  $2 \cdot 10^6 (1 - 2^{-64}) \text{ DM} \approx 2 \cdot 10^6 \text{ DM}$

b)  $10^6 \cdot (\frac{1}{2})^{n-1} < 10^{-2}$  ist erfüllt für  $n \geq 28$ .

c) Ganze DM-Beträge ergeben sich nur bei den ersten 7 Feldern.

$$s_7 = 2 \cdot 10^6 (1 - 2^{-7}) \text{ DM} = 1984375 \text{ DM}$$

Er würde nur auf 15 625 DM verzichten (< 1%).

13. Das Roß kostet 4 294 967 295 Heller.

14. Es waren 2800 »kits, cats, sacks and wives«, dazu noch ein Mann. Aber ob die alle nach St. Ives gingen? Mit Sicherheit weiß man das nur vom Erzähler (bzw. der Erzählerin).

140/15. a)  $s_5 = 1\frac{15}{16}; \quad s_{10} = 1\frac{511}{512}; \quad s_{15} = 1\frac{16383}{16384}; \quad s_{20} = 1\frac{524287}{524288}$

b)  $s_n = 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$  wird mit wachsendem  $n$  immer größer, bleibt aber immer kleiner als 2 und nähert sich diesem Wert beliebig.

16. 1) a)  $s_5 = 13\frac{3}{16}; \quad s_{10} = 113\frac{169}{512}; \quad s_{15} = 873\frac{12907}{16384}; \quad s_{20} = 6648,4\dots$

b)  $s_n = 2 \cdot (1,5^n - 1)$  wird mit wachsendem  $n$  beliebig groß, da  $1,5^n$  beliebig groß wird (z. B.  $1,5^6 > 10 \Rightarrow 1,5^{6+k} > 10^k, k \in \mathbb{N}$ ).

2) a)  $s_5 = 21,5552; s_{10} = 19,8790\ldots; s_{15} = 20,0094\ldots; s_{20} = 19,9992\ldots$

b)  $s_n = 20 \cdot [1 - (-0,6)^n]$  ist für gerades  $n$  kleiner, für ungerades  $n$  größer als 20 und nähert sich diesem Wert mit wachsendem  $n$  beliebig, da  $(-0,6)^n$  gegen 0 strebt ( $0,6^5 < 10^{-1} \Rightarrow 0,6^{5k} < 10^{-k}, k \in \mathbb{N}$ ).

3) a)  $s_5 = 1,22102; s_{10} = 3,1874\ldots; s_{15} = 6,3544\ldots; s_{20} = 11,4549\ldots$

b)  $s_n = 2(1,1^n - 1)$  wird mit wachsendem  $n$  beliebig groß, da  $1,1^n$  beliebig groß wird ( $1,1^{25} > 10 \Rightarrow 1,1^{25k} > 10^k, k \in \mathbb{N}$ ).

ng


140/17. a)  $A_1 \in h$  hat die Koordinaten  $A_1(a|0)$ ; also  $\overrightarrow{OA_1} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}$

$B_1 \in g$  hat die Koordinaten  $B_1(a|aq)$   
 $A_2 \in h$  hat die Koordinaten  $A_2(a+aq|aq)$  } also  $\overrightarrow{B_1A_2} = \begin{pmatrix} aq \\ 0 \end{pmatrix}$

$B_2 \in g$  hat die Koordinaten  $B_2(a+aq|aq+aq^2)$   
 $A_3 \in g$  hat die Koordinaten  $A_3(a+aq+aq^2|aq+aq^2)$  } also  $\overrightarrow{B_2A_3} = \begin{pmatrix} aq^2 \\ 0 \end{pmatrix}$   
 usw.

b)  $s_k$  ist die 1. Koordinate von  $A_k$  und von  $B_k$ ; die Gerade  $A_kB_k$  schneidet die  $x$ -Achse im Punkt  $C_k(s_k|0)$ ;  $k \in \mathbb{N}$ .

18. a)



b)  $S(20|10)$ . Die  $s_n$  nähern sich mit wachsendem  $n$  beliebig der Zahl  $s = 20$ .

c) Alle Dreiecke  $A_iB_iA_{i+1}$ ,  $i \in \mathbb{N}$ , sind einander ähnlich ( $w, w$ ). Daher gilt

$$\overline{A_iA_{i+1}} : \overline{A_{i+1}A_{i+2}} = \overline{B_iA_{i+1}} : \overline{B_{i+1}A_{i+2}} = \frac{1}{q} \text{ (hier } = 2\text{).}$$

Die Dreiecke  $OA_1B_1$  und  $B_iA_{i+1}B_{i+1}$ ,  $i \in \mathbb{N}$ , sind ebenfalls einander ähnlich ( $w, w$ ). Daher gilt  $\overline{OB_1} : \overline{B_1B_2} = \overline{OA_1} : \overline{B_1A_2} = \frac{1}{q}$  und


$$\overline{B_iB_{i+1}} : \overline{B_{i+1}B_{i+2}} = \overline{B_iA_{i+1}} : \overline{B_{i+1}A_{i+2}} = \frac{1}{q} \text{ (hier } = 2\text{).}$$

Die Streckenlängen bilden also jeweils geometrische Folgen mit dem Quotienten  $q$  (hier  $= 0,5$ ).

$$\overline{A_1A_2} + \overline{A_2A_3} + \dots + \overline{A_{n+1}A_n} \text{ nähert sich beliebig } \overline{A_1S} = \sqrt{10^2 + 10^2} = 10\sqrt{2};$$

$$\overline{OB_1} + \overline{B_1B_2} + \dots + \overline{B_{n-1}B_n} \text{ nähert sich beliebig } \overline{OS} = \sqrt{20^2 + 10^2} = 10\sqrt{5}.$$


140/19. a)



Die  $s_n$  werden mit wachsendem  $n$  immer größer, und zwar beliebig groß.


14

b)



$s_1, s_3, s_5, \dots$  bilden eine absteigende,  $s_2, s_4, s_6, \dots$  eine aufsteigende Folge. Mit wachsendem  $n$  nähert sich  $s_n$  beliebig der Zahl 6.

c)  $y = -\frac{3}{2}x$



Mit wachsendem  $n$  werden die Zahlen  $s_1, s_3, s_5, \dots$  immer größer und beliebig groß, die Zahlen  $s_2, s_4, s_6, \dots$  immer kleiner und beliebig klein.

20. a) Je zwei Strecken  $a_i$  und  $a_{i+1}$  sind die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen Hypotenuse abwechselnd auf  $g$  bzw.  $h$  liegt. Diese Dreiecke sind einander ähnlich (entsprechende Winkel sind gleich, da ihre Schenkel paarweise aufeinander senkrecht stehen). Daher gilt

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2} = \frac{a_4}{a_3} = \dots, \text{ also, da } a_2 = \frac{2}{3}a_1, \frac{a_{i+1}}{a_i} = \frac{2}{3}, i \in \mathbb{N}.$$

Die  $a_i$  bilden somit die geometrische Folge mit  $a = 9$  und  $q = \frac{2}{3}$ .


- b)  $s_n = 9 \cdot \frac{1 - (\frac{2}{3})^n}{1 - \frac{2}{3}} = 27(1 - (\frac{2}{3})^n)$ . Mit wachsendem  $n$  nähert sich  $s_n$  beliebig der Zahl 27 (da  $(\frac{2}{3})^n$  gegen 0 strebt).
- c) Diese rechtwinkligen Dreiecke mit den Hypotenusern  $a_i$  sind ebenfalls einander ähnlich. Daher gilt für die Flächeninhalte  $A_{i+1} : A_i = (a_{i+1} : a_i)^2 = \frac{4}{9}$ ,  $i \in \mathbb{N}$ . Sie bilden also eine geometrische Folge mit  $q = \frac{4}{9}$ .

141/21. a)  $l_2 = \frac{4}{3}l_1$ ,  $l_3 = \frac{4}{3}l_2$  usw.; d.h., die  $l_i$  bilden eine geometrische Folge mit  $q = \frac{4}{3}$ .



b)  $l_{10} \approx 13,3l_1$ ;  $l_{50} \approx 1,32 \cdot 10^6 l_1$ ;  $l_{100} \approx 3,12 \cdot 10^{12} l_1$   
 $l_n$  wird mit wachsendem  $n$  beliebig groß.

c) Der Von-Koch-Kurve lässt sich keine Länge zuordnen; sie ist »unendlich lang«.

22. a)



z. Mit



liebig

b)  $l_2 = \frac{5}{3}l_1 = 15 \text{ cm}$ ;  $l_3 = \frac{5}{3}l_2 = 25 \text{ cm}$ ;  $l_4 = \frac{5}{3}l_3 = 41\frac{2}{3} \text{ cm}$ .

$n \mapsto l_n = l_1 \cdot (\frac{5}{3})^{n-1}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , ist eine geometrische Folge mit  $q = \frac{5}{3}$ .

Mit wachsendem  $n$  wird  $(\frac{5}{3})^n$  und damit  $l_n$  beliebig groß [ $(\frac{5}{3})^5 > 10 \Rightarrow (\frac{5}{3})^{5k} > 10^k$ ].

142/23. a)  $\overline{P_{i+1}Q_{i+1}}^2 = 2 \cdot \left(\frac{1}{2} \overline{P_iQ_i}\right)^2 = \frac{1}{2} \overline{P_iQ_i}^2 \Rightarrow \overline{P_{i+1}Q_{i+1}} = \frac{1}{2}\sqrt{2} \cdot \overline{P_iQ_i}$ .

Also gilt:  $a_n = a \cdot \left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\right)^{n-1}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

b)  $l_n = 4 \cdot s_n = 4 \cdot a \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}\sqrt{2}}$

$$a = 1 \text{ dm} \Rightarrow l_n = 4 \text{ dm} \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}\sqrt{2}} = 8 \text{ dm} \left(1 + \frac{1}{2}\sqrt{2}\right) \cdot \left[1 - \left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\right)^n\right]$$

$1 - \left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\right)^n$  ist kleiner als 1 und nähert sich mit wachsendem  $n$  beliebig dem Wert 1.

Also gilt:  $l_n < 8 \text{ dm} \cdot \left(1 + \frac{1}{2}\sqrt{2}\right) < 1,37 \text{ m}$ .

Mit 2 m Faden kann man also beliebig viele (»all die unendlich vielen«) Quadrate herstellen, und es bleibt noch mehr als 63 cm übrig!

c)  $A_i$  sei der Flächeninhalt des  $i$ -ten Quadrats.

$$A_i = a_i^2 = a^2 \cdot \left(\left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\right)^{n-1}\right)^2 = a^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$s_n = A_1 + A_2 + \dots + A_n = a^2 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{\frac{1}{2}} = 2a^2 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right).$$

$s_n$  nähert sich mit wachsendem  $n$  beliebig dem Wert  $2a^2$  (liegt aber immer darunter). Die Sperrholzplatte muß daher mindestens den Flächeninhalt  $2a^2 = 2 \text{ dm}^2$  haben.

$n$  aufeinander gestapelte Schichten ergeben einen Körper der Höhe  $h_n = n \cdot 5 \text{ mm}$ . Mit wachsendem  $n$  wird diese Höhe beliebig groß.

Das Volumen der  $i$ -ten Schicht ist  $V_i = A_i \cdot 5 \text{ mm}$ .

$$v_n = V_1 + V_2 + \dots + V_n = (A_1 + A_2 + \dots + A_n) \cdot 5 \text{ mm} = s_n \cdot 5 \text{ mm}.$$

Wegen  $s_n < 2a^2$  gilt also  $v_n < 2a^2 \cdot 5 \text{ mm}$ , d.h., mit  $a = 10 \text{ cm}$ ,  $v_n < 100 \text{ cm}^3$ .

Das Volumen des Schichtkörpers nähert sich mit wachsendem  $n$  beliebig dem Wert  $100 \text{ cm}^3$ .

24. a)  $l_i = \pi \cdot r_i = \pi \left(\frac{1}{2}\right)^{i-1}$ ,  $i \in \mathbb{N}$ , (geometrische Folge)

$$L_n = l_1 + \dots + l_n = 2\pi \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$$

$L_n < 2\pi$ ;  $L_n$  nähert sich beliebig dem »Grenzwert«  $2\pi$ .

b) 1. Fall:  $n = 2k+1$ ,  $k \in \mathbb{N}_0$

$$x_{2k+1} = -1 + \underbrace{(r_1 + r_3 + \dots + r_{2k-1})}_{\text{geom. Reihe}} = -1 + \frac{4}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^k\right)$$

$x_{2k+1}$  strebt wachsend gegen  $\frac{1}{3}$ .

2. Fall:  $n = 2k$ ,  $k \in \mathbb{N}$

$$x_{2k} = 1 - \underbrace{(r_2 + r_4 + \dots + r_{2k-2})}_{\text{geom. Reihe}} = 1 - \frac{2}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1}\right)$$

$x_{2k}$  strebt abnehmend gegen  $\frac{1}{3}$ .

Ergebnis: Der zu  $x = \frac{1}{3}$  gehörende Punkt ist »Grenzpunkt« der Punkte  $P_n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

Anmerkung: Man kann  $x_n$  auch ohne Fallunterscheidung berechnen. Es gilt  $x_n = -1 + 2(r_1 - r_2 + r_3 - r_4 + \dots + (-1)^{n-2} r_{n-1})$ .

In der Klammer steht eine geometrische Reihe, hier mit  $q = -\frac{1}{2}$ . Man erhält  $x_n = -1 + \frac{4}{3}(1 - (-\frac{1}{2})^{n-1})$ .

c)  $r_{i+2} = \frac{1}{4}r_i \Rightarrow A_i = \frac{1}{2}\pi r_i^2 \cdot (1 - \frac{1}{16}) = \frac{15}{32}\pi r_i^2 = \frac{15}{8}\pi \cdot (\frac{1}{4})^i$

$$S_n = \frac{15}{32}\pi \underbrace{(r_1^2 + \dots + r_n^2)}_{\text{geom. Reihe}} = \frac{5}{8}\pi(1 - (\frac{1}{4})^n)$$

$S_n$  nähert sich mit wachsendem  $n$  beliebig der Zahl  $\frac{5}{8}\pi$ .

Einfacherer Weg: Die Sichelflächen bedecken gerade das aus den Halbkreisen mit den Radien  $r_1$  und  $r_2$  bestehende Gebiet. Es hat den Flächeninhalt

$$A = \frac{1}{2}\pi \cdot 1^2 + \frac{1}{2}\pi \cdot (\frac{1}{2})^2 = \frac{5}{8}\pi.$$

d) 1)

a)  $l_i = \pi \cdot (\frac{3}{4})^{i-1}, i \in \mathbb{N}$

$L_n = 4\pi(1 - (\frac{3}{4})^n); L_n$  strebt mit wachsendem  $n$  gegen  $4\pi$ .

b)  $x_n = -1 + 2 \underbrace{(r_1 - r_2 + r_3 - r_4 + \dots + (-1)^{n-2}r_{n-1})}_{\text{geom. Reihe mit } q = -\frac{3}{4}}$

$$x_n = -1 + \frac{8}{7}(1 - (-\frac{3}{4})^{n-1})$$

Es existiert ein »Grenzpunkt« mit  $x = \frac{1}{7}$ .

c)  $r_{i+2} = \frac{9}{16}r_i$

$$A_i = \frac{1}{2}\pi r_i^2 (1 - (\frac{9}{16})^2) = \frac{175}{512}\pi r_i^2 = \frac{175}{512}\pi \cdot (\frac{9}{16})^{i-1}$$

$$S_n = \frac{175}{512}\pi \underbrace{(r_1^2 + \dots + r_n^2)}_{\text{geom. Reihe}} = \frac{25}{32}\pi(1 - (\frac{9}{16})^n)$$

$S_n$  strebt gegen  $\frac{25}{32}\pi$ .

Einfacherer Weg:  $A = \frac{1}{2}\pi r_1^2 + \frac{1}{2}\pi r_2^2 = \frac{1}{2}\pi(1 + \frac{9}{16}) = \frac{25}{32}\pi$ .

d) 2)

a)  $l_i = \pi \cdot 0,9^{i-1}, i \in \mathbb{N}$

$L_n = 10\pi(1 - 0,9^n); L_n$  strebt gegen  $10\pi$ .

b)  $x_n = -1 + 2 \underbrace{(r_1 - r_2 + r_3 - r_4 + \dots + (-1)^{n-2}r_{n-1})}_{\text{geom. Reihe mit } q = -0,9}$

$$x_n = -1 + \frac{20}{19}(1 - (-0,9)^{n-1})$$

Es existiert ein »Grenzpunkt« mit  $x = \frac{1}{19}$ .

c)  $r_{i+2} = 0,81r_i$

$$A_i = \frac{1}{2}\pi r_i^2 (1 - 0,81^2) = 0,17195\pi r_i^2 = 0,17195\pi \cdot (0,81)^{i-1}$$

$$S_n = 0,17195\pi \underbrace{(r_1^2 + \dots + r_n^2)}_{\text{geom. Reihe}} = 0,905\pi(1 - (0,81)^n)$$

$S_n$  strebt gegen  $0,905\pi$ .

Einfacherer Weg:  $A = \frac{1}{2}\pi r_1^2 + \frac{1}{2}\pi r_2^2 = \frac{1}{2}\pi(1 + 0,81) = 0,905\pi$ .

d) 3)

a)  $l_i = \pi \cdot 0,99^{i-1}, i \in \mathbb{N}$

$L_n = 100\pi(1 - 0,99^n)$ ;  $L_n$  strebt gegen  $100\pi$ .

b)  $x_n = -1 + 2 \underbrace{(r_1 - r_2 + \dots + (-1)^{n-2} \cdot r_{n-1})}_{\text{geom. Reihe mit } q = -0,99}$

$$x_n = -1 + \frac{200}{199}(1 - (-0,99)^{n-1})$$

Es existiert ein »Grenzpunkt« mit  $x = \frac{1}{199}$ .

c)  $r_{i+2} = 0,9801r_i$

$$A_i = \frac{1}{2}\pi r_i^2 (1 - 0,9801^2) = 0,019701995\pi r_i^2$$

$$S_n = 0,019701995\pi \underbrace{(r_1^2 + \dots + r_n^2)}_{\text{geom. Reihe}} = 0,99005\pi (1 - 0,9801^n)$$

$S_n$  strebt gegen  $0,99005\pi$ .

Einfacherer Weg:  $\frac{1}{2}\pi r_1^2 + \frac{1}{2}\pi r_2^2 = \frac{1}{2}\pi(1 + 0,9801) = 0,99005\pi$ .

146

143/25. a)  $z_n = 37 \cdot 10^{-2} + 37 \cdot 10^{-4} + \dots + 37 \cdot 10^{-2n}$

Die Summanden bilden eine geometrische Folge mit  $q = 10^{-2}$ .

b)  $z_n = \frac{37}{99}(1 - 10^{-2n})$ .

$z_n$  kommt  $y = \frac{37}{99}$  beliebig nahe.

$$y = \frac{37}{99} = 0,37; \text{ also } y = z = \frac{37}{99}.$$

c) 1)  $0,7 = \frac{7}{9}$

2)  $0,0\overline{6} = \frac{6}{99} = \frac{2}{33}$

3)  $0,4\overline{81} = \frac{481}{999} = \frac{13}{27}$

4)  $0,4\overline{321} = \frac{4321}{9999}$

26. a)  $3,\overline{15} = 3\frac{5}{33}$

b)  $0,0\overline{6} = \frac{1}{15}$

c)  $0,5\overline{18} = \frac{57}{110}$

d)  $10,70\overline{185} = 10\frac{379}{540}$

146

### Aufgaben zu 6.3

145/1. a) 0; 2; 4; 6;  $a_{20} = 38$

b) 10; 9; 8; 7;  $a_{20} = -9$

c) -16; -13,5; -11; -8,5;  $a_{20} = 31,5$

2.  $a_n + a_{n+2} = (a + (n-1)d) + (a + (n+1) \cdot d) = 2a + 2nd = 2(a + n \cdot d) = 2a_{n+1}$ ;  
also  $a_{n+1} = (a_n + a_{n+2}) : 2$

3. a)  $s_{20} = 380$ ;  $s_{100} = 9900$

b)  $s_{20} = 10$ ;  $s_{100} = -3950$

c)  $s_{20} = 155$ ;  $s_{100} = 10725$

147

4. a)  $d = -6$ ;  $a = 11$       b)  $d = 0,8$ ;  $a = -0,8$       c)  $d = \frac{1}{4}$ ;  $a = -\frac{17}{12}$

145/5. a) 25; 38; 51; 64 ( $d = 13$ )

b) 25; 32,8; 40,6; 48,4; 56,2; 64 ( $d = 7,8$ )

c) 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43; 46; 49; 52; 55; 58; 61; 64 ( $d = 3$ )

6. a)  $a = 4$ ;  $d = 1,5$       b)  $L = \{(a, d) \mid a + 2d = 4\}$

c)  $a = -5$ ;  $d = 2,5$       d)  $a = 6$ ;  $d = -1,5$

7. Sie erhalten  $9\frac{7}{16}$ ,  $9\frac{9}{16}$ ,  $9\frac{11}{16}$ ,  $9\frac{13}{16}$ ,  $9\frac{15}{16}$ ,  $10\frac{1}{16}$ ,  $10\frac{3}{16}$ ,  $10\frac{5}{16}$ ,  $10\frac{7}{16}$  und  $10\frac{9}{16}$  Scheffel Gerste.

8. Der erste erhält 17,2 Schekel, jeder weitere um jeweils 1,6 Schekel weniger (!). [Die Numerierung »achtter Bruder« – und die Formulierung »hat sich erhoben« passen nicht zusammen.]

146/9. a)  $d = 9\frac{1}{6}$  Brote; sie erhielten  $1\frac{2}{3}$ ,  $10\frac{5}{6}$ , 20,  $29\frac{1}{6}$  und  $38\frac{1}{3}$  Brote.

b)  $d = -9\frac{1}{6}$  Brote; sie erhielten  $38\frac{1}{3}$ ,  $29\frac{1}{6}$ , 20,  $10\frac{5}{6}$  und  $1\frac{2}{3}$  Brote.

[Verteilung in umgekehrter Reihenfolge gegeben über a)!]

10. a) Ja, denn  $s_n = \frac{n}{2} (2a + (n-1)d) = \frac{n}{2} (a_1 + a_n)$ .

b) Ja, denn  $s_n = \frac{n}{2} (2a + (n-1)d) = na + n(n-1) \frac{d}{2}$ .

11. a)  $n^2 - 4n - 60 = 0$  hat in  $\mathbb{N}$  nur die Lösung  $n = 10$ .

b)  $n^2 - 9n + 14 = 0$  hat in  $\mathbb{N}$  die Lösungen  $n_1 = 7$  und  $n_2 = 2$ .

(Tatsächlich gilt  $-6 - 4,5 - 3 - 1,5 + 0 + 1,5 + 3 = -6 - 4,5$ .)

c)  $d = -1,2$ ;  $n^2 - 16n + 48 = 0$  hat zwar die Lösungen  $n_1 = 12$  und  $n_2 = 4$ . Laut Angabe muß aber  $n \geq 6$  gelten; also  $n = 12$ .

12. a)  $1 + 2 + 3 + \dots + 98 + 99 + 100 = (1 + 100) + (2 + 99) + \dots + (50 + 51) = 50 \cdot 101 = 5050$

b)  $1 + 2 + \dots + 10^4 = 5000 \cdot 10001 = 50005000$

c)  $7 + 14 + \dots + 994 = 7 \cdot (1 + 2 + \dots + 142) = 7 \cdot 143 \cdot 71 = 71071$

13. a)  $1 + 3 + \dots + 2n - 1 = 2n \cdot \frac{n}{2} = n^2$

b)  $\frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \dots + \frac{n}{n} = \frac{1}{n} (1 + 2 + \dots + n) = \frac{1}{n} \cdot (1 + n) \cdot \frac{n}{2} = \frac{n+1}{2}$

c)  $T_n = \frac{1}{n^2} (1 + 2 + \dots + n) = \frac{(1+n) \cdot n}{n^2 \cdot 2} = \frac{1+n}{2n} = \frac{1}{2n} + \frac{1}{2}$

$T_n$  strebt mit wachsendem  $n$  gegen  $\frac{1}{2}$ .

d)  $U_n = \frac{1}{n^2} (1 + 3 + \dots + 2n - 1) = \frac{n^2}{n^2} = 1$  für jedes  $n \in \mathbb{N}$ . (Vgl. a))

147/14.  $d = -1$ ;  $5 = 12 + (n-1) \cdot (-1) \Leftrightarrow n = 8$ ;  $s_8 = 68$ .

Es sind 68 Rohre gestapelt.

Man könnte noch  $(4 + 3 + 2 + 1) = 10$  weitere Rohre auflegen.

147/15. Das Dach besteht aus 846 Ziegeln. Man benötigt  $846 + 5 \cdot 8,46 \approx 888$  Ziegel, also 9 Paletten.

151

16. a) 1285 Sitze.

b) Für die arithmetische Folge mit  $a_1 = 120$  und  $a_{280} = 480$  gilt tatsächlich  $s_{280} = 8400$ . Es handelt sich aber um eine Folge mit  $d = \frac{360}{279}$ , was in diesem Anwendungsbeispiel sinnwidrig ist.

17. a) Trommeldurchmesser  $D$ ,

Durchmesser der  $i$ -ten Windung  $D_i = D + (i - 1) \cdot 0,5$  mm.  
 $2000 \text{ mm} = \pi(2D + 15 \cdot 0,5 \text{ mm}) \cdot 8$ ;  $D \approx 36,0 \text{ mm}$ .

b)  $D_i = 20 \text{ mm} + (i - 1) \cdot 1 \text{ mm}$ .

$20000 \text{ mm} = \pi(40 \text{ mm} + (n - 1) \cdot 1 \text{ mm}) \cdot \frac{n}{2}$ ;  $n \approx 95,0$ .  
Man erhält 95 Windungen.

152

#### Aufgaben zu 6.4

150/1. a)  $25000 \text{ DM} \cdot 1,04^5 \approx 30416,32 \text{ DM}$       b)  $25000 \text{ DM} \cdot 1,06^{10} \approx 44771,19 \text{ DM}$

2. a) 7472,58 DM      b) 5607,02 DM

3. a)  $p \approx 4,50\%$       b)  $p \approx 8,25\%$

4. a) 6,5%      b) 3,9%      c) 8,0%      d) 26,0%

5. 1) a) 30504,75 DM      1) b) 45350,46 DM  
2) a) 30524,92 DM      2) b) 45484,92 DM

6. a) 10375 DM      b) 29041,95 DM      c) 70735,44 DM

7. a) 1) 7057,11 DM ( $\approx 7100 \text{ DM}$ )      2) 5704,12 DM ( $\approx 5700 \text{ DM}$ )  
b) 100607,77 DM bei 1) bzw. 99927,65 DM bei 2)

8. a) Monatszins  $\frac{2}{3}\%$ ; Zahl der Zinsmonate  $= 11 + 10 + \dots + 1 = 66$ ;  
Zins im 1. Jahr  $= 5 \text{ DM} \cdot \frac{2}{3} \cdot 66 = 220 \text{ DM}$ ;  
Kontostand am Jahresende  $= 6220 \text{ DM} = 12,44 \cdot 500 \text{ DM}$ .  
b)  $6220 \text{ DM} (1,08 + 1) = 12937,60 \text{ DM}$   
c)  $6220 \text{ DM} (1,08^4 + 1,08^3 + \dots + 1) = 36490,26 \text{ DM}$   
d)  $500 \text{ DM} (1,006^{59} + 1,006^{58} + \dots + 1) \approx 36738 \text{ DM}$

151/9. a) 26752,60 DM      b) Nein; Endwert 26764,51 DM

10. a) 1) 1253,88 DM      2) 1469,30 DM      3) 1729,70 DM  
b)  $1000 \text{ DM} \cdot 1,0814^7 \approx 1729,45 \text{ DM}$

11. a)  $p \approx 8,33\%$       b) 1)  $p \approx 8,00\%$       2)  $p \approx 7,75\%$

Au

15

also

hlich  
esem

DM

151/12.	Jahr	Schuld am Jahresanfang	Schuld-zinsen	Jahres-rate	Tilgung
	1.	40 000,—	3000,—	10 000,—	7 000,—
	2.	33 000,—	2475,—	10 000,—	7 525,—
	3.	25 475,—	1910,63	10 000,—	8 089,37
	4.	17 385,63	1303,92	10 000,—	8 696,08
	5.	8 689,55	651,72	9 341,27	8 689,55

Die Restzahlung am Ende des 5. Jahres beträgt 9 341,27 DM.

152/13.	Jahr	Schuld am Jahresanfang	Schuld-zinsen	Tilgung	Jahres-rate
	1.	40 000,—	3000,—	8 000,—	11 000,—
	2.	32 000,—	2400,—	8 000,—	10 400,—
	3.	24 000,—	1800,—	8 000,—	9 800,—
	4.	16 000,—	1200,—	8 000,—	9 200,—
	5.	8 000,—	600,—	8 000,—	8 600,—

Die Restzahlung am Ende des 5. Jahres beträgt 8 600 DM.

14. a) 1)  $2000 \text{ DM} \cdot 1,01^5 - 200 \text{ DM} \frac{1,01^5 - 1}{0,01} = 1081,82 \text{ DM}$  2) 508,58 DM

b) Letzte Rate: 117,97 DM

[Entweder (Restschuld nach 10 Monaten)  $\cdot 1,01 \approx 117,97 \text{ DM}$  oder  
200 DM – (Guthaben nach Zahlung von 11 vollen Raten)  $\approx 117,97 \text{ DM}$ ]

15. a) 13 300 DM; letzte Rate 12 721,23 DM

b) 9 100 DM; letzte Rate 8 154,20 DM

16. a) Restschuld nach 15 Jahren: 107 230,67 DM

b) Restschuld nach 27 Jahren: 9 595,17 DM.

Im 28. Jahr sinkt diese Restschuld nach Zahlung der 1. Rate auf  
[9 595,17 DM  $\cdot 1,02 - 3375 \text{ DM} = ] 6412,07 \text{ DM}$ , nach Zahlung der 2. Rate auf  
3 165,31 DM. Zur völligen Tilgung müssen als 3. Rate noch 3 228,62 DM gezahlt  
werden.

17. a) 150 000 DM

b)  $117817,77 \text{ DM} (\approx 118 \cdot 10^3 \text{ DM})$

### Aufgaben zu 7.1

157/1. a) 7      b) -5      c) -1      d) -2      e) -4,5      f)  $\frac{1}{3}$

2. a)  $\log_3\left(\frac{729}{64}\right) = 6$       b)  $\log_{\frac{27}{8}}\left(\frac{2187}{128}\right) = \frac{7}{3}$

- 158/3. a) 1)  $[2; 3]$ ,  $[2,3; 2,4]$ ,  $[2,32; 2,33]$ ,  $[2,321; 2,322]$   
 2)  $[1; 2]$ ,  $[1,5; 1,6]$ ,  $[1,56; 1,57]$ ,  $[1,568; 1,569]$   
 3)  $[0; 1]$ ,  $[0,2; 0,3]$ ,  $[0,23; 0,24]$ ,  $[0,235; 0,236]$   
 4)  $[-1; 0]$ ,  $[-0,2; -0,1]$ ,  $[-0,18; -0,17]$ ,  $[-0,179; -0,178]$   
 5)  $[-2; -1]$ ,  $[-1,6; -1,5]$ ,  $[-1,52; -1,51]$ ,  $[-1,513; -1,512]$   
 6)  $[3; 4]$ ,  $[3,1; 3,2]$ ,  $[3,18; 3,19]$ ,  $[3,180; 3,181]$
- b) 1)  $\log_3 5 \approx 1,46$       2)  $\log_7 0,7 \approx -0,183$   
 3)  $\log_{0,5} \frac{5}{3} \approx -0,737$       4)  $\log_{15} \sqrt{2} \approx 0,128$
4. a) 2      b) 4      c) 4      d)  $n$   
 e) 10      f) 3      g) 3      h) 4
5. a) -1      b) -1      c) -2      d) -4  
 e) -1      f) -3      g) -2      h) -2
6. a) -3      b) -4      c) -2      d) -4  
 e) -7      f) -3      g) 3      h) -3
7. a) 2      b) -2      c) 2      d) -2  
 e) 3      f) -4      g) -4      h) -3
8. a)  $\frac{3}{2}$       b)  $\frac{4}{3}$       c)  $\frac{3}{2}$       d)  $\frac{2}{3}$   
 e)  $-\frac{3}{4}$       f)  $-\frac{4}{3}$       g)  $\frac{10}{7}$       h)  $\frac{2}{3}$   
 i)  $\frac{3}{2}$       k)  $\frac{2}{3}$       l)  $-\frac{1}{2}$       m)  $\frac{5}{2}$
9. a)  $\frac{1}{2}$       b)  $\frac{1}{3}$       c)  $\frac{2}{11}$       d)  $\frac{4}{9}$   
 e)  $-\frac{3}{5}$       f)  $-\frac{3}{2}$       g)  $-\frac{2}{7}$       h)  $-\frac{3}{5}$   
 i)  $-\frac{3}{2}$       k)  $\frac{2}{7}$       l)  $-\frac{1}{4}$       m)  $\frac{5}{3}$
10. a) 2      b) -6      c) 30      d) -6  
 e)  $\frac{12}{7}$       f)  $-\frac{12}{5}$       g)  $-\frac{4}{3}$       h)  $\frac{2}{3}$
11. a) 6      b) -8      c)  $4\frac{1}{15}$
- 159/12. a) 0      b) 1      c) 2      d)  $n$   
 e) -1      f) -2      g)  $-n$       h)  $\frac{1}{2}$   
 i)  $\frac{1}{3}$       k)  $\frac{2}{5}$       l)  $-\frac{3}{7}$       m)  $\frac{15}{4}$
13. a) -2      b)  $-\frac{3}{2}$       c)  $\frac{1}{9}$       d)  $-\frac{2}{3}$   
 e)  $2n$       f)  $-\frac{2}{3}$       g) 6      h) -8
14. a) 8      b)  $\frac{1}{25} (= 0,04)$       c) 3      d)  $\sqrt[3]{2}$   
 e) 11      f)  $\frac{13}{9}$       g)  $\sqrt{2}$       h)  $\sqrt{0,5} (= 2^{-\frac{1}{2}})$   
 i) 16      k)  $\pm 49$       l) 4      m)  $x > -2,5 \wedge x \neq -2$

- 159/15. a) 2,378      b) 237,8      c) 23,78  
 d) 0,4444      e) 1000      f) 0,1230

16. a)  $\{1, 10, 100\}$       b)  $\{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512\}$   
 c)  $\{1, 3, 9, 27, 81, 243, 729\}$       d)  $1, 10, 100\}$

17. Es soll gelten:  $\sqrt[n]{n} = 10^r$  mit  $n \in \mathbb{N}$ ,  $r \in \mathbb{Q}$  und  $r \leq 3$ ,  
 also  $n = 10^{2r}$  mit  $n \in \mathbb{N}$ ,  $r \in \mathbb{Q}$  und  $r \leq 3$ .

$10^{2r}$  stellt nur für  $2r \in \mathbb{N}_0$  eine ganze Zahl dar.

Damit erhält man folgende Lösungen:

$r$	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
$n$	1	10	$10^2$	$10^3$	$10^4$	$10^5$	$10^6$

18. Für alle Beispiele a) bis f) gilt, daß  $\log_b a$  positiv ist, da  $a > 1$  und  $b > 1$ .  
 $(x = \log_b a \Leftrightarrow a = b^x; x \mapsto b^x$  echt monoton wachsend und  $b^0 = 1$ .) Bei der Annahme  $\log_b a = \frac{m}{n}$  können daher  $m$  und  $n$  als natürliche Zahlen vorausgesetzt werden.

a)  $\log_{10} 2 = \frac{m}{n} \Leftrightarrow 2 = 10^{\frac{m}{n}} \Leftrightarrow 2^n = 10^m \Leftrightarrow 2^n = 2^m \cdot 5^m$

Da in der letzten Gleichung der Primfaktor 5 links nicht vorkommt, ist sie – wegen der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung – falsch und damit auch die Annahme.

b)  $\log_{10} 5 = \frac{m}{n} \Leftrightarrow 5^n = 10^m \Leftrightarrow 5^n = 2^m \cdot 5^m$ . Falsch! (vgl. Primfaktor 2)

c)  $\log_{10} 6 = \frac{m}{n} \Leftrightarrow 6^n = 10^m \Leftrightarrow 2^n \cdot 3^n = 2^m \cdot 5^m$ . Falsch! (vgl. Primfaktoren 3 u. 5)

d)  $\log_2 3 = \frac{m}{n} \Leftrightarrow 3^n = 2^m$ . Falsch!

e)  $\log_5 9 = \frac{m}{n} \Leftrightarrow 9^n = 5^m \Leftrightarrow 3^{2n} = 5^m$ . Falsch!

f)  $\log_q p = \frac{m}{n} \Leftrightarrow q^n = p^m$ . Falsch, da  $p$  und  $q$  verschiedene Primzahlen sind.

19.  $\log_x y = x \Leftrightarrow y = x^x$ ;  $x > 0 \wedge x \neq 1 \wedge x$  ganzzahlig  $\Rightarrow x \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$ .

Man erhält folgende Lösungen

$x$	2	3	4	5	6	7
$y$	4	27	256	3125	46656	823543

20. Die Gleichung  $1^x = a$  hat für  $a \neq 1$  keine und für  $a = 1$  unendlich viele Lösungen, sie ist damit nicht eindeutig nach  $x$  auflösbar.

21. Für die Addition und die Multiplikation gilt das Kommutativgesetz; daher ist es gleichgültig, ob bei einer Summe (einem Produkt) der erste oder der zweite Summand (Faktor) gesucht ist. Bei Potenzen ist i.a.  $a^b \neq b^a$ ; daher stellt die Bestimmung der Basis eine andere Aufgabe dar als die Bestimmung des Exponenten (wenn jeweils die anderen Stücke der Gleichung  $a^b = c$  gegeben sind).

## Aufgaben zu 7.2

163

161/1. Mit  $x := \log_a u$  und  $y := \log_a v$  gilt  $a^x = u$  und  $a^y = v$ .

Also ist  $\frac{u}{v} = \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$  und damit

$$\log_a\left(\frac{u}{v}\right) = \log_a(a^{x-y}) = x - y, \quad \text{d. h.} \quad \log_a\left(\frac{u}{v}\right) = \log_a u - \log_a v.$$

2. a)  $\log_a 3 + \log_a u + \log_a v$       b)  $\log_a 2 + \log_a m + \log_a n + \log_a v$   
 c)  $-\log_a 5 - \log_a u - \log_a v$       d)  $\log_a u + \log_a w - \log_a 3 - \log_a v$   
 e)  $2\log_a 2 + \log_a x + \log_a y - 3\log_a 3 - \log_a z$   
 f)  $2\log_a 3 + \log_a 5 + 2\log_a c + \log_a d + \log_a e$   
 g)  $2\log_a 2 - \log_a 3 + \log_a p - \log_a r$

3. a)  $\log_a 2 + \log_a 3$       b)  $3\log_a 2 + \log_a 3$       c)  $2\log_a 5 + \log_a 3$   
 d)  $4\log_a 3$       e)  $3(\log_a 2 + \log_a 5)$       f)  $2\log_a 2 - \log_a 7$   
 g)  $-\log_a 11$       h)  $2\log_a 2 + \log_a 3 - 2\log_a 5$   
 i)  $-2\log_a 5$       k)  $2\log_a 13 - 2\log_a 2 - \log 5$   
 l)  $\frac{1}{2}\log_a 3$       m)  $\frac{3}{5}\log_a 2 + \frac{1}{5}\log_a 3$

- 162/4. a)  $\log_a 6$       b)  $\log_a \frac{5}{7}$       c)  $\log_a \frac{2}{11}$   
 d)  $\log_a 32$       e)  $\log_a 32$       f)  $\log_a 1$

5. a)  $3\log_a u$       b)  $\log_a 2 + 4\log_a c$   
 c)  $3(\log_a 3 - \log_a u - \log_a v)$       d)  $2\log_a u + \log_a v - 3(\log_a 2 + \log_a w)$   
 e)  $\frac{1}{4}\log_a u$       f)  $\frac{5}{6}\log_a u - \frac{1}{6}\log_a v$   
 g)  $-\frac{2}{3}\log_a r - \frac{1}{3}\log_a s - \frac{1}{3}\log_a t$       h)  $\frac{2}{3}\log_a p + \frac{1}{2}\log_a 2 + \frac{1}{2}\log_a q$

6. a) nein  $[\log_b x + 2 = \log_b(x \cdot b^2) \neq \log_b(x + 2)]$   
 b) nein  $[\log_b a^2 = 2 \cdot \log_b a \neq (\log_b a)^2]$   
 c) nein, drei verschiedene Terme  
 $[\log_b(a^2)^3 = 6 \cdot \log_b a; (\log_b a^2)^3 = 8 \cdot (\log_b a)^3; ((\log_b a)^2)^3 = (\log_b a)^6]$

7. a)  $\log_a(m^2 n^3)$       b)  $\log_a \sqrt{\frac{q}{p}}$       c)  $\log_a(cd^9)$   
 d)  $\log_a ac$       e)  $\log_a \frac{a^2}{u^2 v}$       f)  $\log_a \frac{n}{a^2}$

8. a) 1      b) 2      c) -1      d) 3      e) 3      f)  $-\frac{3}{4}$

9. a) 2      b) 1      c) -1      d)  $2 + 3\log_7 2$       e)  $-\frac{1}{2}$       f)  $2,5 + 2\log_9 11$

10. a) 1      b) 2      c) 1      d) 1      e) 0

11. a)  $x = 7$       b)  $x = 3$  ( $-5$  gehört nicht zur Definitionsmenge!)  
 c)  $x_1 = 3; x_2 = -7$       d)  $x_1 = 2; x_2 = 5$       e)  $L = \{ \}$       f)  $x = \mathbb{R}$

Auf

164

165

163/12. a) 3      b) 4      c) 4      d) 4      e) 2      f) 1      g) 8

13. a)  $x = \frac{5}{9}$       b)  $x = 5a$       c)  $x = \frac{81}{64}$   
 d)  $x = -\frac{32}{b^2}$       e)  $x = \frac{1}{c}$       f)  $x = 1$   
 g)  $x = \frac{1}{8}$       h)  $x = 10^{-\frac{3}{2}} \left( = \frac{1}{\sqrt{1000}} \right)$

14. a)  $x_1 = 10^{-4}; x_2 = -10^{-4}$       b)  $x = 10^{-4}$       c)  $x_1 = 10^{-4}; x_2 = -10^{-4}$   
 d)  $x_1 = \frac{1}{25}; x_2 = -\frac{1}{25}$       e)  $x_1 = \frac{14}{27}; x_2 = \frac{13}{27}$       f)  $x = 103$

### Aufgaben zu 7.3.1

164/1. a)  $3 \cdot \log_8 2$       b)  $3 \cdot \log_8 3$       c)  $\frac{3}{4} \cdot \log_8 5$   
 d)  $\frac{3}{2} \cdot \log_8 u$       e)  $\frac{3}{4} \cdot \log_8 v$       f)  $\frac{3}{5} \cdot \log_8 w$

2. a)  $\frac{\log_2 5}{\log_2 7}$       b)  $\frac{\log_5 1,7}{\log_5 3}$       c)  $\frac{3}{\log_4 5}$   
 d)  $\frac{-2}{\log_7 1,1}$       e)  $\frac{\log_3 2}{2}$       f)  $2 \cdot \log_{25} 1,63$

3. a)  $\frac{1}{\log_{10} 2}$       b)  $\frac{2}{\log_{10} 5}$       c)  $\frac{\log_{10} 5}{2}$       d)  $\frac{\log_{10} 2}{3}$       e)  $\frac{3}{\log_{10} 2}$   
 f)  $\frac{3}{1 + \log_{10} 2}$       g)  $-\log_{10} 7$       h)  $\frac{1}{2 \log_{10} 3}$       i)  $2 \log_{10} 6$       k)  $-\frac{3}{\log_{10} 2}$

l)  $\frac{\log_{10} 2}{\log_{10} 3}$       m)  $-\frac{\log_{10} 2}{\log_{10} 5}$       n)  $\frac{\log_{10} 3 - \log_{10} 7}{-\log_{10} 9} = -\frac{1}{2} + \frac{\log_{10} 7}{\log_{10} 9}$

o)  $\frac{\log_{10} 523}{\log_{10} 11}$       p)  $\frac{\log_{10} 49}{\log_{10} 0,16} = \frac{\log_{10} 7}{\log_{10} 0,4} = \frac{\log_{10} 7}{\log_{10} 4 - 1}$

4.  $\log_b a = \frac{\log_a a}{\log_a b} = \frac{1}{\log_a b} \Rightarrow \log_b a \cdot \log_a b = 1$

5. a)  $\log_{a^n} x^n = \frac{\log_a x^n}{\log_a a^n} = \frac{n \cdot \log_a x}{n} = \log_a x$

b) Nein!  $\log_{a^n} x^n$  existiert, falls  $a^n > 0$ ,  $a^n \neq 1$  und  $x^n > 0$ . Das lässt bei geradem  $n$  auch  $a < 0$ ,  $a \neq -1$  oder  $x < 0$  zu; in diesen Fällen ist  $\log_a x$  nicht definiert. Falls  $\log_{a^n} x^n$  existiert, gilt aber:  $\log_{a^n} x^n = \log_{|a|} |x|$ .

g<sub>9</sub> 11 165/6. a)  $\log_2 x = \frac{\log_2 9}{\log_2 4} = \frac{1}{2} \log_2 9 = \log_2 3 \Rightarrow x = 3$   
 b)  $x = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{1}{5}\sqrt{5}$       c)  $x = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{3}\sqrt{3}$       d)  $x = 49^2 = 2401$   
 e)  $\log_a x^2 = 2 - \log_a 2 = \log_a \frac{a^2}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{a}{\sqrt{2}}$

$$\text{f)} \log_{V_a^-}(x-3) = \log_{V_a^-}\sqrt{x+3} \Rightarrow x-3 = \sqrt{x+3} \Rightarrow x = 6$$

$$\text{g)} \log_9(1 + \log_2 x) = \log_9 4 \Rightarrow 1 + \log_2 x = 4 \Rightarrow x = 8$$

$$\text{h)} \log_3(1 + \log_2 x) = -\log_3 2 \Rightarrow 1 + \log_2 x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}\sqrt{2}$$

### Aufgaben zu 7.3.2

166/1. a) 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6      b) -1; -2; -3; -4; -5; -6      c) 3; -5;  $\frac{1}{2}$ ;  $\frac{4}{3}$ ; 6; 9

2. a) 3,5413; 2,5413; 0,5413; -1,4587      b) 3,7783; 5,7783; 0,7783; -0,2217

c) 2,7716; -2,2284; 4,7716; -0,2284      d) 1,3222; 5,3222; -3,6778; 0,3222

e) 2,3032; 3,3032; -0,6968; 1,3032

169

167/3. a) ( $\lg z = \lg a + k \wedge 0 \leq \lg a < 1$ )  $\Rightarrow k \leq \lg z < k + 1$

b) 1) 0      2) 1      3) 3      4) 5

Die Kennzahl ist um 1 kleiner als die Zahl der Stellen vor dem Komma.

c) 1) -1      2) -2      3) -5      4) -3

Man erhält die Kennzahl, indem man die Anzahl der Nullen, mit denen die Dezimalzahl beginnt (die Null vor dem Komma mitgezählt), mit -1 multipliziert.

168/4. a) Nach Voraussetzung besteht zwischen den beiden Zahlen  $x_1$  und  $x_2$  eine Gleichung  $x_1 = x_2 \cdot 10^k$  mit  $k \in \mathbb{Z}$ .

Daher gilt:  $\lg x_1 = \lg x_2 + k$ , also  $\lg x_1 - \lg x_2 = k$ .

b) Aus  $\lg x_1 - \lg x_2 = k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$  folgt  $x_1 = x_2 \cdot 10^k$  und damit die Behauptung.

5. a) 2,195; 219,5;  $2195 \cdot 10^2$ ; 0,2195

b) 5994; 0,05994;  $5994 \cdot 10$ ; 0,00005994

c) 56,92; 5,692; 0,0005692; 5692

d) 1,744;  $1744 \cdot 10^3$ ; 0,001744; 174,4

6. a) 224,6      b) 0,2397      c) 26,93      d)  $2,895 \cdot 10^{-13}$

e) 1,030      f) 1,343      g) 19,05      h)  $6,310 \cdot 10^{12}$

i) 0,2563      k) 0,9234      l)  $1,409 \cdot 10^{-3}$       m)  $2,319 \cdot 10^{-6}$

7. a) 2,81      b) 0,827      c) -1,10      d) -6

e) 72,5      f) 1,30      g) -5,29      h) 6,64

8. a) 1,206      b) -3,511      c) -0,7429      d) 0,4071

9. a) 31      b) 302      c) 105      d) 241      e) 101      f) 198

g) 155      h) 695975      i) 489      k) 45      l) 163      m) 287

10. a) Endziffer 5 (gilt für jede Potenz  $5^n$  mit  $n \in \mathbb{N}$ );

Anfangsziffer 7, da  $\lg 5^{150} = 0,84 \dots + 104$  und damit  $5^{150} = 7,0 \dots \cdot 10^{104}$ .

b) 150 Endnullen, Anfangsziffer 7 ( $50^{150} = 5^{150} \cdot 10^{150}$ , vgl. a))

- c) Die letzte Ziffer heißt 6, da die Folge der Endziffern der Potenzen von 2 rein-periodisch mit der 4stelligen Periode 2, 4, 8, 6 ist.

Aus  $\lg 2^{1000} \approx 301,03$  folgt, daß die Mantisse dieses Logarithmus zwischen 025 und 035 liegt. In beiden Fällen beginnt der Numerus mit 10... Also hat  $2^{1000}$  als erste Ziffer 1 und als zweite Ziffer die 0.

- d) 1) Erste Ziffer 1, letzte Ziffer 6

2) Erste Ziffer 3, letzte Ziffer 3, da die Endziffern der Potenzen von 7 die Periode 7, 9, 3, 1 haben und  $7^n = 4n + 3$  gilt ( $n \in \mathbb{N}$ ).

3) Erste Ziffer 3, letzte Ziffer 1 (Periode der Endziffern: 3, 9, 7, 1)

169/11. a) 1) 1    2) 7    3) 10    b) 1) -1    2) -6    3) 0,5

c) 1) 9,966    2) 4,322    3) -0,3219    4) 1,161

12. a) 1)  $1 = \underline{1} \cdot 2^0 =: \underline{1}_2$ ;  $[\lg 1] + 1 = 0 + 1 = 1$

2)  $5 = \underline{1} \cdot 2^2 + \underline{0} \cdot 2^1 + \underline{1} \cdot 2^0 =: \underline{101}_2$ ;  $[\lg 5] + 1 = 2 + 1 = 3$

3)  $32 = \underline{100000}_2$ ;  $[\lg 32] + 1 = 5 + 1 = 6$

4)  $100 = \underline{1100100}_2$ ;  $[\lg 100] + 1 = 6 + 1 = 7$

Die Ergebnisse entsprechen der Behauptung.

- b) Zu  $n \in \mathbb{N}$  gibt es ein eindeutig bestimmtes  $k \in \mathbb{N}_0$ , so daß  $2^k \leq n < 2^{k+1}$  gilt ( $2^k$  ist die größte in  $n$  enthaltene Zweierpotenz). Dann lautet die Darstellung von  $n$  im Zweiersystem  $n = 1 \cdot 2^k + z_{k-1} \cdot 2^{k-1} + z_{k-2} \cdot 2^{k-2} + \dots + z_1 \cdot 2^1 + z_0 \cdot 2^0$ ,  $z_i \in \{0, 1\}$ , also kurz  $n = \underline{1z_{k-1}z_{k-2} \dots z_1z_0}_2$ ; die Darstellung ist also  $(k+1)$ -stellig.

Aus  $2^k \leq n < 2^{k+1}$  folgt  $k \leq \lg n < k+1$ , also  $[\lg n] = k$ . Damit gilt  $[\lg n] + 1 = k+1$ ; das ist die Stellenzahl von  $n$  im Zweiersystem.

13. a) Man wendet das Halbierungsverfahren an:

1. Frage: »Ist die Zahl kleiner als 8?« Die Antwort bestimmt die richtige Hälfte des Punktintervalls, die noch 8 Zahlen enthält.

Mit der 2., 3. und 4. Frage schränkt man analog die Zahl der Möglichkeiten auf 4, dann 2, dann 1 Zahl ein.



- b) Die Gegenstände seien mit 1 bis  $n$  nummeriert. Zu  $n > 1$  gibt es eindeutig  $k \in \mathbb{N}$ , so daß  $2^{k-1} < n \leq 2^k$ . Man wendet das Halbierungsverfahren auf die Folge 1, 2, 3, ...,  $2^k$  (bzw. auf das Intervall  $[0,5; 2^k + 0,5]$ ) an. Nach  $i$  Schritten enthält die verbleibende Teilfolge noch  $\frac{2^k}{2^i} = 2^{k-i}$  Zahlen, also nach  $k$  Schritten genau 1 Zahl. Man benötigt also höchstens  $k$  Fragen. Wegen  $2^{k-1} < n \leq 2^k$  gilt  $k-1 < \lg n \leq k$ . Im Fall  $\lg n = k$ , also  $n = 2^k$ , ist  $[\lg n] = k$ ; ansonsten gilt  $[\lg n] = k-1$ .



Daher benötigt man  $[\lg n]$  Fragen, wenn  $n$  eine Zweierpotenz ist, ansonsten höchstens  $[\lg n] + 1$  Fragen.

### Aufgaben zu 7.3.3

- 170/1. a)  $[0; 1], [0,5; 1], [0,5; 0,75], [0,625; 0,75], [0,625; 0,6875]$   
 b)  $[-1; 0], [-1; -0,5], [-0,75; -0,5], [-0,75; -0,625], [-0,6875; -0,625]$   
 c)  $[3; 4], [3; 3,5], [3,25; 3,5], [3,25; 3,375], [3,3125; 3,375]$   
 d)  $[2; 3], [2; 2,5], [2; 2,25], [2,125; 2,25], [2,1875; 2,25]$   
 e)  $[-1; 0], [-0,5; 0], [-0,25; 0], [-0,125; 0], [-0,125; -0,0625]$   
 f)  $[1; 2], [1,5; 2], [1,75; 2], [1,875; 2], [1,875; 1,9375]$
2. Wenn man mit einem Intervall der Länge 1 beginnt und das Halbierungsverfahren anwendet, hat das 7. Intervall die Länge  $\frac{1}{64}$ . Seine Intervallmitte  $m_7$  hat dann vom gesuchten Logarithmus einen Abstand, der kleiner als  $\frac{1}{128}$ , also kleiner als  $\frac{1}{100}$  ist.
- a)  $[1; 2], [1; 1,5], [1; 1,25], [1,125; 1,25], [1,1875; 1,25], [1,21875; 1,25], [1,21875; 1,234375];$   
 $\log_6 9 = 1,2265625 \pm 0,0078125.$
- b)  $[-1; 0], [-0,5; 0], [-0,5; -0,25], [-0,375; -0,25], [-0,375; -0,3125], [-0,34375; -0,3125], [-0,328125; -0,3125];$   
 $\lg 0,8 = -0,3203125 \pm 0,0078125.$
- c)  $[2; 3], [2; 2,5], [2; 2,25], [2; 2,125], [2,0625; 2,125], [2,0625; 2,09375], [2,078125; 2,09375];$   
 $\lg 123 = 2,0859375 \pm 0,0078125.$


### Aufgaben zu 7.4

- 179/1 a)  $\mathbb{R}^+$  b)  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  c)  $\mathbb{R}^+$  d)  $\{x \mid x > 2,5\}$  e)  $\{x \mid x > -2,5\}$  f)  $\mathbb{R} \setminus \{1,5\}$
2. a)  $\mathbb{R}$  b)  $\mathbb{R} \setminus [-1; 1]$  c)  $\mathbb{R}$  d)  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$  e)  $\{x \mid |x - 2| > 3\} = \mathbb{R} \setminus [-1; 5]$  f)  $\mathbb{R} \setminus \{-4; 0,5\}$
3. a)  $x = \lg y$  b)  $x = \log_{\frac{1}{3}} y$  c)  $x = \frac{1}{2} \cdot \log_5 y$  d)  $x = 2 - \log_{0,1} y$   
 e)  $x = 2^y$  f)  $x = (\frac{2}{3})^y$  g)  $x = -0,5 \cdot 10^y$  h)  $x = 0,1^{2y}$




- 179/5. Basis  $b$ : a) 2 b) 4 c)  $\frac{1}{2}\sqrt{2}$  d) 0,5 e) 25 f) 81


Graphen:




6. Zu den Punkten  $P(x|y)$  mit  $x > 0$ ,  $x \neq 1$  und  $y \neq 0$  gibt es genau eine, zu den Punkten  $Q(1|y)$  mit  $y \neq 0$  gibt es keine Logarithmusfunktion. Durch  $E(1|0)$  geht der Graph jeder Logarithmusfunktion.



Die Graphen entstehen aus der Kurve  $y = \text{ld } x$  durch eine Parallelverschiebung in  $y$ -Richtung; denn es gilt  $\text{ld } 5x = \text{ld } x + \text{ld } 5$  bzw.  $\text{ld } \frac{x}{5} = \text{ld } x - \text{ld } 5$ .




179/9. a)




$G_f$  besteht nur aus dem rechten Ast,  $G_g$  aus beiden Ästen.

b)



$G_f$  besteht nur aus dem rechten Ast,  $G_g$  aus beiden Ästen.

c)



$f$  und  $g$  sind dieselbe Funktion.  $G_f$  und  $G_g$  bestehen aus beiden Ästen.

10. a) ja

e) nein

b) nein

f) ja


c) nein

g) nein

d) ja

h) ja


180/11. y

Aus dem Graphen  $y = \log_2 x$  entsteht der Graph

- 1)  $y = \log_4 x$ , indem man die Ordinaten halbiert,
- 2)  $y = \log_8 x$ , indem man die Ordinaten drittelt.

(Anwendung einer axialen Streckung mit Faktor  $\frac{1}{2}$  bzw.  $\frac{1}{3}$ )

12. y




Es handelt sich wieder um die Graphen von Logarithmusfunktionen, und zwar um

- a)  $x \mapsto \log_{\sqrt[3]{10}} x$       b)  $x \mapsto \log_{\sqrt[3]{10}} x$       c)  $x \mapsto \log_{100} x$


13. a) Zum gegebenen Punkt  $P(x_1 | y_1)$  bestimmt man den Punkt  $\bar{P}(x_1 | \bar{y}_1)$  mit  $\bar{y}_1 = \text{ld } x_1$  und den Punkt  $T(x_1 | 0)$ .

Wegen  $y_1 = \log_b x_1 = \frac{\text{ld } x_1}{\text{ld } b}$  gilt  $\frac{y_1}{\bar{y}_1} = \frac{1}{\text{ld } b} = \text{const.}$

Zu  $x_2 > 0$  erhält man mit Hilfe von  $\bar{y}_2 = \text{ld } x_2$  das gesuchte  $y_2$  durch eine Ähnlichkeitskonstruktion, denn es gilt  $\frac{y_2}{\bar{y}_2} = \frac{y_1}{\bar{y}_1}$ . Die Abbildung zeigt eine geeignete Form der Durchführung. ( $\overline{ST} = \overline{TP}$ ,  $\overline{S'T'} = \overline{T'P'}$ ,  $S'P' \parallel SP$ )



b) Analog zu a) ( $\overline{ST} = \overline{TQ}$ ,  $\overline{S'T'} = \overline{T'Q'}$ ,  $S'Q' \parallel SQ$ )



181

180/14. a)  $x > 1$

d)  $x > 5$

b)  $0 < x < 1$

e)  $1 < x < 3$

c)  $0 < x < 1$

182

15. a)  $x = 4$

d)  $x_1 = 4; x_2 = -2$

b)  $x = 3^5 = 243$

e)  $x = 125$

c)  $x = \pm 4$

f)  $x = \sqrt[4]{0,2} \approx 0,66874$

16. a)  $\log_2 5 < \log_2 7$

c)  $\log_7 \frac{3}{5} < \log_7 \frac{5}{8}$

b)  $\log_{\frac{1}{2}} 5 > \log_{\frac{1}{2}} 7$

d)  $\log_{0,2} 0,7 < \log_{\frac{1}{5}} 0,699$

e)  $\log_{\frac{1}{2}} 15 < \log_{\frac{1}{2}\sqrt{2}} 0,15$

f)  $\log_{\pi} 1 > \log_{\pi} \frac{12}{13}$

17. Der Logarithmus liegt zwischen

a) 2 und 3

b) 3 und 4

c) 0 und 1

d) 1 und 2

e) 3 und 4

f)  $-1$  und 0

g)  $-7$  und  $-6$

h)  $-3$  und  $-2$

i)  $-1$  und 0

k)  $-5$  und  $-4$

l)  $-6$  und  $-5$

m) 1 und 2

n) 2 und 3

o) 1 und 2

p) 1 und 2

18. a)  $x < \sqrt{5}$



b)  $x \geq 11$

c)  $1 < x < 27$

d)  $3 \leq x \leq 8$

e)  $x > -\frac{1}{4}$  (Definitionsmenge = Lösungsmenge!)

f)  $x > \frac{1}{4}$  (quadrat. Unglg. mit  $L' = \{x | x < -1 \vee x > \frac{1}{4}\}$ , aber  $D = \{x | x > -\frac{1}{2}\}$ )



20. a)  $\lg a = 0,8 \Rightarrow a \approx 6,31$

c)  $\lg c = 1,36 \Rightarrow c \approx 22,91$

b)  $\lg b = 2,5 \Rightarrow b \approx 316,23$

181/21. a) 1) 1 Längeneinheit (LE)      2) 3 LE      3) 2 LE


b) Der Abstand beträgt  $d = \log_b x_1 - \log_b x_2$  Längeneinheiten.

$$\lg \frac{x_1}{x_2} = \lg x_1 - \lg x_2 = \frac{1}{\log_b 10} (\log_b x_1 - \log_b x_2). \text{ Also ist } d = \log_b 10 \cdot \lg \frac{x_1}{x_2}.$$


22. a) Streckungsfaktor  $m = \frac{1}{\lg 2} \left( = \frac{\lg 10}{\lg 2} = \text{ld} 10 \right).$

b) Der Punkt  $x$  hat auf der ersten Skala vom Punkt 1 die Entfernung  $\lg x$ , auf der zweiten Skala vom Punkt 1 die Entfernung  $\text{ld} x$ . Nach der Streckung mit  $m = \frac{1}{\lg 2}$  beträgt die Entfernung auf der ersten Skala  $\lg x \cdot \frac{1}{\lg 2} = \text{ld} 2$ , ist also ebenso groß wie auf der zweiten Skala.

23.




182/24.




Auf der unteren, von rechts nach links orientierten Skala hat der Punkt  $\frac{1}{x}$  vom Punkt 1 die Entfernung  $-\lg x = \lg \frac{1}{x}$ ; die Kehrwertskala ist also eine logarithmische Skala. (Bei den Rechenstäben wird i.a. die in der unteren Zeile angegebene Beschriftung mit 1 bis 10 verwendet.)

25. a)



Man stellt die Marke 1 der unteren Skala unter die Marke  $\pi$  der oberen. Dann hat in der oberen Skala der über  $x$  (unten) liegende Punkt von 1 die Entfernung  $\lg \pi + \lg x^2 = \lg(x^2 \pi)$ ; man liest also den Inhalt  $x^2 \pi$  der Kreisfläche ab.


b)



Man stellt die Marke 1 der unteren Skala unter die Marke  $\frac{\pi}{4} (< 1)$  der oberen bzw. die Marke 1 der oberen Skala über die Marke  $\sqrt{\frac{\pi}{4}}$  der unteren. Dann liest man über  $x$  (untere Skala) den Kreisinhalt  $x^2 \frac{\pi}{4}$  auf der oberen Skala ab.


(Bei den Rechenstäben wird die Addition von  $\lg \frac{\pi}{4}$  zu  $\lg x^2$  mit einem sog. Läufer durchgeführt (Abb. 175.1), auf dem 2 Striche mit Abstand  $|\lg \frac{\pi}{4}|$  angebracht sind.)

26.



Stellt man die Marke  $b$  (unten) unter die Marke  $a$  (oben), so liest man unter  $c$  (oben) die gesuchte Zahl  $x$  ab.

182/27.




18:

28. a)  $x \mapsto 100 \cdot 0,1^x$       b)  $x \mapsto (\sqrt{10})^x$   
 c)  $x \mapsto 80 \cdot 2^x$       d)  $x \mapsto 4 \cdot 0,5^x$

29. Da die Punkte mit guter Näherung auf einer Geraden liegen, kann man die Meßreihe als Bestätigung der Behauptung betrachten. Die Gerade verbindet ungefähr die Punkte  $(0|80)$  und  $(6|1)$ . Die Gleichung der entsprechenden Exponentialfunktion lautet


$$h = 80 \cdot \left(\sqrt[6]{\frac{1}{80}}\right)^t, \quad \text{also} \quad h \approx 80 \cdot 0,48^t. \quad (\text{Abbildung auf Seite 93})$$

Abbildung  
zu den  
Aufgaben  
182/29.  
und  
182/30.



30. Aus der Zeichnung ergibt sich  $p_0 \approx 1000 \text{ hPa}$ ,  $p(10) \approx 280 \text{ hPa}$ .  
(Die Aufgabe kann auch rechnerisch gelöst werden: Aus  $879 \text{ hPa} = p_0 \cdot b^{-1}$  und  $533 \text{ hPa} = p_0 \cdot b^{-5}$  folgt  $879 : 533 = b^4$ , also  $b = \sqrt[4]{879 : 533} \approx 1,133$  und  $p_0 = 879 \text{ hPa} \cdot b \approx 996 \text{ hPa}$ ,  $p(10) \approx 285 \text{ hPa}$ .)

183/31. a)




Der Graph ist vermutlich eine Gerade.

- b) Legt man auf die logarithmisch geteilte  $x$ -Achse eine äquidistant geteilte  $t$ -Achse so, daß  $t = 0$  mit  $x = 1$  und  $t = 1$  mit  $x = 10$  zusammenfällt, so gilt allgemein  $t = \lg x$ .

Wegen  $y = \log_b x = \frac{\lg x}{\lg b} = \frac{1}{\lg b} \cdot \lg x$  hat die Funktion  $x \mapsto \log_b x$  im  $(t, y)$ -System eine Gleichung der Form  $y = a \cdot t$ , mit  $a = \frac{1}{\lg b} \neq 0$ . Ihr Graph ist somit eine Gerade durch den Punkt  $t = 0, y = 0$  bzw.  $x = 1, y = 0$ .

183/32.




Aus der Zeichnung erhält man etwa folgende Näherungswerte:

- a) 1 km      b) 2 km      c) 7,5 km      d) 13 km      e) 15 km


(Berechnung ergibt als genauere Werte:

- a) 0,92 km      b) 1,86 km      c) 7,40 km      d) 12,94 km      e) 15,24 km)

33.



183/34. a)



- 1)  $y \approx 1,2$
- 2)  $y \approx 2,0$
- 3)  $y \approx 6,2$
- 4)  $y \approx 16$


b)  $0,4 = C \cdot 0,2^\varrho$   
 $10 = C \cdot 20^\varrho$  }  $\Rightarrow \frac{10}{0,4} = \left(\frac{20}{0,2}\right)^\varrho \Leftrightarrow 25 = 100^\varrho \Leftrightarrow \varrho = (\lg 25) : 2 = \lg 5$

$$10 = C \cdot 20^{\lg 5} = C \cdot 5 \cdot 2^{\lg 5} \Leftrightarrow C = \frac{2}{2^{\lg 5}} = 2^{1-\lg 5} = 2^{\lg 2}$$

(Letzteres wegen  $1 - \lg 5 = \lg 10 - \lg 5 = \lg \frac{10}{5} = \lg 2$ ).

Die Funktionsgleichung lautet also  $y = 2^{\lg 2} \cdot x^{\lg 5}$ .

35.



- a) Die Tabelle entspricht einer Potenzfunktion, da im doppelt-logarithmischen Koordinatensystem die Punkte mit sehr guter Näherung auf einer Geraden liegen. [ $y$  ist jeweils der auf 1 Stelle nach dem Komma gerundete Wert von  $y = 2,5 \cdot x^{0,6}$ .]

- b) Keine Potenzfunktion, die Punkte liegen nicht auf einer Geraden.  
[ $y$  ist jeweils der auf 2 geltende Ziffern gerundete Wert von  $y = \frac{1}{3} \cdot 1,6^x$ .]

### Aufgaben zu 7.5.1

185/1. a)  $x = 3$

b)  $x = \frac{\lg 11}{\lg 3} \approx 2,183$

c)  $x = \frac{1}{\lg 3 - \lg 7} \approx -2,718$

d)  $x = \frac{\lg 0,6}{\lg 1,2} \approx -2,802$

2. a)  $x = 5 + \frac{\lg 6}{\lg 4} \approx 6,292$

b)  $x = \frac{7}{3}$

c)  $x_1 = 1; x_2 = -1$

d)  $x = 3 - \frac{\lg 0,5}{\lg 0,4} \approx 2,244$

3. a)  $x = 3$

b)  $x = \frac{-\lg 2}{1 - \lg 3,1} \approx -0,5918$

c)  $x = \frac{4(\lg 5 - \lg 9) - \lg 2 + 1}{\lg 4 + \lg 5 - \lg 9} \approx -0,9289$

4. a)  $x = \frac{\lg 5}{\lg 15} \approx 0,5943$

b)  $x = 2$

c)  $x = \frac{\lg 490}{\lg 32 - \lg 7} \approx 4,076$

d)  $x = \frac{\lg 3 + 4 \lg 13 - 1,5 \lg 2}{0,5 + \lg 13} \approx 2,777$

186/5. a)  $\dots \Leftrightarrow 2 + \sqrt[3]{x} = x \Leftrightarrow x = 4$       b)  $\dots \Leftrightarrow x^2 = -x \Leftrightarrow x = 0 \vee x = -1$

6. a)  $\dots \Leftrightarrow 7^x = 7 \Leftrightarrow x = 1$

b)  $\dots \Leftrightarrow (\frac{2}{3})^x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\lg 2}{\lg 3 - \lg 2} \approx 1,710$

7. a)  $\dots \Leftrightarrow 5^x = 5 \vee 5^x = 10 \Leftrightarrow x = 1 \vee x = \frac{1}{\lg 5} \approx 1,431$

b)  $\dots \Leftrightarrow 3^x = \sqrt[3]{3} \Leftrightarrow x = 0,5$  [Hinweis:  $1 + 4\sqrt[3]{3}(\sqrt[3]{3} + 1) = (1 + 2\sqrt[3]{3})^2$ ]

8. a)  $\dots \Leftrightarrow 2^x = 3 \Leftrightarrow x = \frac{\lg 3}{\lg 2} \approx 1,585$

b)  $\dots \Leftrightarrow 2^x = 16 \Leftrightarrow x = 4$

9. a) 1) Anwachsen auf 6,0 Milliarden in etwa 8,3 Jahren, also 1999

2) Verdoppelung der Weltbevölkerung bis 2037

b) 1) Zunahme um 1 Million in etwa  $4\frac{1}{2}$  Tagen

2) Zunahme um 77 Millionen in etwa 350 Tagen

## Aufgaben zu 7.5.2

187/1. a)  $x = 3^{1.5} \approx 5,196$       b)  $x = \frac{1}{256} = 3,90625 \cdot 10^{-3}$       c)  $x = 10^{0.1} \approx 1,259$

2. a) Die 1. Gleichung hat die Lösungen  $x_1 = 1$  und  $x_2 = -6$ , die 2. nur die Lösung  $x_1 = 1$ .

Bemerkung: Es gilt  $\lg[(x+4) \cdot (x+1)] = 1 \Leftrightarrow (x+4) \cdot (x+1) = 10$ , aber  $\lg(x+4) + \lg(x+1) = 1 \Leftrightarrow (x+4) \cdot (x+1) = 10 \wedge x+4 > 0 \wedge x+1 > 0$ .

- b) Nein, die erste Gleichung hat  $L_1 = \{ \}$ , die zweite  $L_2 = \{5\}$ .

- c) Es gilt (1)  $\Leftrightarrow (rx+s)(ux+v) = b^c$   
und (2)  $\Leftrightarrow (rx+s)(ux+v) = b^c \wedge rx+s > 0 \wedge ux+v > 0$ .

Das heißt, von den Lösungen der Gleichung (1) sind nur diejenigen auch Lösungen von (2), welche zusätzlich die beiden Ungleichungen erfüllen; also  $L_2 \subset L_1$ .

188/3. a)  $x = 14$       b)  $x = \frac{2 + \sqrt{10}}{3} \approx 1,721$


4. a)  $x = 2$       b)  $x = -1$       c)  $x_1 = -1; x_2 = -21$

5. a)  $x_1 = 7; x_2 = \frac{13}{9}$       b)  $x = 0$

6. a)  $x = 17$       b)  $x = 7$


## Aufgaben zu 7.5.3

192/1. a)




$x \approx 0,7$

b)



$\xi_1 \approx -1,2; \xi_2 \approx 0,8$

c)



$x \approx 1,2$

2. a)  $x_{n+1} = (7 - 2^{x_n}) : 8; x_0 = 0,7$  ergibt  $x_4 = 0,67538\dots, x_5 = 0,67537\dots$  mit  $LS(x_4) > 0$  und  $LS(x_5) < 0$ ; also  $x \approx 0,6754$ .


- b)  $x_{n+1} = -\sqrt{2 - 1,5^{x_n}}; x_0 = -1,2$  ergibt  $x_2 = -1,1745\dots, x_3 = -1,1742\dots$

Da  $LS(-1,1745) > 2$ ,  $LS(-1,174) < 2$ , gilt  $\xi_1 \approx -1,174$ .

$x_{n+1} = \sqrt{2 - 1,5^{x_n}}; x_0 = 0,8$  ergibt  $x_6 = 0,78924\dots, x_7 = 0,78921\dots$  mit  $LS(x_6) > 2$ ,  $LS(x_7) < 2$ ; also  $\xi_2 \approx 0,7892$ .

- c)  $x_{n+1} = 1 + 3^{-x_n}; x_0 = 1,2$  ergibt  $x_5 = 1,2526\dots, x_6 = 1,2525\dots$  mit  $LS(x_5) < 0$ ,  $LS(x_6) > 0$ ; also  $x \approx 1,253$ .

192/3. a)



$$\xi_1 \approx 0,1$$

$$\xi_2 \approx 1,5$$

b) In der Definitionsmenge  $\mathbb{R}^+$  der Gleichung gilt:

$$0,5x^2 - 1 = \lg x \Leftrightarrow x^2 = 2(\lg x + 1) \Leftrightarrow x = \sqrt{2(\lg x + 1)}.$$

$$x_{n+1} = \sqrt{2(\lg x_n + 1)}; x_0 = 1,5 \text{ ergibt } x_5 = 1,54131\dots, x_6 = 1,54135\dots$$

Für  $f(x) := 0,5x^2 - 1 - \lg x$  gilt  $f(x_6) < 0, f(1,5415) > 0$ ; also  $\xi_2 \approx 1,541$

Die andere Lösung kann man mit dieser Iteration nicht berechnen.


c) Für  $x \in \mathbb{R}^+ \setminus \{\sqrt{2}\}$  gilt

$$0,5x^2 - 1 = \lg x \Leftrightarrow x(x^2 - 2) = 2x \lg x \Leftrightarrow x = \frac{2x \lg x}{x^2 - 2}.$$

$$x_{n+1} = \frac{2x_n \cdot \lg x_n}{x_n^2 - 2}; x_0 = 0,1 \text{ ergibt } x_6 = 0,10114\dots, x_7 = 0,10116\dots \text{ Es gilt}$$

$$f(x_7) > 0, f(0,1012) < 0; \text{ also } \xi_1 \approx 0,1012.$$

4. a)



$$x_s \approx 3,8; y_s \approx 0,3$$

$$\text{b) } \frac{1}{x} = \lg(x-2) \Leftrightarrow 10^{\frac{1}{x}} + 2 = x \quad (\text{für } x > 2).$$

$$x_{n+1} = 10^{\frac{1}{x_n}} + 2; x_0 = 3,8 \text{ ergibt } x_3 = 3,826\dots, x_4 = 3,825\dots$$

Für  $f(x) := \frac{1}{x} - \lg(x-2)$  gilt  $f(x_3) < 0, f(x_4) > 0$ ; also  $x_s \approx 3,83$  und  $y_s \approx 0,26$ .

193/5. a)

$x$	$x < 0$	$0$	$1$	$x > 1$
$y$	$y < -7$	$-7$	$3$	$y > 3$

$$x_{n+1} = \lg(9 - 2^{x_n}); x \approx 0,8567.$$

<b>b)</b>	$x$	$x < 0$	0	1	2	3	4	$x > 4$
	$y$	$y > 5$	5	-3	-3	-1	1	$y > 1$

also Nullstellen  $\xi_1, \xi_2$  in  $[0; 1]$  bzw.  $[3; 4]$ .

$$5 - x \cdot 2^{4-x} = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5}{2^{4-x}} = 2^x \cdot \frac{5}{16} = 2^x : 3,2.$$

$x_{n+1} = 2^{x_n} : 3,2$  liefert  $\xi_1 \approx 0,4173$  (aber nicht  $\xi_2$ ).

$$5 - x \cdot 2^{4-x} = 0 \Leftrightarrow 2^x = 3,2x \Leftrightarrow x = \frac{\lg(3,2x)}{\lg 2} \quad (\text{für } x > 0).$$

$$x_{n+1} = \frac{\lg(3,2x_n)}{\lg 2} \quad \text{liefert} \quad \xi_2 \approx 3,475 \quad (\text{aber nicht } \xi_1).$$

Auch aus der Umformung  $x \cdot (5 - x \cdot 2^{4-x}) = 0$  lassen sich brauchbare Iterationsformeln gewinnen:

$$x_{n+1} = \frac{3,2x_n^2}{2^{x_n}} \quad \text{liefert } \xi_2, \quad x_{n+1} = \sqrt{(x_n \cdot 2^{x_n}) : 3,2} \quad \text{liefert } \xi_1.$$

<b>c)</b>	$x$	$0,5 < x < 1$	1	2	$x > 2$
	$y$	$y < 0$	-2	1,47...	$y > 0$

$$\lg(2x-1) + 3x - 5 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5 - \lg(2x-1)}{3}.$$

$$x_{n+1} = \frac{5 - \lg(2x_n - 1)}{3} \quad \text{liefert} \quad x \approx 1,558.$$

<b>d)</b>	$x$	$x < 4$	4	4,5	4,7	$4,7 < x < 5$
	$y$	$y > 0$	0,954...	0,327...	-0,373...	$y < 0$

Es gibt eine Nullstelle in  $[4,5; 4,7]$ .

$$\lg(x^2 + 1) + \lg(5 - x) = 0 \Leftrightarrow 5 - x = 2^{-\lg(x^2 + 1)}$$

$$x_{n+1} = 5 - 2^{-\lg(x_n^2 + 1)} \quad \text{liefert} \quad x \approx 4,607.$$

6. a)  $x_{n+1} = \cos x_n$ ;  $x \approx 0,7391$       b)  $x_{n+1} = \sqrt{\sin x_n}$ ;  $x \approx 0,8767$

$$\text{c)} \quad x_{n+1} = \sqrt{\frac{1}{1 + \tan x_n}}; \quad x \approx 0,7274$$

7. a)  $J(r) = \frac{P}{4r^2\pi}$ .  $J(r)$  ist bei konstanter Leistung proportional zu  $\frac{1}{r^2}$ .

b) 0 phon

c) 1)  $10J_0$       2)  $10^4J_0$       3)  $10^8J_0$       4)  $10^{13}J_0$

d) Intensität in 1 m Entfernung:  $J(1) = 10^4J_0$  (vgl. c))

$$\text{Intensität in } x \text{ m Entfernung: } J(x) = \frac{1}{x^2} \cdot J(1) \quad (\text{vgl. a}))$$

Es muß gelten:  $J(x) \leq J_0$

$$\Rightarrow \frac{1}{x^2} \cdot 10^4J_0 \leq J_0 \Rightarrow x \geq 100.$$

Man muß sich mindestens 100 m von der Schallquelle entfernen.

e) In 10 m Entfernung ist die Intensität 40<sup>2</sup>mal so groß wie in 400 m Entfernung.

Also gilt:

$$L(10) = 10 \lg \left( \frac{J(10)}{J_0} \right) \text{ phon} = 10 \cdot \lg \left( \frac{1600 \cdot J(400)}{J_0} \right) \text{ phon} = \\ = 10 \lg \left( \frac{J(400)}{J_0} \right) \text{ phon} + 10 \cdot \lg 1600 \text{ phon} = 80 \text{ phon} + 32 \text{ phon} = 112 \text{ phon.}$$

f) 1)  $L = 10 \lg \left( \frac{8 \cdot 10^{-5}}{10^{-12}} \right) \text{ phon} = 79 \text{ phon}$

2)  $1,26 \cdot 10^{-12} \text{ W m}^{-2}$  bei 1 phon,

$10^{-10} \text{ W m}^{-2}$  bei 20 phon,

$10^{-2} \text{ W m}^{-2}$  bei 100 phon,

$10 \text{ W m}^{-2}$  bei 130 phon.

3)  $J(5) = \frac{5}{\pi} \cdot 10^{-2} \text{ W m}^{-2}; \quad L(5) = 10 \lg \left( \frac{5}{\pi} \cdot 10^{10} \right) \text{ phon} = 102 \text{ phon}$

$$J(10) = \frac{5}{4\pi} \cdot 10^{-2} \text{ W m}^{-2}; \quad L(10) = 10 \lg \left( \frac{5}{4\pi} \cdot 10^{10} \right) \text{ phon} = 96 \text{ phon}$$

$$J(50) = \frac{5}{\pi} \cdot 10^{-4} \text{ W m}^{-2}; \quad L(50) = 10 \lg \left( \frac{5}{\pi} \cdot 10^8 \right) \text{ phon} = 82 \text{ phon}$$

g) Für einen Ton von 125 Hz ergeben sich die Intensitäten

$1,26 \cdot 10^{-9} \text{ W m}^{-2}$  bei 1 phon,

$10^{-7} \text{ W m}^{-2}$  bei 20 phon,

$10 \text{ W m}^{-2}$  bei 100 phon,

$10^4 \text{ W m}^{-2}$  bei 130 phon.

194/8. a)  $J_1 : J_2 = \sqrt{10} : 1$ , d.h.,  $J_1 \approx 3,16 \cdot J_2$ .

b) 1)  $\beta \approx 3,0 \text{ dB}$  2)  $\beta = 10 \text{ dB}$  3)  $\beta = 20 \text{ dB}$

c) Wegen  $\frac{J_2}{J_1} = \frac{P_2}{P_1}$  gilt auch  $\beta = 10 \lg \left( \frac{P_2}{P_1} \right) \text{ dB}$ .

$$20 \text{ dB} = 10 \lg \left( \frac{P_2}{0,05 \text{ W}} \right) \text{ dB} \Rightarrow P_2 = 5 \text{ W.}$$

d)  $10 \cdot \lg \left( \frac{J_2}{J_1} \right) \text{ dB} = n \text{ dB} \Rightarrow J_2 = J_1 \cdot 10^{\frac{n}{10}}$ ;

$$L_1 = 10 \lg \left( \frac{J_1}{J_0} \right) \text{ phon};$$

$$L_2 = 10 \lg \left( \frac{J_1 \cdot 10^{\frac{n}{10}}}{J_0} \right) \text{ phon} = L_1 + 10 \cdot \frac{n}{10} \text{ phon} = L_1 + n \text{ phon.}$$

Die Lautstärke ändert sich um  $n$  phon.

## Übersetzungen aus 7.6

### Abbildung 199.1:

Der Logarithmen erstes Tausend,  
 das der Verfasser drucken ließ, nicht in der Absicht, es der Öffentlichkeit zu übergeben,  
 sondern teils, um dem Wunsch gewisser seiner Freunde für sich nachzukommen, teils auch,  
 um mit seiner Hilfe nicht nur etliche sich anschließende Tausende, sondern die gesamte Tafel  
 der Logarithmen, die der Berechnung aller Dreiecke dient, bequemer vollenden zu können.  
 Er [= der Verfasser] hat nämlich selbst, vor einem Jahrzehnt, mit Hilfe algebraischer  
 Gleichungen und Differenzen, die den Sinuswerten selbst proportional sind, eine Tafel der  
 Sinuswerte von Grund auf genau erstellt, und zwar für jeden Grad und auch allen Hun-  
 dertsteln eines Grades: diese, hofft er, zusammen mit den beigefügten Logarithmen, so Gott  
 will, ans Licht zu bringen, sobald sich eine passende Gelegenheit ergibt.  
 Weil aber diese Logarithmen verschieden sind von denen, die ihr hochberühmter, der steten  
 Erinnerung und Verehrung werter Erfinder in seinem *Canon Mirificus* veröffentlicht hat, so ist  
 zu hoffen, daß sein nachgelassenes Buch uns nächstens völlig zufriedenstellen wird. Dieser  
 redete dem Verfasser unablässig zu (als er ihn zweimal in seinem Haus zu Edinburg besuchte  
 und, bei ihm aus freundlichste aufgenommen, mit größtem Vergnügen einige Wochen ge-  
 blieben war und ihm von diesen [d. h. den neuen Logarithmen] einen besonders bedeutsamen  
 Teil, den er damals fertiggestellt hatte, gezeigt hatte), diese Arbeit auf sich zu nehmen. Diesem  
 war jener [= der Verfasser] sehr gern zu Willen.

*Gering ist der Umfang, aber nicht unbeträchtlich der Ertrag und auch die Mühe.*

### Abbildung 202.2:

Logarithmische Arithmetik  
 oder

dreißig Tausend Logarithmen, für die in natürlicher Reihenfolge wachsenden Zahlen von  
 der Einheit bis 20 000 und von 90 000 bis 100 000. Mit deren Hilfe können viele arithmetische  
 und geometrische Aufgaben gelöst werden.

Diese Zahlen erfand als erster der hochberühmte Mann Johannes Neperus [= John NAPIER],  
 Baron von Merchiston: sie aber veränderte nach dessen Wunsche und erhellt ihre Erzeugung  
 und ihren Gebrauch Henricus Briggs [= Henry BRIGGS], in der hochberühmten Uni-  
 versität von Oxford Professor für Geometrie auf dem Savile-Lehrstuhl.

Gott gab uns Leben und Geist, auf daß wir sie nutzen gleichsam wie Geld, wobei der Zahltag  
 nicht vorherbestimmt ist.



Zu London,  
 gedruckt hat es Wilhelm Jones, 1624

#### Bemerkungen:

- 1) Lehrstühle werden nach ihren Stiftern benannt. Sir Henry SAVILE stiftete 1619 einen Lehrstuhl für Astronomie und einen für Geometrie und bot letzteren Henry BRIGGS an.

2) Das Wappen ist das Wappen Großbritanniens für die Jahre 1603 bis 1707, ausgenommen die Jahre der Republik (1649–1660) und die WILHELM III. [1689–1702]\*.

**I R** = Iacobus Rex. JAKOB wurde, erst ein Jahr alt, 1567 nach Abdankung seiner Mutter MARIA STUART als JAKOB VI. König von Schottland und 1603, nach dem Tode ELISABETHS I., als JAKOB I. König von England und Irland. Gestorben 1625.\*\*

Die Felder seines Wappenschildes haben folgende Bedeutung.

a 3 goldene Löwen oder Leoparden auf rotem Grund, seit 1195 Wappen von König RICHARD I. LÖWENHERZ [1189–1199]

<i>b</i>	<i>a</i>		<i>d</i>
<i>a</i>	<i>b</i>		
		<i>b</i>	<i>a</i>
<i>c</i>		<i>a</i>	<i>b</i>

b 3 goldene Lilien auf blauem Grund, das Wappen der Könige von Frankreich. Ursprünglich ein Lilienfeld, seit 1377 auf die Dreizahl reduziert. EDUARD III. [1327–1377] verband 1340 sein englisches Wappen *a* mit dem französischen Lilienfeld *b* zu  $\frac{b}{a} \frac{a}{b}$ , um seinen Anspruch auf den französischen Thron zu dokumentieren, der Auslöser des Hundertjährigen Kriegs (1337–1453) zwischen England und Frankreich war. HEINRICH IV. [1399–1453] reduzierte um 1407 auch im englischen Wappen auf 3 Lilien. Am 1. Januar 1801 wurden sie mit dem Verzicht auf den französischen Thron aus dem englischen Wappen entfernt.

c Eine goldene Harfe mit weißen Saiten auf blauem Grund, seit Jahrhunderten das Symbol Irlands.

d Das Wappen Schottlands. Der rote Löwe auf goldenem Grund wurde von König ALEXANDER II. [1214–1243] eingeführt; sein Sohn ALEXANDER III. [1249–1286] fügte die roten Zwillingsfäden, die beidseits von roten Lilien besetzt sind, hinzu.

Der Wappenspruch *Honi soit qui mal y pense* – »Ein Schelm, wer Arges dabei denkt« – ist die Devise des von EDUARD III. 1348 gestifteten Hosenbandordens – *The Most Noble Order of the Garter* –, des höchsten britischen Ordens.

## zu Seite 204

Mein Wunsch war es, jene Tausende, die zwischen 20 und 90 noch fehlten, berechnen und drucken zu lassen, und ich hatte sie alle beinahe fertiggestellt, und zwar durch mich selbst und durch einige Freunde, die meine Regeln genügend instruiert hatten, und durch Übereinkunft war das Geschäft angemessen unter uns aufgeteilt worden; aber ich bin jetzt von jener Bürde und Sorge erlöst durch einen gewissen Adrian Vlacque, einen Holländer, der all die Hunderttausend in Gänze berechnet und gedruckt hat in Latein, Holländisch und Französisch, 1000 Bücher in diesen 3 Sprachen, und sie fast alle schon verkauft hat. Aber er hat durchwegs 4 meiner Ziffern abgeschnitten; und er hat meine Widmung und auch mein Vorwort an den Leser weggelassen, ebenso zwei Kapitel, nämlich das zwölfte und das dreizehnte, alles übrige hat er gänzlich unverändert von mir übernommen.

\* Die Zahlen in eckigen Klammern sind Regierungszeiten.

\*\* Auf seine Proklamation vom 12.4.1606 geht die erste Form des *Union Jack* zurück.

## Anhang

### Zwei Aufgaben zu den Logarithmen von BÜRGİ und NAPIER samt Lösung

**Vorbemerkung:** In Definition 155.1 wurde die Gleichung  $y = b^x$  durch  $x = \log_b y$  gelöst. Damit kann man sagen, daß die Zahlen der arithmetischen Folge  $0, 1, 2, 3, \dots$  die Logarithmen der Zahlen der geometrischen Folge  $1, b, b^2, b^3, \dots$  zur Basis  $b$  sind. Es gilt dann die Gleichung  $y = b^{\log_b y}$ .

Betrachtet man eine allgemeine geometrische Folge  $a, aq^1, aq^2, aq^3, \dots$  mit  $a, q > 0$ , so läßt sich der Begriff des Logarithmus folgendermaßen verallgemeinern.

**Definition:** Ist  $y = aq^x$ , dann heißt  $x =: L_B y$  allgemeiner Logarithmus von  $y$ , und es gilt  $y = aq^{L_B y}$ ,  $y \in \mathbb{R}^+$ .

1. Den *Progrß-Tabulen* BÜRGIS liegt für  $n \in \mathbb{N}_0$  die Vorschrift  $10n \mapsto 10^8(1 + 10^{-4})^n$  zugrunde. Setzen wir der Übersichtlichkeit halber  $10^8 =: a$  und  $1 + 10^{-4} =: q$ , so lautet die Zuordnung  $10n \mapsto y_n = aq^n$ , die mit  $n \mapsto y_n = aq^{\frac{n}{10}}$  äquivalent ist. Erweitern wir die Definitionsmenge auf ganz  $\mathbb{R}$ , so erhalten wir  $x \mapsto y = aq^{\frac{x}{10}}$ .

Zu jeder schwarzen Zahl  $y$  gehört eine rote Zahl  $x$ , die man den BÜRGISchen Logarithmus von  $y$  nennt und mit  $L_B y$  bezeichnet. Für ihn gilt also  $y = aq^{\frac{L_B y}{10}}$ .

a) Zeige, daß die in der Unterschrift zu Abbildung 198.1 angegebenen Druckfehler tatsächlich vorhanden sind. Berechne dazu  $aq^{\frac{5000}{10}}$  und  $aq^{\frac{230270}{10}}$ .

b) Zeige, daß für  $L_B y$  gilt:  $L_B y = \frac{10 \lg y - 80}{\lg q}$

c) Berechne damit einige der auf der Titelseite der *Progrß-Tabulen* (Abbildung 198.1) angegebenen roten Zahlen, also die BÜRGISchen Logarithmen der schwarzen Zahlen.

d) Zum Rechnen hat BÜRGİ seine Tafel wie folgt verwendet:

$$\left. \begin{array}{l} u = aq^{\frac{L_B u}{10}} \\ v = aq^{\frac{L_B v}{10}} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{uv}{a} = aq^{\frac{L_B u + L_B v}{10}}. \quad \text{Andererseits gilt } \frac{uv}{a} = aq^{\frac{L_B(uv)}{10}}.$$

Aus den beiden letzten Gleichungen gewinnt man die Beziehung

$$L_B u + L_B v = L_B \left( \frac{uv}{a} \right). \quad (*)$$

Man erhält also den Wert des Produkts  $uv$ , indem man die roten Zahlen  $L_B u$  und  $L_B v$  addiert, zu ihrem Summenwert die entsprechende schwarze Zahl aufsucht und diese dann noch mit  $a = 10^8$  multipliziert.

$$\begin{array}{ll} \text{Beispiel: } u = 101440201 & L_B u = 1430 \\ v = 101826387 & L_B v = 1810 \\ & \hline L_B u + L_B v = 3240 \end{array}$$

$$\text{also } \frac{uv}{a} = 103292892 \quad \text{und damit}$$

$$uv = 103292892 \cdot 10^8.$$

1) Überprüfe die Rechnung mit deinem Taschenrechner.

2) Berechne unter Verwendung von Abbildung 198.1 die Produkte

a)  $116\,182\,553 \cdot 164\,868\,006$  und b)  $134\,983\,856 \cdot 211\,692\,064$ .

3) Leite eine (\*) entsprechende Beziehung für  $uvw$  her.

e) Leite eine Formel für den Quotienten  $\frac{u}{v}$  her und berechne damit

1)  $164\,868\,006 : 116\,182\,553$       2)  $211\,692\,064 : 134\,983\,856$

3)  $101\,826\,387 : 101\,440\,201$

f) Zeige: Ist in einem Produkt ein Faktor eine Zehnerpotenz  $10^k$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , so erhält man den Logarithmus von  $y \cdot 10^k$ , indem man zum Logarithmus von  $y$  das  $k$ -fache der »ganzen Roten Zahl«  $R := 230\,270,022$  addiert; kurz

$$L_B(y \cdot 10^k) = L_B(y) + kR, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (**)$$

g) Zahlen, die nicht der Dekade  $[10^8; 10^9]$  angehören, bzw. Logarithmen, die nicht dem Intervall  $[0; R]$  angehören, können durch Verwendung von (\*\*) aus f) in passende Zahlen bzw. Logarithmen transformiert werden.

*Beispiel:*

1)  $L_B(173,320536) = L_B(173\,320\,536 \cdot 10^{-6}) =$   
 $= 55\,000 - 6 \cdot 230\,270,022 = -1\,326\,620,132$

2)  $L_B y = 435\,270,022 = 205\,000 + R = L_B(u \cdot 10)$   
 Da  $205\,000 = L_B(776\,710\,499)$  ist, ist  $y = 7\,767\,104\,990$ .

1) Überprüfe die Beispiele mit dem Taschenrechner.

2) Berechne a) das Produkt  $6359,23131 \cdot 0,738831728$   
 b) den Quotienten  $101,440201 : 10182,6387$ .

Überprüfe die erhaltenen Ergebnisse mit dem Taschenrechner.

h) Auch das Radizieren funktioniert mit Formel (\*). Setzen wir nämlich  $u = v = \sqrt{z}$ , so erhalten wir  $L_B(\sqrt{z}) + L_B(\sqrt{z}) = L_B\left(\frac{z}{a}\right)$ . Mit  $x := \frac{z}{a}$  wird daraus  $2L_B(\sqrt{ax}) = L_B(x)$ .

Wegen  $a = 10^8$  erhält man schließlich  $L_B(10^4 \cdot \sqrt{x}) = \frac{1}{2}L_B(x)$ .

Man ermittelt also  $\sqrt{x}$ , indem man den zum schwarzen Numerus  $x$  gehörenden roten BÜRGischen Logarithmus  $L_B(x)$  halbiert. Der zu dieser roten Zahl gehörende schwarze Antilogarithmus hat dann den Wert  $10^4 \cdot \sqrt{x}$ , woraus man nach Division durch  $10^4$  sofort das gesuchte  $\sqrt{x}$  erhält.

*Beispiel:* Gesucht ist  $\sqrt{816\,531\,257}$ .

$$L_B(10^4 \cdot \sqrt{816\,531\,257}) = \frac{1}{2}L_B(816\,531\,257) = \frac{1}{2} \cdot 210\,000 = 105\,000$$




$$10^4 \cdot \sqrt{816\,531\,257} = 285\,750\,111$$

$$\sqrt{816\,531\,257} = 28\,575,0111.$$

Überprüfe die Genauigkeit mit deinem Taschenrechner und berechne ebenso

1)  $\sqrt{668\,525\,936}$       2)  $\sqrt{902\,402\,087}$       3)  $\sqrt{31,580\,1133}$ .

2. NAPIER lässt zur Konstruktion der Logarithmen zwei Punkte  $B$  und  $\beta$  in  $A$  bzw.  $\alpha$  mit gleicher Anfangsgeschwindigkeit starten.  $B$  bewegt sich auf einer Geraden mit konstanter Geschwindigkeit fort; dabei legt er in der Zeiteinheit den Weg  $s$  zurück. Nach  $n$  Zeiteinheiten befindet er sich am Ort  $B_n$  und hat die Strecke  $x_n = ns$  zurückgelegt.



NAPIERS Skizze zur Konstruktion der Logarithmen

a) Original aus der *Descriptio* (1614) b) Umzeichnung unter Benutzung von Indizes

Der Punkt  $\beta$  muß die Strecke  $[\alpha\omega]$  der Länge  $y_0 = 10^7$  durchlaufen. Nach der ersten Zeiteinheit langt er bei  $\beta_1$  an, wobei NAPIER der Strecke  $[\alpha\beta_1]$  die Länge 1 gibt. Nach  $n$  Zeiteinheiten kommt er bei  $\beta_n$  an. Dabei bewegt er sich so, daß die Längen  $y_n$  der Reststrecken  $[\beta_n\omega]$  eine geometrische Folge bilden, also  $y_{n+1} = y_n q$  ist.  $q$  stellt NAPIER durch  $\overline{RQ} : \overline{SQ}$  dar; es errechnet sich aus

$$1 = \overline{\alpha\beta_1} = y_0 - y_1 = y_0 - y_0 q = y_0(1 - q) \quad \text{zu} \quad q = 1 - \frac{1}{y_0} = 1 - 10^{-7} = 0,9999999.$$

Die Länge  $s$  gewinnt NAPIER aus der Forderung gleicher Anfangsgeschwindigkeit für  $B$  und  $\beta$ : Da die mittlere Geschwindigkeit auf der Strecke  $[\alpha\beta_1]$  gleich 1 ist, muß die Anfangsgeschwindigkeit größer sein. NAPIER berechnet sie als die mittlere Geschwindigkeit auf der Strecke  $[\beta_{-1}\beta_1]$ . Dazu benötigt er deren Länge

$$\begin{aligned} \overline{\beta_{-1}\beta_1} &= \overline{\beta_{-1}\omega} - \overline{\beta_1\omega} = \frac{1}{q} \cdot \overline{\alpha\omega} - q \cdot \overline{\alpha\omega} = \left( \frac{1}{q} - q \right) \overline{\alpha\omega} = \frac{1 - q^2}{q} \cdot 10^7 = \\ &= \frac{1 - q^2}{q} \cdot \frac{1}{1 - q} = \frac{1 + q}{q} = 1 + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{1 - 10^{-7}}. \end{aligned}$$

Dividiert man den Bruch nach dem Verfahren der Polynomdivision, so erhält man  $\overline{\beta_{-1}\beta_1} = 1 + 1 + 10^{-7} + 10^{-14} + \dots \approx 2 + 10^{-7}$ .

Da  $[\beta_{-1}\beta_1]$  in 2 Zeiteinheiten zurückgelegt wird, ist die mittlere Geschwindigkeit und damit auch die Anfangsgeschwindigkeit beider Bewegungen zahlenmäßig gleich  $s = 1 + \frac{1}{2} \cdot 10^{-7} = 1,000\,000\,05$ .

Nach NAPIER sind die  $x_n$  die Logarithmen der  $y_n$ . Bezeichnen wir den NAPIERSchen Logarithmus mit  $L_N$ , so gilt

$$x_n = L_N y_n \Leftrightarrow ns = L_N y_n \Leftrightarrow n = \frac{1}{s} L_N y_n.$$

Wegen  $y_n = y_0 q^n$  gilt nach der allgemeinen Logarithmusdefinition von Seite 103 des Lösungshefts  $y_n = y_0 q^{\frac{L_N y_n}{s}}$  oder allgemein  $y = y_0 q^{\frac{L_N y}{s}}$ .

- a) Berechne, um den Beginn der nebenstehend abgebildeten NAPIERSchen Logarithmentafel nachvollziehen zu können, für  $n = 0$  bis 11 die auf Ganze gerundeten Werte von  $x_n = ns$  und die zugehörigen  $y_n$ , ferner für  $m = 0$  bis 5 die Werte  $z_m := \sin_7(90^\circ - m \cdot 1')$ , wobei  $\sin_7 \varphi := 10^7 \cdot \sin \varphi$  ist. Läßt man alle  $y_n$ , die keine  $z_m$  sind, weg, dann erhält man eine Tafel, die jedem Winkel letztlich eine gerundete Zahl  $ns$  zuordnet, so daß gilt:

$$ns \text{ gerundet} = L_N(\sin_7 \varphi).$$

Die Werte  $\sin_7 \varphi$  sind also die Numeri, die  $ns$  die Logarithmen. Zeige dabei, daß sich z. B. ergibt

$$L_N(\sin_7 89^\circ 56') = 7.$$

- b) Zeige, daß  $L_N y = \frac{s(\lg y - \lg y_0)}{\lg q}$ .

- c) Berechne  $L_N(\sin_7 30^\circ) = L_N(\frac{1}{2} \cdot 10^7)$ .

NAPIER erhielt wegen eines Rechenfehlers dafür den Wert 6931469. KEPLER korrigierte ihn zu 6931472.

Siehe hierzu Abbildung 201.1 und Fußnote \*\*\* auf Seite 201 des Lehrbuchs.

Logarithmus	Sinus
0	10000000 60
1	10300000 59
2	9999998 58
4	9999996 57
7	9999993 56
11	9999989 55
16	9999986 54
22	9999980 53
28	9999974 52
35	9999967 51
43	9999959 50
52	9999950 49
62	9999940 48
73	9999928 47
84	9999917 46
96	9999905 45
109	9999892 44
123	9999878 43
138	9999861 42
154	9999847 41
170	9999831 40
187	9999813 39
205	9999795 38
224	9999776 37
244	9999756 36
265	9999736 35
287	9999714 34
309	9999692 33
332	9999668 32
356	9999644 31
381	9999619 30
	89

Ausschnitt aus NAPIERS Logarithmentafel von 1614\*

\* Von rechts nach links zeigt die erste Spalte die zu  $89^\circ$  gehörenden Minuten, die zweite Spalte die zugehörigen Werte  $\sin_7 \varphi := 10^7 \cdot \sin \varphi$  und die dritte  $L_N(\sin_7 \varphi)$ .

## Lösungen

1. a) Mit dem Taschenrechner ergibt sich

$$aq^{\frac{5000}{10}} = 105\,126\,847$$

$$aq^{\frac{230270}{10}} = 999\,999\,779 \approx 1\,000\,000\,000$$

b)  $y = 10^8 \cdot q^{\frac{L_B y}{10}}$

$$\lg y = 8 + \frac{L_B y}{10} \lg q$$

$$L_B y = \frac{10 \lg y - 80}{\lg q}$$

c) Zum Beispiel:

$$L_B 285\,750\,111 = 105\,000 \quad L_B 702\,800\,236 = 195\,000 \quad L_B 128\,400\,937 = 25\,000$$

d) 1) -

$$\begin{array}{ll} 2) \alpha) u = 116\,182\,553 & L_B u = 15\,000 \\ v = 164\,868\,006 & L_B v = 50\,000 \\ \hline L_B u + L_B v = 65\,000 \end{array}$$

$$uv = 191\,547\,858 \cdot 10^8$$

$$\begin{array}{ll} \beta) u = 134\,983\,856 & L_B u = 30\,000 \\ v = 211\,692\,064 & L_B v = 70\,000 \\ \hline L_B u + L_B v = 100\,000 \end{array}$$

$$uv = 271\,814\,593 \cdot 10^8$$

$$\left. \begin{array}{l} 3) \frac{uvw}{a^2} = aq^{\frac{L_B u + L_B v + L_B w}{10}} \\ \frac{uvw}{a^2} = aq^{\frac{L_B(\frac{uvw}{a^2})}{10}} \end{array} \right\} \Rightarrow L_B u + L_B v + L_B w = L_B \left( \frac{uvw}{a^2} \right)$$

$$\left. \begin{array}{l} e) a \frac{u}{v} = aq^{\frac{L_B u - L_B v}{10}} \\ a \frac{u}{v} = aq^{\frac{L_B(\frac{u}{v})}{10}} \end{array} \right\} \Rightarrow L_B(u) - L_B(v) = L_B \left( a \frac{u}{v} \right)$$

$$\begin{array}{ll} 1) u = 164\,868\,006 & L_B u = 50\,000 \\ v = 116\,182\,553 & L_B v = 15\,000 \\ \hline L_B u - L_B v = 35\,000 \end{array}$$

$$a \cdot \frac{u}{v} = 141\,904\,272$$

$$\frac{u}{v} = 1,41\,904\,272$$

2) 1,49 179 486

3) 1,00 380 704

f) Es sei  $k =: n$ ,  $n \in \mathbb{N}$

$$L_B(u \cdot 10) = L_B\left(\frac{u \cdot 10^9}{10^8}\right) = L_B(u) + L_B(10^9) = L_B(u) + R$$

$$\begin{aligned} L_B(u \cdot 10^2) &= L_B([u \cdot 10] \cdot 10) = \\ &= L_B[u \cdot 10] + R = \\ &= L_B(u) + R + R = L_B(u) + 2R \end{aligned}$$

Offenkundig erhält man

$$L_B(u \cdot 10^n) = L_B(u) + nR. \quad (1)$$

Mit  $z := u \cdot 10^n$  wird daraus

$$L_B(z) = L_B(z \cdot 10^{-n}) + nR$$

$$L_B(z \cdot 10^{-n}) = L_B(z) - nR \quad (2)$$

(1) und (2) lassen sich zusammenfassen zu

$$L_B(y \cdot 10^k) = L_B(y) + kR, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

g) 1) –

$$\begin{aligned} 2) \text{ a)} \quad L_B(6359,23131 \cdot 0,738831728) &= \\ &= L_B(635923131 \cdot 10^{-5} \cdot 738831728 \cdot 10^{-9}) = \\ &= L_B\left(\frac{635923131 \cdot 738831728}{10^8} \cdot 10^{-6}\right) = \\ &= 185000 + 200000 - 6 \cdot R = \\ &= 385000 - 6R = \\ &= 154729,978 - 5R. \end{aligned}$$

Somit

$$6359,23131 \cdot 0,738831728 = 4698,40185$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad L_B\left(\frac{101440201}{101826387}\right) &= L_B\left(\frac{101440201 \cdot 10^{-6}}{101826387 \cdot 10^{-4}}\right) = \\ &= L_B\left(10^8 \cdot \frac{101440201}{101826387} \cdot 10^{-10}\right) = \\ &= 1430 - 1810 - 10R = \\ &= -380 - 10R = \\ &= 229890,022 - 11R \end{aligned}$$

Somit

$$\frac{101440201}{101826387} = 996207399 \cdot 10^{-11} = 0,0096207399$$

h) 1) 25855,8685

$$3) 5,61961861, \quad \text{da} \quad L_B(10^4 \sqrt{315801133 \cdot 10^{-7}}) =$$

2) 30040,0081

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} L_B(315801133 \cdot 10^{-7}) = \\ &= 57500 - 3,5R = \\ &= 172635,011 - 4R. \end{aligned}$$

2. a)	$n$	$x_n$	$\approx x_n$	$y_n$	$m$	$z_m$
	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
	1	1,000 000 05	1	9 999 999	1	9 999 999,577
	2	2,000 000 10	2	9 999 998	2	9 999 998,308
	3	3,000 000 15	3	9 999 997		
	4	4,000 000 20	4	9 999 996	3	9 999 996,192
	5	5,000 000 25	5	9 999 995		
	6	6,000 000 30	6	9 999 994		
	7	7,000 000 35	7	9 999 993	4	9 999 993,231
	8	8,000 000 40	8	9 999 992		
	9	9,000 000 45	9	9 999 991		
	10	10,000 000 50	10	9 999 990		
	11	11,000 000 55	11	9 999 989	5	9 999 989,423

NB: Für  $m = 1$  wird 9 999 999,577 auf 10 000 000 gerundet, bei allen anderen wird abgerundet.

b)  $y = y_0 q^{\frac{L_N y}{s}}$

$$\lg y = \lg y_0 + \frac{L_N y}{s} \lg q$$

$$L_N y = \frac{s(\lg y - \lg y_0)}{\lg q}$$

$$\text{c) } L_N(\sin_7 30^\circ) = \frac{(1 + 0,5 \cdot 10^{-7}) [\lg(0,5 \cdot 10^7) - \lg 10^7]}{\lg(1 - 10^{-7})} = \\ = 6931471,804 \approx 6931472.$$

**Lösungen**  
**der Aufgaben 111/15 bis 111/19 gemäß der Formulierung von**  
**Satz 108.2 ab der 4. Auflage von *Algebra 10***

**111/15.a)**  $+ - - + + -$  3 Wechsel: 3 oder 1 positive Lösung  
 $- - + + - -$  2 Wechsel: 2 oder 0 negative Lösungen  
 Ganzzahlig möglich:  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$   
 $x_1 = 1$   
 $(x^5 - 3x^4 - 5x^3 + 15x^2 + 4x - 12) : (x - 1) = x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12$

$$x_2 = -1$$

$$(x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12) : (x + 1) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$$

$$x_3 = 2$$

$$(x^3 - 3x^2 - 4x + 12) : (x - 2) = x^2 - x - 6$$

$$x_4 = -2, \quad x_5 = 3$$

$$L = \{-2, -1, 1, 2, 3\}$$

**b)**  $+ + - - +$  2 Wechsel: 2 oder 0 positive Lösungen  
 $+ - - + +$  2 Wechsel: 2 oder 0 negative Lösungen  
 Ganzzahlig möglich:  $\pm 1, \pm 2, \pm 4$   
 $x_1 = 1$   
 $(x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4) : (x - 1) = x^3 + 3x^2 - 4$   
 $x_2 = 1$   
 $(x^3 + 3x^2 - 4) : (x - 1) = x^2 + 4x + 4$   
 $x_3 = x_4 = -2$   
 $L = \{-2; 1\}$

**c)**  $+ - + + -$  3 Wechsel: 3 oder 1 positive Lösung  
 $+ + + - -$  1 Wechsel: 1 negative Lösung  
 Ganzzahlig möglich:  $\pm 1, \pm 3, \pm 9$   
 $x_1 = 1$   
 $(x^4 - 6x^3 + 8x^2 + 6x - 9) : (x - 1) = x^3 - 5x^2 + 3x + 9$   
 $x_2 = -1$   
 $(x^3 - 5x^2 + 3x + 9) : (x + 1) = x^2 - 6x + 9$   
 $x_3 = x_4 = 3$   
 $L = \{-1; 1; 3\}$

**d)**  $+ +$  kein Wechsel: 0 positive Lösungen  
 $- +$  1 Wechsel: 1 negative Lösung  
 Also: 1 negative Lösung, keine positive Lösung  
 $L = \{-1\}$

- e)  $+$   $-$   $+$   $-$  3 Wechsel: 3 oder 1 positive Lösung  
 $+$   $-$   $+$   $-$  3 Wechsel: 3 oder 1 negative Lösung

Ganzzahlig möglich:  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 9, \pm 12, \pm 18, \pm 36$   
 $x_1 = 1$

$$(x^6 - 14x^4 + 49x^2 - 36) : (x - 1) = x^5 + x^4 - 13x^3 - 13x^2 + 36x + 36$$

$$x_2 = -1$$

$$(x^5 + x^4 - 13x^3 - 13x^2 + 36x + 36) : (x + 1) = x^4 - 13x^2 + 36$$

Biquadratische Gleichung, also

$$x^2 = 4 \vee x^2 = 9 \Leftrightarrow x_3 = -2, x_4 = 2, x_5 = -3, x_6 = 3$$

Somit  $L = \{-3, -2, -1, 1, 2, 3\}$ .

- f)  $+$   $-$   $+$  2 Wechsel: 2 oder 0 positive Lösungen  
 $-$   $+$   $+$  1 Wechsel: 1 negative Lösung

Somit: 1 negative Lösung, 2 oder 0 positive Lösungen

Ganzzahlig möglich:  $\pm 1, \pm 2, \pm 11, \pm 22$

$$x_1 = -2$$

$$(x^5 - 5x + 22) : (x + 2) = x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 8x + 11$$

Die möglichen positiven ganzzahligen Lösungen 1 und 11 sind keine Lösungen.

Es gilt sogar: Es gibt überhaupt keine positive Lösung.

Beweis: siehe Seite 54.

- 111/16.a)  $+$   $+$   $+$   $-$  1 Wechsel: 1 positive Lösung  
 $-$   $+$   $-$   $-$  2 Wechsel: 2 oder 0 negative Lösungen

Möglich:  $\pm \frac{1}{3}, \pm 1$

$$x_1 = \frac{1}{3}$$

$$(3x^3 + 5x^2 + 7x - 3) : (x - \frac{1}{3}) = 3x^2 + 6x + 9$$

$$\text{Diskriminante} = 36 - 4 \cdot 3 \cdot 9 < 0$$

$$L = \{\frac{1}{3}\}$$

- b)  $+$   $+$   $-$   $-$  1 Wechsel: 1 positive Lösung  
 $-$   $+$   $+$   $-$  2 Wechsel: 2 oder 0 negative Lösungen

Möglich:  $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm \frac{1}{2}$

$$x_1 = 2$$

$$(2x^3 + x^2 - 8x - 4) : (x - 2) = 2x^2 + 5x + 2$$

$$L = \{-2, -\frac{1}{2}, 2\}$$

- c)  $+$   $-$   $-$   $+$  2 Wechsel: 2 oder 0 positive Lösungen  
 $-$   $-$   $+$   $+$  1 Wechsel: 1 negative Lösung

Möglich:  $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}, \pm \frac{4}{3}, \pm \frac{1}{9}, \pm \frac{2}{9}, \pm \frac{4}{9}$

$$x_1 = 1$$

$$(9x^3 - 9x^2 - 4x + 4) : (x - 1) = 9x^2 - 4$$

$$L = \{-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, 1\}$$

d)  $+ - + - +$  4 Wechsel: 4, 2 oder 0 positive Lösungen

$+ + + + +$  0 Wechsel: 0 negative Lösungen

Möglich:  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}, \frac{1}{64}$

$$x_1 = \frac{1}{2}$$

$$(64x^4 - 128x^3 - 84x^2 - 20x + 1) : (x - \frac{1}{2}) = 64x^3 - 96x^2 + 36x - 2$$

$+ - + -$  3 Wechsel: 3 oder 1 positive Lösung

$- - - -$  0 Wechsel: keine negative Lösung

$$x_2 = \frac{1}{2}$$

$$(64x^3 - 96x^2 + 36x - 2) : (x - \frac{1}{2}) = 64x^2 - 64x + 4$$

$$L = \left\{ \frac{1}{2} - \frac{1}{4}\sqrt{3}; \frac{1}{2}; \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{3} \right\}$$

111/17.a)  $+ + +$  kein Wechsel: keine positive Lösung

$- - +$  1 Wechsel: 1 negative Lösung

Rationale Lösungen können nur  $-1$  oder  $1$  sein.

Beide Werte erfüllen die Gleichung nicht.

b) siehe Seite 55

c) siehe Seite 56

18.a)  $+ + + +$  kein Wechsel: 0 positive Lösungen

$+ + + +$  kein Wechsel: 0 negative Lösungen

Leichter sieht man das so ein:

$$2x^6 + 10x^4 + 7x^2 = -1$$

$$LS \geq 0, \quad RS < 0, \quad \text{also} \quad L = \{ \}.$$

19. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei der höchste Koeffizient  $a_{2n+1}$  positiv.

$a_0 = 0$ : 0 ist eine Lösung, q. e. d.

$a_0 < 0$ : Es gibt eine ungerade Anzahl von Vorzeichenwechseln, weil die Koeffizientenfolge mit  $+$  beginnt und mit  $-$  endet. Also existiert nach Satz 108.2 mindestens eine positive Lösung, q. e. d.

$a_0 > 0$ : Ersetze in der gegebenen Gleichung  $x$  durch  $-x$ . Weil die höchste Potenz ungerade ist, beginnt die Koeffizientenfolge jetzt mit einem  $-$ , endet aber mit einem  $+$ . Also gibt es in dieser Gleichung eine ungerade Anzahl von Vorzeichenwechseln. Somit hat die gegebene Gleichung nach Satz 108.2 mindestens eine negative Lösung, q. e. d.

v.

ien-  
tens

tenz  
nem  
eln.  
ing,

ISBN 3-486-03009-4



9 783486 030099

Bestell-Nr. 03009-4

10

Algebra Barth · Federle · Haller

Lösungen

Oldenbourg