



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

**Hieronymi Dandini Cæsenatis E Societate Iesv De Corpore  
Animato Lib. VII.**

**Dandini, Girolamo**

**Parisiis, 1611**

De Partibus Heterogeneis. Lib. III.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-95641](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-95641)



# HIERONYMI DANDINI Cæsensis, è Societate Iesu.

## DE PARTIBVS HETEROGENEIS.

### LIBER QVARTVS.

#### P R A E F A T I O.

**S**implicium & homogearum partium omnem iam videor compositionem, vim, naturam, & vsum superiori libro comprehendisse; omniumque illarum descriptio facta est. Nunc ad compositarum atque heterogearum, quæ ex illis coagmentantur, inspectionem progrediendum est: corpusque vniuersum perlustrandum, animæ domicilium & instrumentum futurum. Ad quod spectandum eos tantum accerso aut etiam admitto, qui in superioribus libris fuerint non mediocriter exercitati.

*Humani corporis substantia.*

Humani corporis, inquam, descriptio generalis faciendæ est: quod velut Polycleti statua illa partium omnium summa proportione constans aliorum omnium canon vt in prim. etiam libro diximus existimari debet. Vt enim homo animal est mente & ratione, hoc est diuinissima & principe forma præditum, quæ vniuersas cæterorum animantium vires continet: ita & optimum atque instructissimum corpus præclaræque conditione quadam genitum à supremo obtinuit Deo membrorumque omnium conformatione pulcherrimum. Inter cætera præ animalium cunctorum corporibus habet quatuor. Primum celsum est & erectum, quasi in cælum sese attollens: Prona cum spectent animalia cætera terram. Ortus enim est homo, vt omnibus dominaretur, atque ad mundum contemplandum & mirandum: vtque Dei cognitionem cælum intuens capere posset, & suum conditorem agnoscens hymnos illi diuinos decantaret. Deinde optimam habet totius corporis temperationem & calorem plurimum. Vnde & optimus corporis habitus & perfectissima operationes consequuntur. Tum verò amplissimum, capacissimisque sinibus ac partibus omnibus accuratissimè distinctum cerebrum: quod etsi propria animæ sedes non sit, inter præcipua tamen continetur membra, indeque sensus omnis ac motus propter neruos & animalem spiritum pendent plurimum: ex sensu au-

tem mens & ratio. Postremò artus omnes maiori multo artificio distinctos & conformatos. Ac manus præsertim & digitos ad ea omnia exequenda, quæcunque mens iusserit. Cætera ferè cum bestiis communia aut non magno opere diuersa. Quare qui de humano corpore dicit, de omnibus quodam modo dicit omniæque ob oculos ponit.

Sed illud primum intelligere oportet; non posse cuncta in cadauere vnico satis spectari. Quoniam plurimis in locis ita sunt partes inter se simplicitæ & permixtæ, vt nisi aliis amputatis aut disruptis ea, quæ queritur, videri non possit. Plura igitur sunt inspicienda cadauera. Et in vnoquidem interiora primum viscera: deinde musculi ac tendones: tum illis etiam subdita ossa consideranda: in altero venæ in tertio arteriæ: in quarto nerui. Cutis autem, membranæ, cartilagine, vincula, in omnibus dispiciuntur.

Ego, vnica descriptione ostensurus hæc omnia, totius primum corporis partitionem faciam: deinde de partibus singulis eo dicam ordine, quo ferè corpora dissectare oportebit. Vt ita explicatio tota certa ratione ac methodo progrediatur.

#### TOTIVS CORPORIS partitio.

##### CAPVT I.

**V**niuersum igitur hominis corpus quatuor in partes tribuitur; in caput, thoracem, ventrem, & artus, quibus brachia & manus, crura & pedes continentur. Caput, thoracem, & ventrem plerique triplicem ventrem appellant; superiorem, medium, & inferiorem. Etsi Hippocrates & Galenus in Aphor. 38. lib. 7. superiorem ventrem thoracem dixerint. Ex quo eos intelligas caput non appellasse ventrem, quòd cauitatem non habeat, qua solidum corpus aut pars aliqua alia contineatur. Quòd si appella-

*Plura corpora dissectanda.*

appellare libeat, supremum appelles. Tota porro partio ex facultatum animæ, quibus parabat corpus, partitione ortum habuit; ut pulchre in Timeo Plato comprehendit. Inferiore namque ventre partes ea continentur, quæ ad vegetantem facultatem naturalesque functiones referuntur. Ad thoracem autem pertinent illæ, quæ ad vitalem. Ad caput eæ, quæ ad animalem ac præcipuè ad sensum. Quam ob causam superior regio animalis, media vitalis seu spiritalis, infima naturalis dicitur. Ad artus demum illæ, quæ ad arbitrium motum comparatae sunt. Sic enim totum corpus velut animæ organum fabricatum est.

DE ABDOMINE ET  
eius musculis.

CAP. II.

Cur inde inchoandum.

**A** Inferiore ventre, ut Galenus quoque in 5. de Anatom. administ. lib. cap. 6. se factitasse testatur, æquum est principium facere. Quoniam hæc maxime pars, ni statim absolatur, ita putrescit, ut nec dissecari, nec omnino quidquam in ea inspicere queat. Reliquæ vnam vel alteram aut etiam plures dies (hyeme præsertim frigida) expectabunt. Accedit, quòd primæ ibi vegetantis animæ facultates atque operationes vigent.

Ventris descriptio.

Venter porro à xiphoidæ cartilagine, diaphragmate & costarum extremitatibus vsque ad ilia & inguina osque pubis extenditur; totum illud, quòd carnosum est nec villo duratum aut fultum osse, Causam in superiori libro significavi. In eo magnopere inuoluta & implicata continentur ea omnia, quæ naturales functiones rectè obeunt. Hæc ut distinctè & explicatè ad intuentium oculis proponantur; à superioribus & iis, quæ dissecantibus primùm occurrunt, inchoandum erit.

Abdomen unde dictum.

Tota igitur hæc pars Latinis venter, Græcis *gastrop* appellatur. Proinde anteriorem & extimam illius regionem, quæ extrinsecus ambit & ea, quæ interiora sunt, abdit, nos abdomen, veteres Græci *κοιλία*, Galenus *σπασμα* quasi superiorem ac superficialiarum ventrem, seu maius locum supra ventrem, Arabes mirach dixerunt. Abdomen verò (ut nostris utar vocibus) tum secundum longitudinem, tum secundum altitudinem consideratur. Longitudinis tres sunt partes. Superior vna epigastrica, costis proxima (*ἐπιγαστρική* Græci vocant, nos præcordia, etsi in Aphor. 37. lib. 4. pro toto abdomine visus sit Hippocrates hypocondria nominasse) vbi hypocondrium dextrum & sinistrum, mediàmque partem, quàm *κωσπον* & pomum granatum dicunt, secundum latitudinem distinguimus. Altera media circà vmbilicum; quæ totius nomine retento *σπασμα* dicitur. Tertia ima ad os pubis, quam hypogastricam seu ventrem inum atque ilia & inguina nominamus; illiùmque dextrum & sinistrum ostendimus: inter quæ pecten est & os pubis, quòd ibi pubertatis signa pilo crescente appareant. Altitudine autem cute, adipe, carnosâ membrana, musculis quibusdam, & peritonæo constat.

Dissectio.

Quocircà à pectoris osse per medium ven-

**A** trem (vmbilico tamen intacto) vsque ad os pubis, & rursus pertransuersum à sinistris ad dextros lumbos per vmbilicum intactum seindenda primum est cutis ac diligenter ab adipe separanda. Deindè cutis natura & vsus inspiciendus. Cui si ardentem candelam admoueris, cuticula quoque *σπασμα* dicta attolletur tibi atque à cute separabitur. Tum adipe multo detracto (quamquàm non in omnibus animalibus, ut leone, cane, subfit) membrana occurrit toti obducta corpori, carnosâ, etsi non æquè in omnibus partibus, intexta fibris, quæ propter eam carnosâ vocatur; ab aliis panniculus carnosus. Ea facilius multò à subiectis partibus, quàm cutis ab adipe aut ab ea membrana adeps, separatur: & ferè in agnis & hedis silo flatu cum cute nullo negotio auellitur, cum cutis ab illa aut ab adipe propter nerulos plurimos, vernulas, & arteriolas cutem adeuntes non nisi magna industria separatur. Eiusque præcipuus censetur vsus, ut vasorum horum, quæ ad cutem feruntur, propagines roborentur ac fulciantur.

Membrana carnosâ.

**B** Iam his omnibus octo subsunt musculi, vtrinque quatuor, quibus abdomen præcipuè consistat, atque à fibrarum ductu situque in corpore nomen habent: quatuor obliqui, duo recti, totidem transuersi. Supremi & omnium maximi sunt obliqui duo à sexta, septima, octaua, & nona, atque etiam tribus inferioribus costis priusquam in cartilagine desinant, atque ex suprema cartilagine earum, quæ tres ex lumborum vertebris prodeunt, exorti ad ventris anteriora deorsum obliquis fibris triquetra figura progredientes, moxque ad ossis ilij summitatem eiusdem lateris descendentes. (Qua in re anatomis omnibus, ut is solus sapere videretur, nullo licet probabili argumento persuasus, ausus est Andreas Laurentius aduersari, ascendentes, non descendentes hos musculos faciens.) Verùm hic exortus minis est continuatus. Sed cum in ea costarum loca alij quidam ex thorace musculi velut manus apertos extendens digitos inserantur; ex interuallis illis nascuntur hi, velut vnus manus digitis in alterius digitorum interualla immisissis.

Musculi obliqui descendentis.

**C** His detractis duo alij obliqui item occurrunt. Sed qui ex superiori ossis ilium sede, sacrique ossis ac secunda vertebrarum lumborum cartilagine ad quatuor infimarum costarum, quæ spuria dicuntur, extremitates conscendant, duosque priores decussatim interfecent aut illis potius subternantur. In media verò abdominis regione in membranosa hi omnes extremitatem desinunt: quæ vtrinque ascendens ita copulatur atque inseritur in alba linea, ut mucronatæ cartilagini sursum atque ossi pubis deorsum inserta totum illum locum egregiè integat. Sed priores duo vtrinque supra rectos ascendunt musculos: posteriores in bipartitam cartilagine terminati eosdem musculos velut in marlupio amplectuntur: quod ad rectorum robur & firmamentum pertinet. Quare ab hoc loco auspicanda fuerit musculorum dissectio. Vbi tamen copulationis vestigium nullum extat, sed extremitates eæ crassiores factæ inter rectos subeuntes musculos cum transuersorum quoque extremitatibus & verò etiam peritonæo coniunguntur.

Obliqui ascendentes.

**D**

Alba linea.

Vnde alba illa existit linea, quæ in medio ventre conspicitur, à mucronata cartilagine per umbilicum medium ad pubis ossium commissuram ducta, atque hos omnes musculos ita separans, ut quatuor planè sint dextræ totidemque sinistri, quatuor omnino musculorum paria.

Musculi recti.

Nam præter obliqua duo hæcenus demonstrata, tertium rectorum est, qui ex utraque ossis pectoris parte paululum supra cartilaginem mucronatam per mediam ventris regionem descendunt ad pubem. (Hos quoque à pube ad sternum ascendentes faciunt alij: & Laurentius sex omnino musculos ascendentes, obliquos quatuor & duos rectos, nullum prorsus descendentes: quod neque rationi, neque naturæ operibus consentire videtur) atque à primo quidem ortu non nihil discreta alter ab altero, præsertim in homine, mox sese contingunt planèque in pubis osse coniunguntur. Horum fibræ rectæ sunt, non tamen integræ à summo ad imum duci, se tum ob maiorem firmitatem in tanta scilicet longitudine, tum ut musculis collectis atque in se ipsos contractis intestina facilius comprimerent; interdum ter, sæpè quater interrupti & quasi incurvari, seu alix ex alijs, membranosis admittis fibris, produci videntur.

Musculi transversarii.

Quartum autem & vltimum transversorum cum peritonæo terè cohæret, nec sine magno labore plurimique sectionibus ab eo liberatur. Ex lateralibus lumborum vertebrarum processibus tertiarque illorum cartilagine nascuntur illi. Deinde ad superiorem illum ossis partem & spurias usque costas aucti ad ventris medium per corporis latitudinem ascendunt: atque in membranæ exilitatem velut tendonem delinentes ad angulum rectum musculos rectos præstant in quorum medio, ut de obliquis dictum est, vtrinque coeunt ac totum tegentes ventrem in albam tandem lineam cum cæteris committuntur.

Horum musculorum significatio.

Cur autem internum transversum, medium recti, externum planè obliqui situm occupent musculi, ea exponi potest ratio, quòd internæ transversæ fasciæ magis præstant, minus rectæ, obliquæ minimum. Quòd in pulsum aut etiam noctris corporibus animaduertas.

Vsuum.

Cæterum horum omnium quadruplex est præcipuus vsus. Primus cum cæteris omnibus musculis communis, est iuxta cuiusq. dispositionem ac fibrarum situm mouere. Vnusquisq. enim partem eam, cui inseritur, præmit ad suum principium trahens. Et dum tenduntur aut laxantur, non parùm creduntur thoracis motui famulari, eumq. dilatare, & cõstringere. Alter magis proprius, calorem ventris fouere; partibusque subiectis, quæ nullo protegebatur osse, velut propugnaculum adesse. Tertius durorum excrementorum expulsionem iuuare. Si enim retento spiritu simul omnes collecti contrahantur, comprimunt intestina, scæcæque protrudunt. Ideoq. patientibus quoque foemina non parùm conferunt, ut facilius expellatur foetus. Quartus, prodesse voci aut cohibendæ, & retinendæ, dum loquimur; aut magnæ cuiuspiam edendæ. Quare præ nimia contentione laxatis disruptis in infima ad pubem sede obliquis musculis hernia scimus laborasse non paucos.

Musculi triangulares.

Præter hos octo musculos duos alios paruos in homine præsertim reperias in infima abdominis sede, ex media ossis pubis parte ascendentes vtrin-

que supra musculos rectos, atque vnto tendone, ad duorum vel trium digitorum altitudinem inter duos illos musculos trianguli figura insertos. Non in omnibus ij hominibus videntur: & quidquid de illis Fallopius dicat, ut ex accidenti quibusdam insunt, sic accidentarium eos habere vsuum non dubito: ut partem eam firmiorem in quibusdam faciant, quæ imbecillior alioqui erat. Propterea vel triangulares à figura, vel ab vsu succenturiatos, quasi prioribus substitutos appelles.

DE PERITONÆO ET umbilici vasis.

CAP. III.



Vsulis hæc omnibus separatis apparet tenuissima, sed firmissima & robustissima à membrana: inter præcipuas iure optimo commemoranda. Certe omnium maxima est & amplissima, si carnosam solam exceperis, quæ tamen simplex membrana non est. Ex vinculis, quæ inter lumborum vertebrae sacrumque & illum ossa intercedunt, ortum habet. Inde extensa ita descendit vtrinque, ut vniuersam illam regionem & capacissimam cavitatem succingat, & in medio ventre cum obliquo-

Peritonæi ortus et descriptio.

C

rum musculorū extremitatibus in alba linea committatur. Surtum verò in superiori septi transversarii sedi obtendatur, & deorsum attingat pubem. Quocirca velut vter oblongi oui figura viscera omnia & quæcunque sunt in ventre continet: & idèdè mæstrator mæstrator appellat Græci: & Hippocrates in septimo hæc popularibus morbis plurium numero mæstrator dixit. Arabes siphac vocant. Non vnicam & simplicem, sed duplicem membranam esse scripserunt aliqui; Galeni fortasse in sexto de methodo medendi li. cap. 4. verbis decepti. Sed si eam ex duobus corporibus compositam esse dixit, alterum horum subiunxit esse transversorum musculorum extremitatem, quæ ægrè & vix separari potest; alterum autem verè peritoneum. Certe omni ex parte superiore & inferiore, anteriore & posteriore, dextra & sinistra, duplex se millies obseruasse Andreas Laurentius scribit.

Peritonæum cum ditione.

E

Quidquid sit, multiplicem sanè vsuum habet in corpore. Primus ac præcipuus is est, quem paulò antè significauimus; continere scilicet viscera & intestina omnia. Hoc quanti momenti sit, ij demum magno suo damno atque incommodo, maioriq. periculo experiuntur; quibus siuè ictu, siuè saltu, siuè immoderato clamore aliâque simili causa eorum obliquis incumbētibus musculis ab pubem laxato aut rupto in serotum decidunt intestina. Ideò membranofum ac præualidum à natura fabricatum est. Alter, ut intestina distinguat ab abdominis musculis, atque ita separet, ut dum mouentur musculi, nec illi in intestinorum, nec hæc in illorum spatia incidant. Tertius, viscera omnia & intestina tueri atq. à flatibus, vento aère circumfuso, externisque iniuriis, quibusvis protegere. Quartus membranas plurimas velut proprios & peculiare amictus partibus omnibus, quæ illo cõtinentur, suppeditare. Non modo enim omnes peritoneum complectitur; verum etiam singula deriuata ab eo membranula creduntur accipere; qua & inuicem colligentur, ut firmius omnes in eodè simul cõtineantur loco, & seorsim cõuectantur vnaquæq. atq. in sede sibi constituta hæreat.

Vsuum.

An excre-  
torum expul-  
sio inuenit.

Quo verò consilio Galenus eddiderit in capite nono lib. 4. de vsu partium, iuuare quoque siccorum excrementorum expulsionem, dum ad transfusum septum comprimuntur intestina; equidem planè non video. Illud tamen intelligo, nullum peritoneo inesse motum, quo comprimere possit: sed id, quod à Galeno tributum est peritoneo, ad abdominis musculis pertinere. Tantùmque abest, vt illud comprimat vnquã intestina, vt ipse à musculis illis comprimatur eorumque motum sequatur: neque agat quidquam aut moueat, sed patitur duntaxat & moueatur. Non enim mouendi instrumentum membrana est, sed musculis & tendo.

Substantia.

Verùm ad illius substantiam considerandam reuertamur. Exterior eius superficies quasi asperior est, vt in cumbëtibus adhæreat musculis: interior magis læuis & tersa, propter benigniorem viscerum contactum. Interdum etiam adipe in subis præsertim, aut certè a quo humore oblita. Sed in posteriore, qua sui ortus principium sumit, maior multò, quàm in anteriori, crassitudo. Etenim tenuatur sensim, dũ ad anteriora progreditur. Hæc ipsa tamen anterior pars crassior in vitis à xiphoidè ad vmbilicũ, quàm ab vmbilico ad pubem. In mulieribus contrã: fœtus enim gestandus maiori eguit robore.

Foramina.

Superiori parte, qua transfuso subreditur septo, tribus pateforaminibus: quibus venæ Cæue, œsophago cum adiuctis nervis, & arteriæ asperæ cum vena coniugis experte & aliquot nervis aditum præbet. Inferiori autem in vitis duplici: vt & feminaria vasa ad testes & vesicæ ceruix ad pudendum procurant. In feminis vnico, quo vteri ceruicis finis erumpat. In vtriusque aliis pluribus, quibus venæ & arteriæ ad crura descendunt, & ad abdominis musculos rectos & alios quosdam ascendant. Anteriori demùm parte vno, quo vmbilici vasa continentur.

Vmbilici vasa.

Ea sunt, vena ex pluribus vteri fundum petentibus collecta: arteria, quæ ex illius item loci arteriis oritur: ac demùm vrinarius meatus, quæ vrachium vocant. Quæ simul iuncta per fœtus vmbilicũ subeunt ac mox separantur. Nã vena interiori peritonei regioni attenla seorsũ ascendit ad iecoris cauum, vnde Porta egreditur: eiq. inserta perindè ad nutriendum fœtum, quandiu viuunt in vtero, sanguinè ducit, ac si proprio vesceretur cibo. Gibbum cam ingredi maluit Auicenna in capite de Generatione embryonis; ne si cauum intraret, bilis folliculum comprimens purgationem illius impediret. At si nunc turgida semper sanguine Parta non impedit; multò minùs tunc impediret.

Cur autem cauum iecoris potius, quàm gibbum subeat; minùs probo rationem à Galeno expositam in cap. 4. lib. 15. de vsu partium; vt ibi cum sit bilis vesicula, purgetur à bili sanguis, antequàm per corpus distribuatur. Sed hæc potius: quoniam ibi est confectus alimenti locus, quo à ventriculo duci debet ad Portam: ipsique initis cam ingreditur natura viam, quam semper tenere debet. Idcirco etiam vena est vna: quia æquum non erat ad eum vsum partiri venam ad quem plurimas deinceps in vnã collectura est natura.

Arteria verò bipartito diuiditur; vt tum dextræ tum sinistræ parti calorem addat. Itaque ex ea & vrinario meatu tria existunt vasa, velut funiculi tres, qui peritoneo similiter attenti figura qua-

dam triangulari deorsum feruntur ad pubem. Arteria hinc inde secundum vesicæ latera in amplas illas arterias iliacas inguntur; quæ prolabantur in crura: iisque naturalis corpusculi calor recreatur. Deque horum vasorum ortu perindè fuerit, siuè illorum sequendo vsum; quo ab vteri venis atque arteriis ad fœtum sanguinem spiritumque deducunt; indè vt dictum est deriuentur: siuè per se considerata, vena ab fœtus epate; arteriæque ab iliaci aortæ ramis ad vterum producantur, vt necessarium alimentum & calorem hauriant. Medius verò inter duas arterias incedit vrinarius meatus ex vesicæ corpusculi fundo ad vmbilicum protensus. Hoc enim, dum vtero gestatur, in allantoidem panniculum vrinam excernit.

At cum hæc omnia vasa educto in lucem fœtui minimè necessaria sint, quidquid ipsorum in corpore remanet, solidioris instar funiculi arefcit: neque inter grandioris corporis partes aut vasa numeratur; & in canibus ferè penitus aboletur. Ac de peritoneo quidem & vmbilico satis. Iam quæ interiori cavitæ continentur, spectanda sunt.

VASORVM OMNIVM, QVAE  
ventre continentur, partitio ac sum-  
maria consideratio.

CAP. IIIII.

**H**æc vasa omnia, quæcunque continen-  
tur in corpore; circa alimentum quo-  
quo modo versari videantur: quæ sunt  
in ventre, vt ex eo fiat sanguis; cor, vt  
in vitalem spiritum; cerebrum, vt in animale  
mutetur: propriè tamen versari creduntur ea,  
quæ circa illud, quatenus alimentum est, occu-  
pantur. Ea sunt, quæ peritoneo detractò conspi-  
ciuntur in ventre.

Porrò vt alimenti duplex est vsum: alter nutrire  
consumptamque substantiam reponendò viuens  
idem conseruare; alter ex quadam illius residua  
parte alterum sibi simile procreare, specieque  
conseruationi atque incolumitati providere.  
Ita duo vasorum genera hoc loco continentur:  
quædam ad nutriendum referuntur: alia procrea-  
tioni dicata sunt. De vtroque genere illo ipso di-  
cam ordine, quo in eorũ vsum natura progreditur.

Ergò vt alimentum nutriendo corpori oppor-  
tunum præparetur, tria omninò præstanda sunt.  
Primum sumendum est alimentum: deinde reti-  
nendum, coquendum, atque à deteriori substan-  
tia repurgandum: tum noxia hæc & excremento-  
sa materia expellenda, stomacho sumitur: ven-  
triculo & iecore retinetur & coquitur: felis vesic-  
ula, liene, renibus, vesica altera, ac demùm inte-  
stini deteriori materia seceritur & purgatur. Ci-  
bus enim & potus ore sumptus per stomachum  
in ventrem deicitur: inde mox in chylum con-  
fectus per intestina descendit, atque per mesente-  
rij venas vtiliori parte extracta crassiores faeces  
per anum pelluntur. Pars vtilior per Portam su-  
bit iecur. Ibi mutatur in sanguinem; flaua bili, vt  
excremento tenuiori ad eius vesiculam; & atra,  
quæ crassior est, ad lienem separatis: ambe post ad  
ventrè & intestina transmissæ cù faecibus eiciuntur.

Duplex ali-  
menti vsum.

Duo in ven-  
tre vasorum  
genera.

Circa ali-  
mentum tria  
opera.

tur. Sanguis cauum ingressus venam simul cum aquoso adhuc excremento, cuius ope arctissimas vias à Porta ad Cavam facilius penetrauit; renum vsu ab hoc, quod supererat, excremento aqueo repurgatur. Quod mox per vrinarios meatus mittitur in vesicam, atq. indè laxato cervicis musculo pudèdo mingitur. Ita sanguis totus optimè mundus ac purgatus per totum corpus distribuitur. Sed quædam tandem illius sicut & arteriaru spiritus pars per feminaria vasa ad testes ingreditur; quæ seminis naturam & vim adepta pèrque maris pudendum in fœminâ vterum coniecta procreationem totam absoluit, naturæque perpetuitatem facit. Hæc est brevis eorum omnium, quæ ad ventrem spectant commemoratio.

Vasa hæc optime eo loco contineri.

Quæ si commodius quispiam credat propè os, quo cibus sumitur, collocari statim potuisse: is magno perè erret. Ea namq. pars à principe membro corde (de cordatis enim est sermo: alioqui cætera, quæ pulmonibus & corde carent, collo item carent & gula quæque opus non habent respiratione, ventrem ori coniunctum habere possunt, vt in tertio de partibus animalium lib. ca. 3. Aristoteles tradidit) occupata erat, quòd inter nutritionem & sensus, qui vigent in capite, medium esse oportebat. Neque erat equum ciborum, coquinam atque excrementorum officinam & sedem, quæ in infimo, & abiectissimo loco recondi solent, tam altè atque in media & optima ædificij parte ponere. Neque animali opportunum, excrementa capiti & sensibus esse propinqua: neq. commodum ea indè subducere atque egerere. Infimus locus ad vtrumque fuit eligendus.

Verum nec alimenti hæc & sobolis vasa in ofseo, duto minimèque cedente ac sese dilatate loco poterant condi. Nec superior illa regio tota carnea, inferior autè ossæ esse debebat. Vtrūque enim plurimas ac præcipuas animalis functiones impediuit. Denique respiratio, quæ tanto perè necessaria est operatio, vt ne minimo quidè tempore intermitti queat, & verò etiam vocis formatio; cum aère ore ac naribus hausto vsuræ essent, superiorem illum ac propinquum locum postulabant; quo adduceretur facilius & reduceretur aër, crebriorque illius fieret permutatio.

Hoc certè effectum est, vt quàm minima esset distantia. Nam statim sub septo, quo cordis hic & respirationis locus terminatur, cum iecore ventriculus positus est; ad quem patens est & peruius stomachus cibum ac potum adducès. Deinde sub ventriculo intestina iacent, quæ cõfectum cibum deducunt, ac per infimum locum egerunt excrementa. Reliqua his circumiecta fuerunt, opportuno & optimo quæq. loco. Sed iam seorsim singula consideremus à sumptione cibi factò principio.

DE STOMACHO.

CAPVT V.



Bo re ad podicem vsq. vna est & continuata via: quæ tribus præcipuis partibus cõstat. Prima cibus sumitur: altera cõficitur: tertia transmittitur, illiusque faeces secernuntur. Prima est stomachus, altera ventriculus, tertia intestina omnia.

Stomachus quid.

Longum enim canalem illum, qui à lingua radice protenditur ad ventriculum, *σπυγγορ*, & *διέ-*

**A** *σπυγγορ* Græci nominantur; aut etiam communi nomine *ισθμὸς*, quòd angustus sit locus, per quem plurima interim vasa ducuntur. Ab angustia & longitudine appellatum fuisse dixit Aristoteles in 1. de animalium historia libro cap. 16. Latini stomachum potius seu gulam vocarunt.

In ipso initio tonsillas vtrinque habet (Græcis *μυελόσπυα*) hoc est glândulas, quæ contento humore tum linguam humectant, vt cibos gullet & mandatum interiore totam stomachi cavitatem irrorant, vt præmansus in ventriculū facilius prolabarur: & interdum in medio quoque ductu duæ aliæ eandem ob causam adiunguntur. Glutitur autem cib' agitatione primùm & motu linguæ: tum inferioribus stomachi partibus dilatatis superioribusque contractis. Quippe aptissimam huic vsui substantiam habet. Et quoniam ipsius principio latynx incumbit cartilaginea planè ac minimè cedens; deorsum tantisper, dum transit cibus, trahitur stomachus & larynx sursum recurrit. Sic enim in tertio de naturalibus facultatibus ca. 8. & in 7. de vsu partium ca. 18. obseruauit Galenus.

Tonsillæ.

Vigilia cibum.

**B** Duplici porò constat tunica præter eam, quam à peritoneo accipit, ex dorsu vertebrarum, quas percurrit, vinctus ortam; vt si fortis in gesto duriore cibo laceretur, ea quæ est interior aut alio modo corroderetur, altera superesset integra. Has in tertio de partibus cap. 3. considerans Aristoteles stomachum dixit ex neruo & cartilagine constare. Nam interna tenuior quidem paulò est, sed membranosior multò, durior, atq. ad patientium contumacior: quoniam non benè tritus persæpè ingeritur cibus. Ea lingua, palati, totiulque oris, ac ventriculi tunice continua est sed eam ob causam, quam significauit, contumacissima circa initia; illumque ad vetriculum descendit, mollior sensum & rarior efficitur. Vbiq. tamen præualida, vt ex pecorum ventribus solitos fuisse veteres Lybiæ incolæ parare sibi crumenas, in quarto de Morbis Hippocrates scripsit. Rectis hæc inexta est fibris. Externa vero crassior, sed canosior & mollior, transuersis duntaxat referta fibris. Cuius fibrarum diuersitatis ea fuit ratio, vt interiores rectæ cibi potiusque attractioni famularentur; exteriores transuersæ expulsiõnem eam, quo vomendofit, perficerent. Attractio semper est necessaria, expulsio interdum & propter occasiones quædam. Quæquam hæ ipse transuersæ, dum in inferioribus stomachi partibus laxantur atque in superioribus cõtrahuntur glutitione adiuuant. Propter eam glutite facilius est, quàm vomere: non solum quia deorsum facilius, quàm sursum pellitur corpus graue: sed etiam quia ambabus tunicis operatibus glutimus, trahente vna, altera contrahente, & trudente: vomimus autem externa tantum agente & trudente, nulla autem trahente. Denique fibras obliquas tunicis hisce adesse nõ oportuit. Quoniam cum hæ ad retinendum comparatæ sint, minùs fuisset promptus cibi transitus, maximamque diutius hærens molestiam atulisset.

Stomachi substantia.

**C** Per collum igitur in media vertebrarum sede sub aspera descendit arteria, antetiorum locum necessarie magis functionis instrumento, quod in superiori, hoc est thoracis loco, consistit, libenter cedens. Cùm præsertim cartilagineo illo corpore non parè protegeretur. Verù ad quintâ thoracis vertebrâ tantisper ad dextrâ decurrit latus, dum arteriæ magnæ ad inferiora descēdētī, quæ ex sinistro cordis

Fibrarum ratio.

**D** Car glutine facilius quàm vomere.

Car glutine facilius quàm vomere.

**E** Per collum igitur in media vertebrarum sede sub aspera descendit arteria, antetiorum locum necessarie magis functionis instrumento, quod in superiori, hoc est thoracis loco, consistit, libenter cedens. Cùm præsertim cartilagineo illo corpore non parè protegeretur. Verù ad quintâ thoracis vertebrâ tantisper ad dextrâ decurrit latus, dum arteriæ magnæ ad inferiora descēdētī, quæ ex sinistro cordis

Stomachi sint.

cordis sinu orta sedem iam occupaverat, dat locū. Tum a nona vertebra eleuatus transuersum septū in sinistro, quā neruosiū est, latere permeat: atq. nē ad vētriculū accedens la dā ietur vniuersam illā sub septo regione possidēs, aut illud perforare cogatur; ad sinistra planē cōcedit, vbi minoriecoris pars; ibiq. superno ventriculi orificio inseritur.

DE VENTRICULO. CAP. VI.

**S** in medio latitudinis animalis residet velut communis coquina partiumq. omnium propriarium siue praesepe, vt in 2. de part. animal. lib. ca. 3. Arist. loquitur & antē illū in Tim. o Plato. Sed sinistra parte elatior. Tangit enim septum, quō dextra nō parum distat; iecore interposito atq. intrā ipsius cauum cōtento vētriculo. Tuniciis constat stomacho per similibus: quippē illi cōtinuatur. Sed interior, vt dixi, paulō mollior est, pluresq. habet obliquas fibras, quibus contineat cibum: rectas verō plurimas, quibus attrahat: & transuersas non paucas, quibus expellat. Rectae dum trahūt, stomachū quoq. breuiant; atq. id exequūtur, quod dicebat Galenus, in cibi descēsu stomachum deorsum trahi, sursumq. laryngem recurrere. Exterior existit carnosior & obliquas propter eundem vsū, ac transuersas ad expellēdum, tum confectum cibum ad intestina, tum interdum per vomitum, fibras ostentat.

Quo loco duo sunt magnoperē consideranda. Alterum; vr attractio prior est retētiōe, hācque expulsionem antecedit, sic in priore tunica fibras rectas, quē trahūt, in interna ipsius sede, obliquas, quā retinēt, in externa: & rursum in posteriore obliquas in interiore, transuersas in exteriorē collocatas fuisse: quod summū omnino & admirabile artificii habet. His demū velut superior vestis additur tertia à peritoneo tunica, ex ea parte deducta, quā septum stomacho aditū prebet, atq. in vētriculū totū extēdit. Alterum, vniuersum hanc vētriculi substantiam apūssimam esse, vt & ingesto dilaturur cibo & contrahatur extracto. Propterea tum magnā tum parū ciborū & potus vim capit, eaq. exhausta cōtrahit sese ac subidet: perindēq. siue multum siue parum cibi & potus exactē, & adamūssim completitur, nec vlsquā inane quidquam relinquit.

Capacissimā quoq. figurā habet, vt in paruo loco multum cibi caperet, quo partes omnes sustentarentur, nē singulis horis edere cogeremur. Etenim rotūdus est, in sinistro praesertim latere, vbi amplitudo maior: tū quā capaciōr locus, dextera parte iecore occupata, tum vt sinistra latus dextro esset aequabile, iecore siq. pondus cōpensaretur: est in dextro ad modicā lōgitudinem, quam duo eius orificia postulabant, cōtractus extēditur. Interior superficies rugosa est & colore subfusca: exterior rota leuis, plana, & albica. Anterior aequabilis tota vno cōtenta gibbo: posterior autem, quā spine incubit vertebri, venaeq. Causae & arteria magna, in duos distinguitur gibbos, inter quos est sinus, quā parte vertebri ac proximis vasis insidet.

Duobus porō patet ostij, quā orificia vocamus altero suscipitur cibus aut potus, altero redditur. Pri<sup>o</sup> illud in suprema est sinistra lateris sede, ad medium tamē propius, & ad spinā potius, quā ad

**A**xiphoidē, accedēs. Posterior hoc in dextri lateris extrema regione. Illud per amplū & latum esse oportuit, quōd cibos nōn quā duos nec fatis attritos cogatur admittere. Hoc angustū multo, quōd nō nisi cōfectus & liquidus inde chylus egrediatur. Cū tamē caralōrum persēpē & grādiōrum fructū integra ossa, & anulos interdū aut nūmos, quos vocauimus neq. cōfici ac mutari poterunt, reddamus, vt in tertio de natur. lib. ca. 4. Galenus confirmat: manifestum est, illud quoque ostium aut non angustissimum esse, aut praeter naturam tunc laxari.

Quod in sinistra parte est, veteres *καρδια*, i. cor appellauerunt, quōd ex quilitissimo polleat sensu, & symptomata inducat cardiaca. Verū à nobis stomachus appellabitur cōsentietq. Galen<sup>o</sup> in quinto de locis affectis c. 6. quōd & ibi ventriculo stomachus insigatur, & *cōm* idem sit, quod os. Plurimas habet orbiculares fibras cōtrahētēs, ne in cōsophagū resiliat cib<sup>o</sup>. Praecipua hęc cōsetur appetētis & famis sedes esse. Extremū enim est illi<sup>o</sup> sū<sup>o</sup> &<sup>o</sup>, quo exinanite partes alimētū à vicinis trahūt.

Alterū, quod in dextera cōtinetur, Graecis *πυλωρ*, Latinis ianitor nominatur: quōd ingesto in vētriculū cibo claudatur illic, nec aperiatur antea, quā is in chylū (si quidē id potuit) mutatus fuerit. Tūc enim dilatatus ad intestina trāsitus illi permittit. Inferius hoc à pleriq. orificio appellatur; inter quos Gal. in 4. de vsu part. c. 7. Quod si ad situm referatur, est planē salūm; cū ipsum quoq. in superiori cōsistat ventriculi sede, vt faciliōr sit & tutior cibi retētiō; minōr q. vis & conatus solitudouē naturae in ostio illo custodiēdo, nē suo pōdere aut liquore cib<sup>o</sup> vel potus in intestina prematurē illabatur. Sin autē ad illius vsū respiciat, inferiusq. propterea dicatur, quōd cū alterū superiori stomacho coniunctum sit atq. ex alto cibū admittat, hoc cū inferioribus intestinis cōpuletur & ad partes inferas cōtorqueatur statim ac transmittat chylū, verissimē sanē id pronūtiatur. Est verō in vtroq. ostificio, sed in hoc posteriore maxime, ventriculi substantia crassior, spissior, ac vclut mēbrana & neruosa. In altero propter ciborum sensum, quē acutissimū esse oportuit. In altero, ne ciborū praesertim interdū duriorū per angustū locū trāsitu laederetur: atq. validius post sumptū cibum cōtraheretur, & immaturū egressum prohiberet. Cōtrahitur enim & clauditur seipso per infinitas sibi fibras; nō apposto aliquo musculo, vt vesicae cervicis & podicis locus: multo minū glādosa substantia, vt in 4. de vsu part. c. 7. & lib. 8. c. 14. traditum legimus. Praesertim cū nec ille sit glandium vsus, nec earum ibi vlla visatur: sed quae piam non procul inde, cuius post vsū indicabo.

Postremō ita constitutus ventriculus venulas accipit à Porta, arterias ex magno illarum trunco: venas, inquam, maiorem gastricam & gastrepiplotū, minorem gastricam, & coronariam, vt in Porta distributione diximus: arterias verō totidem ferē comitantes: ac demum neruos à sexto cerebri pari. Venis aut alimenti quidpiam adducitur; aut aliquid inde chyli, vt ceterorum intestinorum venis, ad iecur trahitur: & quaedam est, quā à liene melancholicū humorem cōferat quo cibi appetētia excitetur. Arteriae calidū spiritū tribuunt, quo cibus expeditius coquatur & melius, nēruī demū nō noxiōrū modō, vt in ceteris partibus; sed qui est hui<sup>o</sup> mēbri proprius, indigetq. cibi

Ostii superiora.

Pylores, seu Ianitor.

Vasa.

Famis sensus in ventriculo.

Litus.

Substantia.

Fibrarum ratio.

Figura.

Ostia.

sensum efficiunt, vt ad sumendū vniuerso corpori necessariū alimentū prouocetur. quare plurimi ac præcipui in superiori orificio versantur. Reliquis enim partibus sensum eorū, quæ desunt, natura nō indidit: sed eas voluit platarum more alimēto ex venis hausto nutrirī. Soli vētriculo tāquam communi omniū prōptuario, ex quo hausturæ oēs ac sucturæ erāt (partes enim singulæ ex venis sibi proprijs trahūt, hæ ex Caua, Caua ex Porta, Porta ex intestinis, hæc deniq. ex ventriculo) sensum hunc inesse voluit, vt & sibi & cæteris omnibus prouideret, alimento extrinsecus accedente.

Cibicoctio.

Hoc verò vt citius & accuratius coqueretur, velut cōmuni lebeti plures omnino focos atq. ingētes appoluit. Primū in sito ipsi calore ac facultate ad id agendum opportuna. Deinde calore cordis nō procebu distātis, spiritūq. ab eo per arterias trāmissio. Tūm calefaciētibus alijs mēbris vnde quaq. circūiectis: in tota quidē superiori regione & parte dextra præcalido iecore, quod illū accuratē cōplectitur & studiosè fouet: hinc autē in inferiori & sinistra: quidquid superest, septo transuerso & abdomine tegitur nec parū iuuatur: & verò etiam posteriori sedi subsunt præcalidæ vena Caua & arteria magna, quæ adq. omēti portio. Sola anterior sedes facta est libera, vt attolli, & turgere sumptu cibo cōmodiūs posset, nullo alio impedita membro. Ibi tamen quoque adsunt abdomen adēplere multus, quibus impensè calefcit.

Ex quibus omnib⁹ satis sup̄erq. intelligitur, quis sit quātopetēq. necessarius ventriculi vius in corpore: verēq. pluribus in locis dictū à Galeno fuisse & antè eum ab Hippocrate in libro *περὶ γυναικῶν*, quod est plantis terra, hoc ipsum animalibus esse ventriculum.

DE OMENTO. CAP. VII.

**R**ost stomachum & ventriculum de intestinis libèter dicerem, quæ tertiam atq. vltimam illius viæ partem absoluit, quæ cibum, & crassiora illius excrementa ab ore ad anum progredi dicebamus. At quoniā superstratū illis omentum in spectionē eorum & tractationē prohibet, de eo dicēdum antea est, vt illo post detracto liber sit ad intestina accessus. Præsertim cum ipsum quoq. nō minus quā intestina, vētriculo quoquo modo cōtinuetur. Nō, in quā, cū intima ipsius substantia quemadmodum intestina: sed solū cum exteriori tunica à peritoneo orta.

Substantia, et sicut.

Cū enim duplici tenuissima, sed omnino firma mēbrana marsupij, peræ, aut sacculi figura cōstet, quarū altera incūbit alteri; quæ quidē inferior est, ex ea nascitur peritonei parte, quæ statim sub trāuerso septo ad vndecimā thoracis vertebrā arteriā magnā & Cauam venā cōuectit ac dorso adnectit. At dextrorsum per iecoris caua duodeno intestino & infimæ vētriculi parti subnascitur, inde que per intestina conscendit. Quæ verò superior huic incūbit, ex infimæ vētriculi sede ortū habet à tertia illa exteriori vētriculi tunica, quasi futura facta; vt in tertio de animalū hist. lib. c. 14. & 4. de part. c. 3. Philosophus loquitur. Inde supra alterā producta simul cū ea lienis cauo linea recta cōmittitur, sup̄raq. intestina velut mappa extēditur. Quare à Græcis *ἐπιπλωρ* & *ἐπιπλωρ* dicitur; quod ita illis incumbat, vt innatare videatur.

Epiplonur dicitur.

In quibusdā animalibus haud multū infrā vni-

**A** bilicū cōstitit, in alijs vsq. ad os pubis protrahitur, & in homine, cane, fuce, & simia, maximū visitur. Vt nō immeritò dubitatū fuerit, num herniarum morbus ex huius in scrotū prolapsū interdū accidat. Quibus id præcium fuerit, vter ijs frigidior est, imperfectior ciborū coctio, & plurimis opus habēt operimētis. Nam, vt Aristoteles tradidit, ad meliorē coctionē ed natura abutitur, quò facilius sit & celerior: tūm in vētriculo, qua parte inferiori eius sedi subnascitur: tūm in intestinis omnibus, dum illis quasi fouens incumbit. Et quoniam coctio caloris opus est, plurimam illi adiunxit vbi que pinguedinem; in obæsis præsertim animalibus pinguedinem enim calidum est.

Vsque.

**B** Multāsq. à Porta venas & quæ eas comitentur, arterias, quibus euadat calidius, suscipit: nec nō ad sentiēdum à sexto cerebri pari neruus. Dūm autē nō recto, sed errabūdo ductū ac transfuersū & obliquū feruntur venæ & arteriæ, atq. illis circumfusā pinguedo est, sanguine ex vasīs exudatæ ac membranarū frigore in pinguedinē cōcreto; quasi retium funiculi sūt inter quos nuda & simplex mēbrana cōspicitur; eaq. pettenus; ne nimio pōdere intestina grauet; totūq. omentū retis cuiuspiā similitudinē ac formam refert: quā ob causam reticulum & rete vulgus appellat. Sed & alia est calorū ratio: Prohibet enim caloris effluxū, calorque ingeminatus actionē ingeminat. Neq. hoc modò: verūm etiam frigori meatus occludit, eaq. ratione nos calefacit, qua & vestes. Marsupij itē & sacculi, quòd rotūdo sit sūdo, figurā habet. Quòd verò in inferiori eius mēbrana glādosum cernitur corpus, præcipuas venarum, arteriarū, ac neruorum factas ibi diuisiones sustentat. Canem ipse interdum vidi, qui penitus omento careret.

Vas.

Retes dicitur.

DE INTESTINIS. CAP. VIII.

**A**mergò ad intestina, Græcis *σπιν* & *σπιν* dicitur, quæ omento detracta libèrè conspicuntur, reuertatur oratio. Est vnicum reipla intestinū à vētriculo ad podicē vsq. quatuordecim ferè ac dimidiā vlnarum in homine, vel vt sæpè obseruatum est, septies corporis totius longitudine productū, petuum rotū, formāq. rotundā & tereti, quò capacius esset atq. iniurijs externis minùs expositum. Sed plurium numero intestina vocātur, quasi plures illius vniuersas partes, quæ tum vsu ac situ, tum figura, magnitudine & quoquo modo substantia distinguuntur.

Longitudo.

Primū enim in duas totū diuiditur, graciliorem vnā, alterā crassiorē. Nam cū duo prestare debeat intestinū: tūm chylum à vētriculo susceptum coquere magis ac nō nihil elaborare, p̄erq. mesenterij venas ad iecur transmittere: tum excrementa siciora, quæ ex meliori substantia super sunt, repurgare, quæ priorē muneris partem exequitur, gracilior appellatur, crassior, quæ posteriorē absoluit. Nam & crassiorē chyli partem continet, & crassiori substantia constat.

Gracilis et crassa vsque.

Deinde harum vtriusque tres partes facimus, sex omnino intestina commemorantes, tria gracilia, totidēmq. crassiora. Primū omnium, quod ex inferiori dextrorū orificio ventriculi principium habet, *εξ πύλης*, hoc est ex ortus seu processus & principium intestinorum à quibusdam vocatur; communiter *δωδεκάδακτυλον* & duodenum. Quòd in posteriora statim retrorsum sub

Duodenum.

sub ventriculo ad duodecim digitorum in viro longitudinem rectā ferē descendat, antequā in anfractus & orbes conuoluitur. Nullus enim ibi caues erat locus, in quo cōuolui & ingyros flecti posset. Sed & venā Portā relinquēdus erat locus.

Alterum paulō longius ibi vīditur, vbi conuolutio incipit: *venā seu icium dicitur*, quōd inanē perpetuō & nihil cibi continens videatur. Nam aut cum propter iccoris propinquitatē, ad quod vacuum statim trahitur alimentum; bilisque influentis ac stimulantis propulsiōemq. roborantis copiam protinus extrudit: aut propter vasorū, quibus scater, multitudinem citissimē vacuatur. Citius enim multā venā, quā paucā assument; praesertim vbi breuior est via. Quamquā vniuersum hoc gracile intestinum inanē terē cōspicitur.

Tertium tenue totius ferē nomine significatur, quōd longissimum sit & maximum. *ēssor* appellatū Graeci, quōd pluribus fortasē ac frequentibus gyris voluitur. Vnde morbus *ēssos* & voluulus dicitur; ex intestini huius inflāmatione, obstructiōne aut implexu ortus. Hoc persimile secundo est, si tot abundaret vasīs & paulō magis ruberet: albicat enim potius. Primum eius initium non satis distinctē ac certō cognoscitur: eminentiorem tamen ventris regionem occupat, & in crassi principium manifestē definit. Eius frequens est in serotum prolapsus.

Quartum velut principium est intestini crassi; in quo alui faeces, quae vtiliori materia ex alimēto separata remanserunt, speciem primū ac nomen accipiunt. Appendix potius quadam, quā intestinum, videtur esse. Figura paruum quempiam, sed oblongum extuberantem ventrem aut globum refert, dextrōque ferē insidet reni. Duo continet orificia: vnum ileo intestino continuū; alterum humilius, cui in homine coniunctum est & quasi additum breue quoddam & angustissimum omnium intestinum, velut vermis in orbes conuolutus. Et quoniam quartū hoc intestinum à veteribus *τεφρός* seu caecum, & monoculum fuit appellatum; sunt qui hoc de ampliore illo ventre interpretentur, alij de angusto hoc velut vermiculo. Ego ab hominis intestino desumptum fuisse nomen ad vtrumque significandum reor: non solum quōd in vnicum definit orificiū, sed etiam quōd vnius oculi ex cranio eruit, cui opticus nervus adiunctus sit, speciem quādam & formam habeat, nec tamē quidquam cernat. Galenus autem in quarto de vsu partium lib. cap. 18. esse voluit vt ventrem alterum. Nam & eiusmodi quandam figuram habet. Vt si quid tenuioris chyli anadofin fecerit, id totum in caeco, quasi sacco, colligatur diuturnāq. mora planē exagatur. Propterea enim aibus ferē omnibus actiones ventriculi atq. intestinorum robustas habentibus excrementorum receptacula bina extiterūt; ne quid cūm alimentum celeriter feratur, non exhaustum pretermittatur.

Est & velut venter alter crassis excrementis recipiēdis appositus. Prior enim venter est chyli & melioris materia; alter hic excrementosa. Interiorēq. continet venulā, quae faecum in superiore locum impediāt refluxū. Nam in refectis intestinis obseruatur est liquorē iniectū per duodenum facillē per rectū exisse, at iniectū per rectū in appendice caeci subsistisse. In Bestijs mai<sup>9</sup> multō est, quā i hominē: fortasē ne faeces in maioribus ad anteriora motib<sup>9</sup> ad tenuia recurrat intestina: quod in hominē, qui rectus incedit, nō tanto pericauendū fuit.

A Quintū ex hoc deducitur crassum fatīs & carnosum intestinū, quod *καλλος* appellat, à verbo *καλλεω*, hoc est torquēdo, propter duos cruciatus in eo excitatos, quos propterea colicos dolores dicimus. Aut à verbo *καλλω*, vt alijs placet, quōd in eo mouētur faeces. Plurimis enim discretū est cellulis, in quibus ea figuratur. A rene dextro ad iccoris caua primū rectā cōscendit, bilisq. folliculū attingit: vnde luteū quēdam colorē accipit. Mox secūdum ventriculi fundū ad lienē in sinistro latere positū sese proripit, ac leuibis demū cōuolutiōibus per sinistrū lenem versus pubis os fertur, rursumque sinistrorsum ad vmbilici penē locum cōscendens ad sacri ossis initium reflectitur.

B Ex quo loco in maribus sub vesica & in foeminis sub vtero in podicem rectā prolabitur. Hocque sextum & vltimum intestinum: quod propterea, Rectum nūcupatur, ossis sacro prorsus incumbens, & propriū faecum receptaculum. Hic est totus intestinorum ductus à ventriculo ad anum.

Per similes vbiq. ventriculo est intestinorū substatia: quae persimile quoq. aliquam coquēdi cibi vim habet. Est enim nō coquēdi, sed coctū potius in mesenterij venas trāsmitendi gratia factum sit intestinū, praesertim gracile: dum tamē tot spinis & conuolutiōibus constat, diutius detentus melius aliquantō coquitur, vt per angustas venas traducatur facilius.

C Altera etiā fuit multiplicis anfractus causa: vt longius esset intestinum, in quo plures & quasi innumerabiles à iccore susciperētur venulae atq. in longū magis extēderetur alimentū; vt cōmodius totū attrahi posset. Si nāq. rectū ac breue intestinū extitisset, pauca suscepisset venas: & cū multo magis amplū & capax esse deberet, quōd facilius totū cibū confectum caperet, per quā difficilis & tarda trāsmissio fuisset, plurimāq. illius pars, quae in profundo fuisset, venarū apprehēsiōnes effugies cum faecibus fuisset egesta. Iam verō longum cum sit & angustū magis, plurimis refertū est fugentibus venis: & cib<sup>9</sup> magis expāsus accuratissimē totus trāsmititur, cū vix vlla pars ad nutriendū vtilis elabiqueat, quae nō ab aliqua venarū rapiatur atq. ad iecur trahatur. Est quid circumuolutiōnem vnam fuerit praetergressum, secundam aut tertiam aut subsequentiū aliquam non effugit.

Vnde planē cognoscas, aliud coctiōnis, aliud distributionis instrumentū esse debuisse: neque sine causa in animali nullo factū fuisse ventriculū partibus illis contiguū, quibus egerūt excrementa. Mēdū enim benē ac diligenter ex amplo & vasto vase distribui potuisset: & cūm ventriculus coctiōne perfecta laxetur & demittat cibū, maxima illius pars per anū egesta cum excrementis fuisset.

Tertiā rationem eam tradidit in Timaeo Plato. Ne subito alimēta nobis assumpta defluerent, ac rursus noui alimēti cōfestim necessitas immineret. Ob illā enim inexplebilē perpetuāq. voraginē genus nostrū à Philosophia multisq. alienū relictū fuisset, illi parti, quae in nobis diuinissima est, minime obsecuturū. Etenim res ipsa testatur animalia ea, quae simplex habent ac minimē in spiras & gyros cōuolutum intestinū, infatibilia esse, guloia, momentisq. omnibus estantia. Cū enim (inquit Arist. in 3. de part. lib. cap. 14.) cibis celeriter egeratur, proindeque breuis vsus fruendi sit, breui repetant cibum auida necesse est. Quare quae continentiora esse ad cibi desiderium conuenit, haec sua in aluo laxiores sinus nō habent,

sed anfractus orbis que plures continent, nec recto videntur intestino, laxitas namque intestini auiditatem auget cibi; rectitudo accelerat auiditatem.

*Colum cur anfractus habet.*

Porro et si hæc omnia ad intestina gracilia pertinere videantur: Colū tamen quoque, quod crassum est & ad inutilia excrementa discernenda pertinet, suas habet spiras subseq. anfractus. Ratio est, quoniam excrementorum secretio in animalibus omnibus alimenti distributioni responder. Neq. subita & repentina esse debuit. Et vt non semper comedimus, ita nec semper egerimus. Deinde id factum est; vt si quid alimenti boni gracilia intestina præterfugerit, dum hic diutius moratur, horum intestinorum vasis exurgeretur.

*Spiræ musculi.*

Itaque intestino recto ad anum circūiectus est musculus, qui *σφιγξ* hanc ob causam appellatur, quod locum illum constringat, ne continenter aut præmaturo hæc excernantur. Cum vero fuerit opus, laxatur ac permittit transitum. Etenim crassiora hæc intestina velut alter, vt diximus, excrementorum siccorum venter subiiciuntur: & vt ventriculi pylorus ingesto cibo clauditur, nec nisi opportuno tempore laxatur, sic intestini recti extremitati musculus is adest, qui eam in orbem amplectitur, foecūq. excretioni transfertis fibris præcūct; non admodū carneus, sed qualū mucore quodam oblitus. Coccygis ossi adnascitur, & vrinæ quoq. meatui in vris vteri q. ceruicis principio in feminis coheret.

*Duo parui musculi sedi adnati.*

Ad sunt & alij duo recti, lati, & tenues, nè ipsi quidem valde carnosiq. à vinculis, que ex pubis coxendicis, & sacro ossibus enascuntur, infimāq. peritonei parte exorti. Hi deorsum protèsi intestinū illud idē amplectantur, cuiusq. finibus inserti statim post excretionem trahunt sursum sedē, quæ ab abdominis musculis & septo transfertis deorsum fuerat pulsa. Verum cum lati admodū sint, pudendi quoque radicem & vteri collum que dam illorum portio attingit.

Porro crassiora hæc intestina gracilioribus capaciora sunt, multāq. simul excrementa colligunt, nè frequentior ac molesta magis egestio sit. Canibus tamen angustius esse infimum hoc, quam supremum, intestinum; & idē cum vehemēti nixu nec sine cruciati excrementum emittere, adnotauit eodem in loco Aristoteles.

*Intestinorum substantia.*

Verum vt ad intestinorū substantiam exponendam reuertar, eam verē dixi ventriculo esse persimilem. Quoniam duplici tunica, nõ secus atq. ventriculus, cōstant omnia: sed interna magis carnea est, externa magis mēbrana: illa mollior est, quā in ventriculo; quod cibū ab illo iam cōfectum susceptione esset. Vtraq. transfertis solū fibris cōposita est: quoniam nõ ad attrahendum aut retinendum, sed ad protrudendū & dispensandum facta sunt. Quippè cōctione facta referatur pylorus, cōtractūq. ventriculus eijcit chylū, qui naturali suo pōdere per intestina prolabitur atq. per orbiculares & transfertis fibras protruditur. Binæ tamen sunt tunicae, etsi eodem fibrarum genere intextæ: tum vt validior esset propulsio ac distributio, quod citius ad iecur cibis totus perueniret: tum vt instrumēta tantoperē necessaria tutiora essent ac firmiora, in tam lōgo præsertim ductu. Alicubi tamē fibræ aliquæ recte ad transfertis tutelam admiscētur: vt in intestino potissimum colo & recto, quæ siccas & duras feces receptura erant, à quibus lædi plurimum poterāt. Idē etiam crassiores

& robustiores tunicas habent. Sed & fibræ rectæ crassam, durā & renitentē foecū substantiā trahūt. Tertia à peritonæo accedit tunica; tum ad tutelam; tum ad horū omnium copulationem & ligamen. Ea nascitur à mēbranis venas & arterias ad intestina deferentibus, eaq. dorso colligantibus: illis scilicet ibi dilatatis, vbi ad ea peruenierint. Duodenū, inquam, à quadam omenti parte, quæ illi sabnascitur: reliqua à mesenterio.

*Vasa.*

Venæ & arteriæ à Porta magnāq. arteria per mesenterium deriuantur: sed pauciores ad colū & rectum, plurimæ ad ieiunū & ilium: quod intestina vetriculo propinquiora pl<sup>o</sup> optimi succi optimēq. cocti cōtinerent. Quædam etiam peculiare, antequā mesenterii ingrediatur, per duodeni lōgitudinē & ieiuni initii ducitur: nec nõ ad duodeni principiū flauam bilem ab eius vesicula deferens meatus, qua intestina tum ad propellēdum succū stimuletur magno per eque iuuētur, tum detergātur & à petuifoso adharēscēte humore purgentur. Deniq. nerui quoque à sexto cerebri pari ad sunt, quibus noxios humores perferant, quibus infestari aut prorsus corrodī possent. Atque intestina quidem itā se habent. Quæ verò ad mesenterium pertinent, iam prosequar.

DE MESENTERIO.

CAP. IX.



Vod Græci *μωσντήριον* & *μωσντήριον* nominant, quo cōsilio Theodorus Gaza Aristot. de hist. deq. partibus animalium librorū interpretis appellauerit lactes, nõ satis intelligo. Nam Plautū in Curcul: & in Pseudulo, & Plin. lib. 11. ca. 37. & Persium Sat. 2. aliōsq. veteres scriptores reperio intestina potius gracilia lactes nominasse: & Hermoda<sup>o</sup> atq. alij merito Gazam præhenderūt. Neq. Budæi defensio in 1. lib. de affe crimē diluit, sed aggrauat: si nõ intestina, sed illis circūiectam pinguedinem lactes ab eo appellatam fuisse dicat. Nam de mesenterio, non de pinguedine, Aristoteli erat sermo: Græcēque apud ipsum est *μωσντήριον*, quod pinguedinem significare nullus dixerit. Non desunt tamen, qui mesenterii vt totum accipiāt, cuius duæ sint partes, *μωσντήριον* & *μωσντήριον*: illa ad intestina tenuia pertineat, hæc ad cralla: *μωσντήριον*q. dicatur, quod maxima crassorū pars est intestinum colū. Verum de nominibus contendendum non est, modò res ipsa intelligatur. Eam certē vox Græca demonstrat optimē. Mesenterium enim membraneum

*Lactes quid.*

illud corpus est, quod inter intestina mediū existit (in ductum nomen, quia *μωσντήριον*, id est, intestina medium) eaq. omnia tum inter se, tum cum laborum vertebris firmissimē colligat. Quamquā hic non est præcipuus illius vsus: sed propter eum potissimum factum est totum, vt ingentem illam venarum multitudinem, quæ à iecore ad sugendum alimenti succum ad intestina transmittitur, turdē deduceret, atque cum illis complures arterias ab aorta magna, neruosque non paucos à cerebri sexto pari.

*Mesenterium quid.*

*Vsu.*

Quare partim ex lomborum vertebris, quibus adnectenda erant intestina, partim ex venæ Caudæ atq. arteriæ magnæ, quartū ramos deducere debuit, tunicis originem trahit, peritoneo fibras suppetidante.

*ortum.*

dicante. Non enim tutum erat tenuissimas venulas atque arteriolas absque praesidio tam procul solitarias & nudas mittere: facileque implicari & conuolui poterat, non sine maximo animalis dolore ac nutritionis impedimento: adde etiam ipsarum periculo, ne tenuissimae cum sint, facile ruperentur. Itaque fuerunt omnes stabilendae atque in solidissimo membrano corpore veluti tela inferendae ac ordinandae; ut tutae & sine permissio- ne aut confusione ad sua quaeque loca deducerentur.

Substantia.

Sunt autem geminae, atensa & incumbentes membranae; inter quas arctissime continentur conseruae venae & cum illis arteriae ac nerui. Haec facilius multo in homine, quam in cane, separari possunt. Macilentius enim habet canis mesenterium; ut vnicam videatur esse membrana. Interiecta vero contentorum vasorum spatia plurimum occupat adeps. Sed ut intestinorum omnium non eadem forma nec idem spirarum & conuolutionum modus; ita nec eadem mesenterij est vbi que effigies: verum aliqua parte implicatum magis & inuolutum, alia minus: magis, quam ieiuno & ilio inseritur; minus, quam ceteris.

Vena mesenterica.

Totum porro cui iecoris ex porrecta manus est ad intestina: & venae per illud sparsae, quae mesenterae aut mesentericae, mesentericae aut mesentericae, in quo continentur, dictae sunt, veluti digiti manus existunt, quibus attrahitur chylus ex intestinis. Nec minus accommodata est Aristotelis illa comparatio, qua in 2. de partibus cap. 3. & in 4. ca. 4. ventrem & intestina animalibus esse dixit veluti stirpibus terram; venasque mesenterij hoc ipsum in illis esse, quod in his radices sunt. Nam vt ex terra radicibus stirpes, sic ex ventre & intestinis per mesenterij venas alimentum animalia trahunt. Atque in illis virtute iecoris, a quo transmissae sunt, rubescit paulatim & ad sanguinis speciem preparatur.

παχυράς.

Ceterum alio etiam modo tantam vasorum multitudinem ac tenuitatem imbecillitatemque sustentari ac roborari natura voluit. Quippe sub ventriculi fundo in ipso mesenterij centro, vbi prima est distributio, grande subieci glandosum corpus, quod vasa omnia & eorum diuisiones sustineret: nec vsquam laederet, cum molle sit & medio critere cedens. Et inter ventriculum & aortam positum instar puluinis est vtrique corpori; ne ventriculus cibis repletus a lumborum ossibus laedatur, aut arteriam nimium comprimatur spiritusque prohibeat transitum. παχυράς & χαμηλάς hoc appellatur, quasi totus caro, vt in 3. historiae lib. significauit Philosophus. Simplicis enim carnis speciem refert. Deinde minoribus alijs diuisionibus minores alias subieci glandes, quae & vasa & mesenterium totum deducunt. Atque huc reuocare illam placet (tamestis fecis de ea visus sit sentire Galenus in 4. de vltipartium cap. 7. & lib. 8. cap. 4.) quae duodeno obtenditur intestino. Venam enim & arteriam, quae ad intestinum illud extenduntur, sustentat & fulcit: deinde vero intestini cavitatem humore lento aspergit; quod facilius sit alimenti descensus.

## DE IECORE. CAP. X.



Quoniam in hisce nutritionis organis explicandis naturam illis vtentem sequenda mihi proposui, ab intestinis per mesenterium simul cum alimento trahi me ad iecur sentio, A Graecis ἥπαρ dictum. Hoc a Galeno creditum est nutritionis totius ac sanguinis principatum tenere. Quae de re in tertio libro disputatum est. Certè inter omnia ea organa, quae cordi tanquam supremo principi famulantur, quae in ventre continentur, praecipuum est & prima sanguinis officina. Nam etsi propter vetriculum cuiuspiam fortasse videri possit fuisse factum; quod ita incumbat illi, vt pulmones cordi; illud vt calefaciat, hoc vt refrigeret. Non ita tamè est. Superiorem enim, meliorem, & cordi propinquorem locum habet; & verò etiam tutiorem, cum vndiq. costis terè cõte- gatur. Deinde nobiliori actione fungitur, alimentum in sanguinem cõmutans, optimamq. cordi ac mēbris omnibus substantiam parans. Cui operatio- ni famulatur vetriculus, dum ad eam priori adhi- bita cõctione disponit, crassiorēsq. ac feculentas planè sordēs abluat ac secerit. Immo vt in san- guinis procreatione magnopere iecur iuuatur a corde, dū calorem illi per arterias addit, hocq. no- mine cor censetur iecori dominari: sic dum iecur vetriculo incubas calore suo cõctionē eius iuuat, dominari potius, quam famulari, credendum est.

Vid.

Sicut.

Figura.

Suprema igitur vetricus occupat sedē inter transuersum septum & vetriculum: atq. ad ipsum tum hic tum intestina omnia per venas inde acceptas confluunt: & quicquid alimenti vel propria ip- sorum virtute vel adiutore superioris membri ca- lore confectum fuerit, largè comportant. Nullam propriam & peculiare formam postu- lar, sed à circūiectis ac proximis partibus accipit. Superiori regione gibbosum est ac protus laeue & vbiq. aquabile: tum quod septo subfit & à conti- nēte loco ita planè cõformetur; tum quod ad vetriculi cõplexum declinet vndiq. Inferiori autem cauum; & laeue quidē, sed alicubi sinuosum. Quia vetriculo quidē rotundo infidet; & vt fauceat cõ- ctionēq. promoueat, ex parte omni cõplectitur. Sed tubera etiā quaedā & eminentias excipit; bilisq. itē vesiculā. Magis tamē ad dextrā partē desce- dit, totā eam ferè septi partē occupans: vt in sinistra, posteriori praesertim sede, lieni locū relinqueret, corpusq. vtrinq. esset aequilibre. Argumento est, quod a vibus & canibus ac omnino quibus exiguus nec magni pōderis aut nullus lien, aequaliter in vtrūq. latus inest iecur, aut certè vix declinat. In anteriori parte interdū infrā mucronatā cartilagi- nem nonnihil descēdit. Itaq. intrā costas ita condi- tur totū, vt maximā non cordis modò & cerebri, sed omnium planè praecipuorum membrorū ac iecoris quoq. naturā curā in illis omnibus tutissimo & osseo loco quoad fieri potuit collocādis magno- perè admirari ac laudare possis. Atq. intelligere, nō aliā ob causam carnē abdomē ac minime os- seum fabricatū fuisse; nisi propter ea vasa, quae extēdi, dilatari & in maiore molem assurgere crebrò & subsidere debebant. Quae verò nec assurgere nec subsidere oportuit, si non osseo loco, sub alijs certè collocauit: vt lienem, renes, venas, & arte- rias: vt omnia essent quā fieri posset tutissima.

Vnde aliter.

Non est tamen is proprius iecoris vsus, neque ideo factum est à natura, vt ventris operationem iuuare: sed propter propriam ipsi functionē, quae

altera est cibi coctio atque in sanguinem mutatio. Hoc verò magnum, crassum & amplum organum postulat. In quo totum alimentum suscipitur illudque præcalidum, ut magis coqueret. Quod cum ventri propinquum esse oporteret; consequens fuit, ut majori calore addito illius quoque operationem vehementiorem faceret.

Vena Porta.

Debuit etiam caua quidem illius parti adesse Porta, quæ alimentum adduceret mutandum in sanguinem. (Græci *πύλα*, appellarunt: lacteam venam Arabes, non quòd candida sit, sed quòd cremorem lacti persimilem alliciat & ad iecur velut māmam trahat.) In toto autem viscere plurimas ubique abundare venulas, quæ genitū sanguinem susciperent & redderēt. Ac demum per illud medium magnam produci Cauam, quæ susceptum à minoribus sanguinem per totū corpus distribueret. Quæ omnia primam ipsum esse crassioris sanguinis officinam testantur. Nec non adfunt arteriæ cauam regionem ad Portam subeuntes ab aorta diffusæ.

Quantitas.

In homine perquam magnum est, quòd calidissimum animal sit plurimòque indigeat sanguine. Maximum in gulosis & helluonibus. Causam fortasse dixeris esse, quòd ad fouedum ventriculum maiori egeant calore. At idèd potius voraces esse videntur, quòd multo visceris magni calore multum cibi & citò absumant. Magnum item in timidis; fortasse ut maiori calore minueretur timor.

Lobi.

In quibusdam animalibus vnicum est & continuum totum; ut ferè in homine & boue. In alijs, ut in Cane & fuce, in plures partes, quas *λόβοι*, vocant, dissectum, ut còmodius ambiat vètriculum: & in plerisq. quatuor & quinque numerantur, interdum etiam sex. Quare si in libro de ossiū natura plures lobos còmemorauit Hippocrates, de bestijs potius, in quibus illi magis distincti cernuntur, quam de homine credi potest eum fuisse loquutum. Præterquam quòd multa in eodem libro dissectioni minis còsentanea còtinentur: verenturque viri docti, nè subdititijs sit neq. Hippocratis proprius liber. Cur autem non omnibus sit idem loborum numerus; ea extat apud Galenum ratio in 4. de vsu partium lib. cap. 8. quòd neque figura neq. magnitudo ventriculi eadem omnibus est.

Substantia.

Substantiam habet planè spògiosam, mediocriter mollè, rubram & sanguineam. Immodè nil aliud, quam crassior sanguis còtensis affusus vasis & còcretus ac nimio quasi ardore tollus, videtur esse. Propterea *παρρηχουα*, & affusio nominatur. Paulò tamen durior in gibbo est.

Tunica.

Tenuissima tegitur totū tunica à superiori peritonei parte illa deducta, qua id transuerso septo subiectum est.

Nervi.

In quam à sexto cerebri parti porrigitur neruuli, quorum aliqui in iecoris quoq. substantiam penetrant nè viscus omnino sit sensus expertus. Ita vnicuersum iecur se habet.

Quomodo autem in eo gignatur sanguis atq. ab illo minus boni humores secerantur; in libro de humoribus declaratum est. In quo etiam reperies causam, cur nullus in iecore, ut in corde & cerebro, còtinetur sinus: curq. angustissimæ quidem, sed tenuissima còstantes tunica, sint eæ venæ, quæ per iecoris corpus disperguntur. Hæc enim omnia propter facta sunt melius & accuratius coqueretur sanguis. Cuius coctionis excrementa purgantur vesicula, liene, renibus. Idèd de bilis vesicula, quæ eidem huic membro adiuncta est, deque illius meatu primùm dicam.

culæ, quæ eidem huic membro adiuncta est, deque illius meatu primùm dicam.

DE BILIS VESICULA.

CAPVT XI.

**N**utritio in instrumenta, quæ ad coquendum in vètre cibum posita sunt, perfectius hæctenus sum. Nunc de ijs, quæ secerendis excrementis parata fuere, dicere oportet. Quoniã enim in omni coctione excrementum aliquod à meliori substãtia separatur; tum crassioribus fecibus, quæ in prima vètriculi coctione seceruntur, excipiendis intestina crassiora præparauit natura: tum verò triplici excipiendo succo; bilioso vno, leui & tenui; alteri melancholico; crasso & limoso; tertio aqueo ferofouè: qui ex altera iecoris perfectiori mutatione separantur, tria adiunxit vasa, vesiculam quandam affabrè factam, lienem, & renes cum subiecta ipsis vesica.

Coctio in excrementa.

Vesicula, quam *κυστις* Galenus ac veteres nominarūt, in dextra cauaq. iecoris parte ac ferè in maiori lobo in animalibus illis, qui scissum in lobos iecur habent, ità condita est, ut superius illius orificium iecori non procul à vena Porta innascatur, reliquum extrà visceris corpus pendeat; rotunda tota, sed oblonga forma.

Vesicula sua.

Exteriohem hæc partem, quæ maiori propugnaculo indigebat, peritonæi tunica ex iecoris tunica deducta integrit. Sed præter eam alia còstat tota sibi propria omni fibrarū genere intertexta; rectis bilè trahentibus, obliquis retinentibus, transuersis expellètib. Trahit ex eo loco, vbi vena Porta subit iecur, hoc interim noxiū pellente humorem: retinet in seipsa: expellit per alium quendam meatū, qui ad duodenum intestinum nõ procul à ieiuni principio ducitur, ut noxius humor cū excrementis cæteris egeratur, & interim chyli coctio iueuer, & quæ adhibito stimulo irritetur intestina, tum ad coctum succum pellendū, tùm ad egerendas feces, & ipsa quoq. ab aquoso humore detergantur, hæc è que subflauo colore tingantur.

Substantia.

Nam meatus ille, in què vesiculæ ceruix desinit, eo deductus, vnde Porta prodit, in duos ramos diuiditur: Alter sursum in iecur erigitur, multique modis dispergitur: atq. hic bilim ad vesiculam trahit. Quem Galenus in 4. de vsu partiu c. 13. optime obseruauit, propterea inter venas Portæ alimentū ad iecur adducentes; & eas, quæ sanguinem còfectum ad Cauam còportant, fuisse positum, ut purgatum sanguinè vena Caua susciperet. Alter deorsum ductus expulsionis instrumentū existit. Ac nè quid in meatu vnquam regurgitet, tum tortuosus in intestinū ingressus prohibet, tum duræ cauent mēbranulæ, quæ ad orificij latera pēdent atq. illud optime claudūt. Per multi hunc bilis expulsorem meatu ad fundum item vètriculi scribere duci: & illius meminit Galenus in 2. lib. de tēperamentis, & in arte parua, eumque semel obseruauit Vesalius. Sed nec ego ita esse reperio, aut si in quopiam reperiat eiusmodi meatus quipiam, vitiosa est constitutio. Bilem enim is euomet. Minutque sapienter institutum videretur, ut excrementum ad ventriculum mitteretur, qui ciborum duntaxat & alimentorum est locus. Atque ut illi mēbro, quod anxie custodire ac retinere alimentata suscepta debet, quousque optime cocta sint,

Vena.

Purgatio.

stimulus

stimulus bilis adderetur, qui retentricem virtutem enervaret atque ad immaturam deiectionem acriter stimulet & verò etiam compelleret. Itaque iure optimo Galenus cum vitem ventri cerneret fortasse bilem videri posse ad pituitosos humores lateribus eius adhaerentes detergendos; strenuè laboravit in cap. 4. libri. 5. de vfu partium; vt ostenderet eò tamen bilim adducendam non fuisse; quòd maiora multò fequutura essent incommoda, dolor vehemens & mordicatio ventris, nausea, vomitus; si in superiore: aut immatura incocti cibi transmissio, si in inferiorem ventris regionem incidisset. Vtrius autem modo propria ventris actio, quæ coctio est, impediretur.

Apertissimè autem ad intestina deducitur, quæ non ad retinendum, sed ad transmittendum coctum iam cibum posita sunt. Vt nimirum citius transmitteretur id, quo exinanitis partibus ac toti animalis vitæ subueniendum est. Ideò ad duodeni terminum, qui intestinorum ferè principium & vt in primo de sanitate tuenda cap. 12. Galenus loquitur, prima tenuis intestini pars est, dicitur: vt & citius optatù illius vsum consequatur natura; præsertim cum in anfractus statim & orbes, qui minùs expeditam transmissionem faciunt, conuoluantur intestina. Et longius discedat à ventriculo, ne proximè fortasse bilis tenuitate & incidendi facultate laxaretur pylorus aut ad retinendum certè imbecillior fieret.

Denique præter hos meatus habet hæc vesicula duas à Porta venulas, quibus nutritur: nec non arteriolâ, quia natiuus fouetur calor: & neruum, quo sensu participat. Quæ verò animalia & interdum homines scripsit Aristoteles in 4. de partibus cap. 2. & confirmavit Plinius in 11. libro. ca. 37. vesicula hæc carere, credendum est habere meatum rectâ à iecore ad intestina protensum, quo bilem statim egerant: neque in vnùm locum colligere, sicut animalia cætera, quæ humore hoc cum magis abundant, si totum simul effudissent, intestinis nimirum totique naturæ incommodassent, velociori, quàm par esset, facta cibi transmissione, acriorque intestinorum incisione ac detersione.

## DE LIENE.

## CAPVT XII.



Lenem frustra in animalibus extitisse; non puduit Erasistratum affirmare, à Galeno hæc ob causam iure optimo reprehensum in cap. 15. lib. 4. de vfu partium, & cap. 7. lib. de atra bile. Quis enim à natura temerè nihil agente, immò partes omnes vel minimas ad plurimos atque admirabilissimos vsus optimè disponente, tantum viscus frustra factum, & ad sinistram ventriculi sedem, secundum inferiora tamen magis & posteriora, locatum, costis spurjis optimè septum, ventri & omento connexum, atque inutiles pondere corpora nostra grauatâ fuisse credat? Aut quæ sit ratio, cur liene minùs benè & secundum naturam affecto vitiosèque suo munere fungente, non cicatricum modò, vt in problemate, sect. 9. dispu-

at Aristoteles; sed vniuersi corporis color vitetur euadâtque nigrior? Cur ipsemet, in calidè præfertim & siccè temperationis animalibus, vel iecore nigrior semper est? Cur acerbû quidpiâ & à iecore prorsus alienû sapit, si gustetur? Vt in quibusdam animalibus, eisi eorum carnes non insuaui-ter edantur, vorari tamen non possit. Sanè his argumentis adducti veteres philosophi ac medici à liene iecur purgari pronuntiarunt; dum quidquid in sanguine melancholicum est, crassum, limosum, & fæculentum, ad se trahit; pellente item iecore; vt etiam de vesicula dictum est.

Idcirco enim rarum admodum & laxum corpus est, spongiæ cuiusdam instar; vt crassum succum facillè trahat & suscipiat. Idcirco non arterias modo permultas calido abundantes spiritu, ac sima parte, qua ventriculo incumbit, susceptas moxque per totum disseminatas habet. Tum vt succi crassitudinem alterare, conficere, & ita mutare queat, vt ex meliore illius magisque benigna parte nutriatur. Tum verò vt rara semper & ad crassum humorem excipiendum idonea visceris substantia conseruetur: vt & pulmonum ad ærem suscipiendum. Est tamen lien pulmonibus crassior. Quoniam hi tenuiori, flauo, & spiritoso sanguine sustentantur; & celerem ac perennem motum habere copiosumque ærem suscipere ac reddere debuerunt. Rarior autem iecore: quia tum crassior, & nigriorem sanguinem ac succum admittit: tum eo ab arterijs, quæ illic sunt, elaborato pascitur: cum iecur benigno quidem, sed crassiore vescatur sanguine rubro.

Verùm habet etiam complures venas cum iecore copulatas: quas, si ad comportandum solum nutrimentum illi visceri necessarium, non item ad superfluum & noxium succum fecernendum pertinere debuissent, minime opus erat esse tam multas tamque amplas. Tum verò peculiaris apparet venalis meatus ad superius ventriculi orificium: quem non aliam ob causam adiunctum dixeris, quàm propter illius succi secretionem.

Per eum enim in ventriculû eructat lien melancholicum succû, qui ex ipsius nutritione, meliore attracta humoris parte, super est. Ique ventriculo primùm ad ciborum appetentiam & susceptorum amplexum ac retentionem confert: deindè per intestina cum cæteris excrementis egeritur. Hic est primus & præcipuus lienis vsus. Propter quem fortasse ab hoc membro pendere risum credidit vulgus. Scitum enim est illud;

*Splen ridere facit, cogit amare iecur.*

Quia dum fæculentum ac tetrum fecernit sanguinem, reliquum purum, agilem, & quòdammodo hilariorem facit. Et propterea iecori propinquum lenem natura fecit, vt humoris terri purgatione purum & quasi nitidum speculum redderet ad imagines exprimentendas atque ad amandum accommodatum.

Alter vsus est ad fouendam sinistram & inferiorem ventriculi sedem, eiusque coctionem calore iuandam, sicut dextra & superior tota iuuatur iecore. Quòd in 3. de partibus cap. 7. fateatur Philosophus, tamen tum viscera omnia, tum lienem venarum præcipuè gratia fuisse facta voluerit: vt eas, inquam, sustinerent & velut anchora & clauis stabilirent ad corpus partesque per quas ducuntur.

Tertius, quem eodem quoque loco significauit

K iij

*Substantia*

*Vasa*

*Purgatio*

*Vsu alij*

*Tertius*

Aristoteles, ad compensandum in sinistra parte iccoris pondus, quod ad sinistram ferè magis declinat. Vt in primo historiae libro cap. 18. & 4. lib. de animalium ortu cap. 4. tanquam prodigium narretur, visum aliquando fuisse viscerum horum permutatum situm, & lienem interdum duplicem. Hippocrates autem in 4. de morbis libro lienem scripsit potum in ventrem missum attrahere & per venas distribuere. Quod de immoderato potu; neque immediatè, sed mediante iccore intelligas. Alioqui tam cibum, quam potum consistat à ventre per intestina ad iecur mitti atque ab eo dispensari.

Nervi.

Ceterum præter arterias & venas nervi quod à sexto cerebri pari inferuntur lieni aut illius potius tunica à peritonæo accepta. Hæc ab omni membranis oritur, qua parte lienis recta innascuntur lineæ, quæ arterias & venas ad illud viscus ductas excipit. Venæ atrum adducit sanguinem; arteriæ pulsu attenuant & expurgant, nativumque calorem terro ac frigido inquinatum ac penè obrutum humore tuentur ac fouent.

Linea media.

Lineam eam si spectes, verè dixeris bipartitum esse lienem; si non in dextram & sinistram partem, vt in cap. 7. notato Aristoteles indicauit; propterea quod quasi iecur adulteratum esse videtur: certè in anteriorem & posteriorem, quæ linea illa separantur in ipsius medio cauo secundum longitudinem sese attolente.

Figura.

Ventri enim incumbens modicè cauis interiori parte & exteriori gibbosus euadit. In homine breuior est, sed crassior & latior, quam in cane, sue, & boue, in quibus longior & tenuior visitur. In illo ipso tamen longitudo crassitudinem ac latitudinem superat; parsq. superior inferiore latior aliquatò cernitur: vt linguæ nonnullam nec obscuram formam præferat; & pedis planta assimilauit Hippocrates in lib. de corporum reflectione. Rotundum quibusdam esse legimus apud Philosophum in 3. de partibus cap. 12. Superficies sanè tota læuis est, sed minus, quam iccoris, cordis, pulmonum & aliorum viscerum læuibus enim & minimis cauernulis aspersa vbique conspicitur.

Color.

Denique color non idem semper apparet: nec solum in vniuerso animalium genere, verum nec in speciebus singulis. Ferè autem in fortioribus calidioribus & liccioribus nigrior est; vt in homine leone, & cane: in humidioribus & frigidioribus, vt in sue, albicat magis. Qua in re non leue momentum habent anni tempus, regio, cibi, curæ, vigilia, studia, morbi, & id genus alia.

Quantitas.

Atque in hoc viscere magnitudo deterior est paruitate. Nam si corpus floreat, lien minuitur: si lien crescat, minuitur corpus. Quam ob causam fiscum Traianus Imperator lienem appellabat. Fisco namque ditescente populus exhauritur & contrà. Quod verò in cap. 7. ante memorato & 2. historiae lib. cap. 15. proditum est, animalibus quibusdam aut nullum aut perexiguam, & vix sensibilem esse lienem; minus mirum videbitur, si quædam meminimus bilis etiam carere vesicula. Ea fere feruentiorem habere ventrem, vt columbum, accipitrem, miluum, noctuam, dixit Aristoteles: neq. indigere liene ad coctionem cibi iuuandam. Excrementorum autem succum, aut in vapores per laxam carnem resoluerè, aut in pennas & squammas consumere. At neque

Animalitate experita.

A negandum, haud copiosum his melancholicum & terum succum in esse, cumque per meatum ad ventrem absque liene ductum transmitti. Sic enim de flauæ bilis purgatione in ijs, quæ vesicula carent, dicebatur, & in 4. de vsu partium lib. cap. 12. confirmat Galenus.

DE RENIBVS.

CAPVT XIII.

**B** Ertium instrumenti genus, quod ad alterius illius coctionis, quæ in iccore facta est, excrementa fecerenda præparauit natura, sunt renes, *regei dno rē vsu; i. vrinæ purg. rō.* quod est mingere, & pluere aut *regei dno rē vsu; i. vrinæ purg. rō.* humoris defluxu. Eos namq. hunc planè in corporibus nostris habere vsum, cautitas illa testatur, quæ in ipsorum medio conspicitur humori cuiuspiam excipiendo extracta. Hunc verò aquosum esse illum, quem velut sanguinis in iccore geniti ferè esse dicimus, & *regei dno rē vsu; i. vrinæ purg. rō.* vrinam ac lotium appellamus; ostendit subiecta renibus vesica, vt humorem illum suscipiat ac meiendo reddat, meatuque illi, qui à renibus ad vesicam descendunt. *regei dno rē vsu; i. vrinæ purg. rō.* vrinarios propterea dixerunt, quod vrinam à renibus ad vesicam deducant. Verum priora duo excrementa ex iccore statim, dum sanguis gigneretur, secreta sunt à bilis vesicula lieneque: at hoc tertium à renibus trahitur ex vena Caua, quæ genitum iam suscepit sanguinem. Venæ, etenim illæ, quæ emulgentes nuncupantur, quod serosum hunc & aqueum humorem emungant ex sanguine ad venâ cauam pertinent. Quod idèd factum est, quoniam aqueus ille humor vilis futurus erat & necessarius crasso adhuc sanguini per angustas iccoris venulas ad magnum Cauæ truncum introducendo: sicut antea non parùm chyli ex intestinis ad iecur promotionem iuauerat. Vbi verò ad amplam peruenit, cuius ramos per mearem facile potest, cum arteriarum præsertim tenuiorem calorem vbique proximum habeat, fecerèdum id fuit, quod inutile ac noxium deinceps futurum erat.

Itaque cum id multò magis, quam bilis aut melancholicus succus, abundet in sanguine, tum binos renes, vtinque alterum, apposuit natura, tum emulgentem duplicem, per amplam & latam vtinamque, ac binos demum vtineros. Non solum vt citior secretio fieret (quam etiam ob causam propè iecur & venam Cauam renes ambo positi sunt) atque vt operationi tantoperè ad vitam tuendam necessaria quam optimè prouideret: vt si quando alterum obturari contingeret aut quouis modo impediti nè proprium haberet vsum, adesset alter, qui functionem maximè necessariam exequeretur. Verum etiam plurimum omnino est hoc excrementi genus: quod si per vnicum renem purgari oportuisset, diuturnam prorsus ac tardam purgationem habuisset. Quatuor semel obseruauit Laurentius. Rarissimum est.

Inæqualis autem existit situs. Nam elatior paulò est dexter, iecurque contingit, depressior sinister, qui lieni vix quadam ex parte subternitur. *regei dno rē vsu; i. vrinæ purg. rō.* Etia

*regei dno rē vsu; i. vrinæ purg. rō.*

*regei dno rē vsu; i. vrinæ purg. rō.*

*regei dno rē vsu; i. vrinæ purg. rō.*

Et si propè vertebrae, immò septo ac tribus infim-  
 is coltis, quò tutior esset locus, infideant ambo.  
 Ea existat apud Aristotelem ratio in 3. lib. de partibus  
 cap. 9. quia cum renes ad hunc trahendum  
 humorem facti sint, principium cuiusvis motus  
 est in parte dextra; eaque validior, quam sinistra,  
 est. Altera fuit Galeni in 5. de usu partium cap. 6.  
 Nam si aduersam, inquit, positionem haberent,  
 alter tractu suo in contrarium alterius tractui mó-  
 ram faceret: nunc autem vterque agit liberè, so-  
 lusque attrahit; cum nihil sibi à regione habeat  
 oppositum. Dexter autem superior est, quia vis-  
 cus ipsum; quòd purgatur, in dextris locatum  
 erat; & plurima vena Caua germinat in dextram  
 partem officij deservit, sanguinem ex iecore in  
 ipsam venam ducetia. Nec abs re crediderit quis-  
 piam voluisse ita naturam iecoris pondus in dex-  
 tra parte positum quoquo modo compensare, de-  
 pressiori facto sinistro rene, qui maiore vi deorsum  
 trahens gravitatem illi parti maiorem adderet. Ea  
 etiam fortasse fuerit causa, vt si qua feri portio re-  
 ne vnum præterflueret, incidere in alterum. Sed  
 Ego id propter loci potissimum conditionem fa-  
 ctu fuisse dixerim. Nam cum sinistra inferior vé-  
 tris sedes liene occupata esset, Ilq. inferiori descen-  
 dat, quæ ex dextra parte iecur; elatior dextro reni,  
 quam sinistro, relinquatur locus. Alioqui in ijs,  
 quæ minorem lienem grandisque iecur habe-  
 rent, non semel sinister ren elatior dextro visus  
 est. Non raro etiam nec à paucis vnicus ren ob-  
 seruatus: & in 4. de animalium ortu cap. 4. Ari-  
 stoteles quoque prodidit. Sed ne minus tarda  
 excrementi secretio fiat, miris magnitudine com-  
 pensat numerum.

*substantia.* Porro siue vnus sit siue duplex, substantia con-  
 stat densa, & perquam solida; nullis tamen in-  
 texta fibris. Ad trahendum enim, retinendum, &  
 expellendum, vasorum, quæ continet, fibris vitur:  
 vt & iecoris pulmonumq. viscera. Inter glandes  
 numeravit Hippocrates; inter viscera potius &  
 parenchymata Galenus. Superficies exterior læ-  
 vis est & prorsus lubrica.

*Figura.* Color splendens, sed ruber & quasi aduste sub-  
 stantia. Forma oblonga, sed propendunt rotun-  
 da, fascioli vulgò dicti ferè figura. Quippè exte-  
 riori parte semicirculum ferè describit, interior in  
 sinum quendam contrahitur: vbique crassior, an-  
 terius tamen & posterius non nihil compressa.  
*Vasa.* Interiori sinu excipiuntur vasa, emulgentes vena à  
 Caua, quæ cū alimentario sanguine & bilis aliqua  
 parte serosum adducit humorè; ac sub illis arte-  
 ria ab aorta magna. Sed ita, vt cum propè ad renè  
 accesserint, in duos scindantur ramos, quorum  
 alter superiori, alter inferiori sinui angulo infe-  
 runtur sanguine per venas illas aducto atque ar-  
 teriarum calore percocto nutriuntur renes: quòd-  
 que serosum & inutile excrementum, superest, ad  
 sinum in ipsis contentum excolatur persistulas,  
 quarum extremis apparent carunculae velut extu-  
 berantes papillæ eiusdem substantiæ fistulas sin-  
 gulas obturantes. Septem, octo, & nouem interdum  
 visuntur. Per has in amplum sinum ab vrete-  
 re efformatum confluit serum, quod mox bile  
 coloratum per vretrem meatum, qui ad vesicam  
 velut subiectam lagenam aut cisternam indè def-  
 cendit, mittitur totum: natura scilicet humorem  
 noxium, quo grauaturn & verò etiam stimulaturn,  
 expellente, ipsoque non inuito fluente.

*Caruncula.*

Ceterum quod Galenus contendit in 5. de usu  
 partium cap. 5. non ex venis modò, sed ex arterijs  
 item renes vrinam segregare; nullo modo pro-  
 bandum est. Neque constat cum altero illo eius-  
 dem medici pronuntiato, Serosum illum humo-  
 rem ex iecoris gibbis trahi, vbi primum sanguis  
 venam Cauam subijit. Iique qui arterijs continen-  
 tur, purissimus est ac diu multumque in corde  
 percoctus & elaboratus; ad quod, vt inquebat  
 Aristoteles, eiusmodi nullus superfluous humor  
 appropinquare potest. Quòd enim maiores,  
 quam Galenus vellet, arteriæ illæ sint quæ ad re-  
 nes pertingunt; causa est, quòd ad deteriorem il-  
 lum coquendum sanguinem & humorem no-  
 xium secernendum multo calore opus fuit.

Præter venas & arterias habet & à sexto cerebri  
 pari tenuem neruum, ne sensu planè destituatur.  
 Duæque totum hoc viscus ambiunt tunica. In-  
 terior vna illius substantiæ connata, exanguis pla-  
 nè, ab exteriori vena, & arteriæ renem subeun-  
 tium tunica dilatata existens. Altera exterior, qua  
 dorso viscus alligatur, à peritoneo ducta, quæ in-  
 feriolem septi partem succingit. Hęc pinguedine  
 multa, qua totus ren fouetur & actio eius iua-  
 tur, obductas habet, velut omētum, venas; in dex-  
 tro quidem rene ex superiori emulgentis sede;  
 in sinistro autem ex ipso Cauæ tronco, antequam  
 sinistram emulgentem extendat ad renem: aut  
 interdum secus, vt in lib. 3. adnotauit. Neque hęc  
 nihil longior de renibus futurus est sermo. Sed  
 reliqua persequenda; quæ ad aquei & serosi huius  
 excrementi secretionem pertinent.

*Vrina secreta*

*Tunica*

DE VRINARIIS MEA-  
ribus & Vesica.

CAPVT XIII.

**R**ego cum renes propè iecur habita-  
 rent, vesica autem, quæ excrementum  
 illud exceptura erat, in imo ventre,  
 vnde sicca quoque egeruntur excre-  
 menta, esse deberet: longis opus fuit meatibus,  
 qui à renibus ad vesicam humorem illum deduce-  
 rent. Constat enim hæc propè anum, apertissimo  
 egerendis excrementis loco; intestino recto in-  
 mixta: alioqui si sub illo fuisset posita, distendi vr-  
 ina suscepta non potuisset. Hos *superiores*, seu  
*superiores* & *inferiores* seu vretres vrinariosue meatus no-  
 minari iam dixi. Substantia constant venali prof-  
 fus simili; hoc est vnica tunica, sed paulo duriore,  
 quod mordacem ac rodentem humorem conten-  
 tenturi & maioribus interdum periculis obno-  
 xij, futuri essent.

*Vasa sinu*

*Vretres*

Fit enim non raro, vt in interiore renum sinu,  
 in quo percolatur vrina, crassus quispian & glu-  
 tinosus succus, viscens, eius calore afficitur, aduratur,  
 & in calculum cõrescat per angustum meatum  
 cum incredibili mox dolore descensurum. Vnde  
 imperita vrinæ secretionem, in maximum vitæ dis-  
 crimen crebramque mortem incidimus. Sed &  
 propterea calculosorum ferè crux stupore torpet;  
 quod musculis cruri fleetendo dicatis incumbant  
 calculosi renes, neruisque prematur, qui in cruris  
 musculos omnes extenditur.

*Calculi*

Eandem ob causam recta super lumborum musculos progrediuntur, nec usquam, ut intestina, conuoluuntur in orbem: paucioresque quam vena, obliquas habent fibras: tum ne retentrice illarum virtute transitus urinae retardetur: tum ut laxentur facilius magisque extendantur. Hinc tunicae propriae altera communis accedit à peritoneo, cui ad vesicam descendentes firmitatis gratia incumbunt. Et idem qua parte peritoneum spectat, vesicae interfundum & ceruicem infiguntur obliquo ductu & in anfractus conuoluto, dum primam peritonei tunicam penetrant, membranulis ad foramen, siue roboris, siue custoditae potius causa, appensis; ne vesica distenta regurgitet in meatum urinae. Locumque ipse insertionis ad hoc aptissimus est. Quia dum supra totum vesicae corpus urina subit, absque regurgitationis periculo impletur tota & distenditur.

Vesicae figura.

Est autem vesica rotanda quidem & capacissima seu oblonga figura; ut commodius eo loco continetur, & extendi ac turgere possit. Idem & supra intestinum rectum in maribus & supra vterum in foeminis locata est. Nimum tamen attolleretur, si prorsus rotunda esset,

Substantia.

Duplici constat tunica. Interior propria membranam habet & nerueam substantiam, distendi & contrahi aptissimam: ut urinae multum susciperet, quod simul totum emitteretur, ne crebrior haec purgatio molesta nimium fieret; eaque mox emissila subsideret. Tum vero duram & validam: ne ab acri, mordaci, & rodente humore atque interdum calculis lederetur. Triplici fibrarum genere constat, attrahentiū, retinentiū, expellentium. Altera illi à peritoneo accedit, non parum robusta, inde orta, ubi eius consistit fundus. Inde post erigitur cetui seu collum, in maribus quibus pudendum, quo reddenda urina est, extorsum prominere, longius & angustius, quam in foeminis. Namque in his vteri ceruicis statim inferitur, illucque urinam conijcit. In illis autem cum semen quoque eadem emittatur parte, adest primum glandosum corpus, quod tum seminalium vasorum insertionem suscipit, tum urinae meatum humectat & irrigat. Deinde vesicae ceruix vterius producit, atque os pubis egrediens intra musculos pudendi absconditur ibique desinit.

Musculus, epityp.

Vtriusque autem, & mari & foeminae communis est musculus epityp, qui in orbem vesicae ceruicem cingit, fibrisque transuersis egressui urinae praestit; ne nolentibus nobis effluat, ac volentibus vterum & cum celeritate erumpat: non secus ac de recti intestini musculo antea dictum est. Hoc in calculi extractione secato, fit ut multi post importuno urinae motu laborent: quod plusquam oporteat sectus laceratusque musculus sit. In foeminis ceruicem totam ambit; in maribus id, quod post glandosum corpus reliquum est, antequam pudendi musculos subiens reflectatur.

Vterus meatus.

Ceterum hic alterius quoque vrinarij meatus, ὁ ὑπερὸς & ὑπερὸς, dicti, facienda mihi est mentio: quo ex fundo vesicae ad vmbilicum ducto, cum de vmbilici vasis dicerem, factum ostendi, dum in vtero viuit nec dum pudendo mingit, vrinam in alantoidem vmbilico fecernere. Cur autem tunc non pudendo, sed vmbilico fecernat; hanc arbi-

tror esse causam; ne aut tenellam pudendum aut totius corpusculi mollis nimium caro urinae siue praeter labentis siue circumfusae actrimonia & corrodenate qualitate laederetur.

Hoc vnum de vesicae substantia addam, quod ferè praetermissum: nequaquam huic membro suas deesse venam, qua à Caua nutriatur; & arteriam, qua ab Aorta calorem; ac demum neruos, quibus à sexto cerebri & postremis spinæ paribus acris & rodentis humoris, calculiue, aut alterius cuiusvis iniuriæ sensum accipiat. Tanta est naturæ vel in abiectissimis & sordidissimis partibus cura atque industria.

B

#### DE PARTIBVS PROCREATIONI sumulantibus.

#### CAPVT XV.



Numeri illius vasorum generis, quod ad nutriendum & animal vnumquodque conseruandum refertur, facilis est haec & aperta descriptio. Iam alterum, quod ad procreandum tuendamque speciem comparatum est, intactum si praetermissum, iure optimo mancum, parteque non minima, neque inutili, mutilatum opus fecisse me dixeris, si vel leuiter pertractauero, pudorem desiderabis meum; nec immerito succentibus. Quid igitur? Possem scitum illud usurpare; Omnia munda mundis. Possem & Theologos proferre scriptores de his non ratò contendere, atque in permultis ad Christiani viri officium pertinentibus pernecessariarum horum cognitionem esse. Quidni ergò mihi nunc philosopho liceat quaedam attingere? At pudicos malo pictores statuariae imitari; Qui si picturam quampiam aut statuam partibus omnibus accuratè delineatam fecerint, ips, quæ intuentium fortasse oculos ac pudore possent offendere, prudenter obducunt velum, equidem harum quoque pudendarum, tum maris tum foeminae partium non incuriosam feceram descriptionem. Sed obduco velum; malòque mancum opus meum, quàm minus pudicum, videri. Hoc vnum dixerò, eadem in maribus atque in foeminis haberi vasa, sed in illis secus, quàm in is, à natura disposita, quod alio atque alio modo, illos agendo, has suscipiendo ac patièdo, absoluerè hoc opus oportebat. In maribus, partibus constant quatuor meatibus, qui materiam futuri seminis comportant ad testes, & preparant: testibus, qui seminis perficiendi vim obtinent: meatibus perfectum iam semen continentibus: ac demum pudendo, quo idem foeminae vuluam conijcitur. At haec ipsa, quæ maribus extra prominent, foeminis intro còdita sunt. Alioqui in illis item testes sunt, & seminarij meatus: quodque in maribus est pudendum ad emittendum semen, hoc in illis est vterus ad suscipiendum, fouendum, & continendum. Idcirco enim cauam magis, minusque solidam hanc partem, quàm pudendum maris, esse oportuit.

D E

## DE TESTIVM VSV.

## CAPVT XVI.

**S**ed opera pretium erit paulò attentius considerare quisnam proprius sit ac præcipuus testium vsus.

Nam cum in superiori descriptione acceptum fuerit, ad conficiendum semen illis naturam vt, hosque proprium esse illorum opus; secus Aristoteles vsus est sentire in 1. lib. de animalium ortu cap. 4. Quo loco eos ostendit nequam esse ad conficiendum semen atque adeo ad procreandum necessarios. Quoniam serpentes & pisces, & verò etiam, vt est in 3. de historia cap. 1. & lib. 5. cap. 5. animalia ea omnia, quæ pedibus carent, testibus planè carent. Meatus tamen habent genitalis feminis plenos, coeuntque ac sibi simile gignunt & taurus quispiam amputatis testibus coiuit ac genuit. Ità confecit, totam huius operis vim & potestatem in meatibus semen continentibus inesse, nullam in testibus. Quos duas ob causas animalibus quibusdam fuisse aditos asseruit.

Primum vt circa illos seminarij meatus conuoluerentur, quò tardior esset emissio feminis minusque ad coitum, quo nimium franguntur vires atque immatura adducitur mors, sollicitarentur animalia illa, quæ cum vicium edant factum, viuaciora & idè castiora esse oportuit; quam ea, quæ plures simul & citò pariunt. Quod enim in cibo, hoc in semine quoque euenit. Nam vt ea, quibus intestinum est rectum nequè in spiras & anfractus conuolutum, voraciora sunt & cibi semper appetentia; quòd sumptum minus retineant, sed statim egerant: sic quæ testibus carent & solos meatus seminarios vbique rectos habent, salacia magis sunt atque in venere pronæ.

Quare cum tria sint animalium genera; quæ testibus prorsus carent, vt serpentes & pisces, citissimè omnium coeunt, cum primum coniunguntur: tardius ea, quibus intro illis sunt conditi, vt aues; siuè ad lumbos, siuè in alio, quoniam meatus conuoluantur: tardissimè verò illa, quæ testes extra habent, siuè ab imo ventre pendulos vt homo & equus; siuè retrò annexos natibus, vt sus & canis; quia productiores in his meatus sunt, atque ab externo frigore refrigerati còstrictiq. longiore omninò indigent motu & attritione, qua calefiant & dilatentur.

Altera causa, cur vtriq. huic animalium generi, quibus conuoluti meatus insunt, adiectos crediderit Philosophus esse testes; ea fuit, vt quemadmodum textricum pondera telis annexa telam extendunt & aperiunt vias, quibus recta nauiculum moueatur: sic pendentes illi apertos tenerent meatus, per quos emitti semen oportet; quique detractis illis contraheretur nimium, nec posset illud effundi.

Tertiam causam addidit in explicatione 24. problem: sect. 4. illorum animalium propriam, quibus extra pendent. Eos enim asseruit esse velut pondera, quæ pudendi tensionem & crectionem efficiunt.

Ex quibus omnibus manifestum est, non mea-

**A**tus propter testes, sed testes potius propter meatus cum credidisse fuisse factos; meatusq. primos in generatione tenere. Quartam causam addiderunt alij, vt serosum humorem & feminis excrementum exfugant. Alij etiam quintam, puluinari instar & mollioris substerniculi fulciret meatus.

Porrò aduersus illam Aristotelis sententiam multa disputauit Galenus, in 1. lib. de semine cap. 15. Et certè priorem illius partem, quæ testes contendit non esse ad conficiendum semen aut animal procreandum necessarios; si de semine ac procreatione vniuersè, loquatur verissima esse ostendunt ipsius argumenta. Posterior autem de testium vsu in animalibus ijs, in quibus insunt, suspecta magis esse potest. Nam vt miram: testibus amputatis animalia non procreate, meatus licet supersint: illorum substantiam semini persimilem esse colore: frigidis appositis, oppio, mandragora, & similibus, sterilia effici animalia: quæuis pendentes testes aperiant meatus. Idem ipse Philosophus postremis eiusdem quarti capituli verbis fatetur animalia hæc non prius effundere semen, quàm testes retrahant. Quòd si in ipsa effusione retrahantur & atollantur (quam ob causam in 26. Problem: eiusdem sect. 4. hyeme magis, quàm æstate, concumbere nos asserit, quòd retracti eo tempore magis minutique penduli testes sint) non igitur adsunt idcirco, vt suo pondere meatus aperiant erigantue pudendum: quod partim naturaliter erigitur statu ac spiritu copioso cauos neruos impellente; partim ab appetitu musculos munerì illi dicatos mouente. Deinde in cap. 1. lib. 3. de historia duos esse asserit castrandi modos. Aut enim, inquit, nouellos adhuc testes frangunt, aut adultos iam firmosque excidunt. At quibus franguntur duntaxat, non auferuntur pondera: non igitur clauduntur meatus. Quin si in meatibus seminaria vis esset, possent nò minùs, quàm antea, animalia illa procreare. Tùm vero animalibus ijs, quibus intro testes alligantur nequè penduli sunt, quomodo ponderis vim habeant; cum altiore prorsus, quàm ipsi meatus, consistant loco?

Nequè etiam adsunt idcirco, vt circa illos conuoluantur meatus: Nam si intestina per se absque vilo subiecto corpore inuoluantur, quidni meatus quoque illi inuoluerentur? Sanè irà sunt introiti meatus illi, vt si distenderentur, ad extremum ferè pedem descenderent. Membris vero ac vicinis partibus adherent tam firmiter, vt extendi ponderisque instar esse non possint. Neque maiori viarum amplitudine opus habet semen, quod epidimida & testes obscurissimisque & minimè conspicuas vias penetrat. Non enim copiosa est effusio, quæ amplas ac patentes vias postulet.

Qui vero excrementi secretionem cogitarunt, intelligere potuissent semen ipsum excrementum esse, vile tamen atque exaccuratè cocta materia constare, serosumque humorem in renibus separatum fuisse: nec vllam rationem esse, cur excrementum potius, quàm semen ipsum ingrediatur testes: præsertim cum spiritosum torum & magis calidum sit semen.

Denique, qui puluinari aut substerniculum supposuerunt, suspensum corpus apposuerunt, quòd cum stabili & firmo non consistat loco, vsum illum præstare nequaquam potest.

Galeni con-  
futatione.

Aristotelis  
sentire.

Diversa ani-  
malium conu.

Eunuchi  
quales.

Iam verò verissimum illud est & experientia quotidiana confirmatum, quòd in cap. 2. lib. 1. de animalium ortu & cap. 3. & 7. lib. 5. legimus, excelsis testibus corpus maris in feminæ naturam commutari: nimirum calor roburque ac vires debilitantur plurimum, coitus appetitio cessat, mutatur vox, depile fit & obœsum totum corpus, gracilescunt venæ, ac demùm saporiple carnis mutatur & fit suavior. Præsens namque feminis calore totum calefcit corpus & turget. Hæcque omnia eueniunt, etsi ita eximantur testes, vt integri atque intacti meatus conferentur (quam ob causam Ægyptij, vt Regem sibi ademptum fractâque illius vires significarent, typhonem castratum pingebant) Sed & mores mutantur. Vndè illud Auenzoar, In Eunuchis malos agnoscimus mores, rationis sunt pessimæ, nec ferè inuentus aliquis excelsus bonæ legis, aut intellectus non diminuti. Hæc ille. Fateri ergo oportet, in marium testibus virtutem principiumque procreationis inesse, quo mas potissimum à femina separatur. Quæ ratio Aueroëem quoque coëgit, vt in commentario 3. in primum citatù lib. eos diceret in hoc gignendi opere in maribus esse primos.

Accedit illud præterea quòd meatus illi, qui ad testes materiam feminis comportant, non solum super epidimida ducuntur, sed ea plurimis in locis perforata substantiam testium penetrant, materiam illis gignendi feminis subministrantes. Quòd Aristoteles ipse tradere visus est, dùm auihus tempore coitus intumescere testes multoque grandiores fieri obseruauit: quòd excrementum, inquit, genitalerecipiant. Meatusque reliqui semen à testibus deferentes, qua parte illis connati sunt, si cultello separentur, plurimos visuntur habere meatulos, quibus à testibus hauriant semen. Ac demùm testes per medium dissecti humore albo, hoc est semine, pleni esse conspiciuntur.

quo circa imperfectus quidem ac minùs coctum animalium quorundam semen, vt serpentum & piscium, qui in aquis degunt, sine illis esse potest: at eorum, quæ perfectiora sunt non item. Atque in illis quidem ita est, si in meatibus coquatur: in his verò etsi in meatibus quoque non nulla sit feminaria vis, qua sensim mutetur sanguis & albescat, vt perfectum tamen & fecundum sit semen, testium item opus est opera, quæ versatur in eo, vt optimè sanguis & spiritus miscantur, calorêque membri paulò magis æquantur. Vt quod de alimento dicitur, de semine quoque liceat pronuntiare. Quomodo enim

Seminis &  
alimenti si-  
milis ratio.

animalia quædam perfectò sanguine nutriuntur, alia non sanguine, sed dulci humore, qui sanguini porporione respòdeat: sic ex perfectò quædam, alia ex minùs perfectò nascuntur semine. In sanguine præditis gignitur is in iccore ab ea, quæ huius membri substantiæ ingenta est, facultate. Et in ijs, quæ testes, habent, ab insita illis virtute perfectum semen existit. Chylus in mesenterij venis nonnihil preparatus per tenues Porta venulas totum subit iecur, moxque sanguinis formam adeptus Cauam per eius ramulos ingrediens ad nutriendum totum corpus dimittitur. Sanguis & spiritus in preparantibus vas nonnihil mutati per graciles illorum surculos vniuersum testium corpus ingredientibus permeant: perfectâque feminis natura accepta, per tenuissimos poros ad def-

ferentes meatus transeunt, atque ad aliud quidpiam procreandum conijciuntur in vterum.

Vndè consequens est, meatus & pudendum propter testes à natura fuisse fabricata: neque testes meatibus, sed meatus testibus appositos: vt partim gignendi feminis materiam ad membrum illud adducerent, in quo gignendi vis inest: partim susciperent genitum atque ad pudendum & vuluam deducerent. Itaque communissimum quidem procreationis instrumentum meatus sunt; quòd in animalibus omnibus insint tum verò testes; siquidem eos habent sine pudendo animalia complura, vt aues. Sed tamen vbi adsunt hæc omnia, præcipui sunt testes: quòd vim feminis potissimum habeant.

quod autem excelsis testibus procreasset aurum Philosophus scribit, aut omnino mirum est. Veneris namque retentis intensissimus dolor non veneris modo; sed cibi quoque & potus appetentiam omnem tolleret. Quippe vel sola testium compressio aut percussio tantum dolorem adfert, vt nec pedibus stare animal possit. Aut si verum fuit & non ex aliorum solum relatione id Aristoteles scripsit; ideo factum est, quòd meatus feminæ pleni statim in vuluam illud coniecerunt.

Verum ex hac tota disputatione nequaquam Galenus colligat, testes esse procreatricis virtutis princeps membrum. Quoniam vt verè adnotatum fuit ad Aueroë in 2. lib. colligit cap. 10. tota vis procreandi, quæ in semine inest, in spiritu, qui in eo continetur, residet. Spiritus autem principium & fons est cor. Quare vt reliquarum facultatum, sic huius quoque principatum tener hoc membrum, cuius vicarij & administri sunt testes.

#### DE THORACE agendum esse.

#### CAPVT XVII.



thil est, quod in inferiori ventre consideretur amplius, siue ad se ipsum nutriendum, siue ad aliud procreandum ab optima & solertissima natura fabricatum. Nam quod de membranis conceptum in vtero factum inuoluentibus dici posset; cum non in omnibus, sed in prægnantibus duntaxat conspiciantur ea, minimè ad hunc locum pertinet: sed ad eum potius, in quo de procreatione fetusque formatione dicitur.

Itaque ad alteram illam corpus partem accedam, quam principio thoracem ventremvè mediù nominari dixi. Quamuis enim caput antea dissectandum videretur, quod cerebrum putrescat citius minusque conseruetur, longioris impatiens moræ. Commodius tamen est de thorace dicere. Primum quia corpus hoc loco velut animæ instrumentum consideratur, hæcque parte facultatis vitalis organa continentur, quæ ad vegetantem quoque animam, cuius superiora fuerunt, pertinent: neque est æquum ad sentientem transire, nisi fuerit illi omni ex parte satisfactum. Deinde quoniam, dùm thoracem agredimur, in choatum opus absoluiamus, ad quod post captis longam & eorum, quæ in eo sunt, considerationem im-

portunum  
Thorace.

portunum omnino fuerit redire. Dicitur est de organo procreationi dicatis, quibus tunc in utero concipiatur fetus, tunc intra uterum conceptus nutriatur. Consequens est & de illis dicere, quibus in lucem editus tandiu sustentetur, quousque mandere ac cibum sumere ipse poterit. Quamdiu utero quasi sepultus vivit, sanguine vescitur, quem umbilici venis & utero matris trahit. Inde in lucem prodians nutritur lacte, quod ex mamillis fugit. Ideo vituperis omnibus insunt, ouiparis non item: quoniam, ut est in cap. 11. libri quarti de partibus, lacteus ille cibum continetur in ovo. Ut quamvis mamilla inter organa generationi dicata minime numeranda sint, cum ad fetus gignendum nil conferant: ad ea tamen quoquo modo referantur, aut cum illis certe magnopere coniungantur; quippe fetus genito statim sunt cum primis necessariae. Et vero in homine quidem ea in thorace conspiciuntur; at in bestiis ferè in imo ventre, & quidè propè generationis loca consistunt. Quare si cetera hæc intuearis aut disseces animalia, de mamillis fuerit tibi in imo ventre dicendum. Quod si de illis in homine quoque dixeris, qui hoc loco præsertim consideratur, thoracis consideratione ingredieris. *Thoracis dicitur dicitur, quod est salire: quod cor in eo contentum perenni agitur motu & quasi saliat.*

## DE MAMILLIS.

## CAPVT XVIII.



*Sicut.* Amilla igitur seu mamma & vbeta in homine pars thoracis non sunt, sed exteriori ad ossis pectoris latera thoraci & inferiori parti muscoli brachium pectori admouentis ferè incumbunt. Quibusdam verò mulieribus ad medium pectus accedunt. *Figura.* Semiglobi figuram habent, nisi magnopere lacte redundant. Tunc enim eas propè dixeris integrum globum abluere. Papilla velut breuis quidam processus, quo suscepto lac infans fugat; medio loco infixa est. Hæc in virginibus rubet, liuet in lactantibus, in senibus nigricat. Glandosa & fungosa in feminis præsertim substantia constant, ad conficiendum & continendum lac perquam idonea. *Substantia.*

Inter glandes numeravit Hippocrates in libro de glandulis, eundemque usum præstare voluit & vniuersi corporis absorbere sordes. Quare, inquit, si morbus aut calamitas alia mulieribus mammas adimat, vox ipsarum asperior redditur, & humores in gulam feruntur, & multò vexantur sputo, & caput dolent, & ab his ægrotant. Sed non tam glandes sunt, quam glandosa corpora: sicut & renes & testes. Duo hæc namque glandium genera distinxit quoque Galenus in 16. de vsu partium libro cap. 2. quædam excipiendis excrementis, rigandis partibus, sulciendis vasis dicata sunt: alia succis quoque vitilibus gignendis comparata: illæ glandes propriè sunt, hæc glandosa potiùs corpora.

*vsu.* Itaque si superfluum & noxium excipiant humorem mamma, secundarius is est vsus; propria

**A** verò actio lac bonum gignere. Multò vbiq; referta sunt adipe, venis plurimis, arterijs perpaucis ac neruis intexta. Venæ ab axillam partim accedunt; partim ab ea; quæ per summum ducitur humerum: aut etiam ex illis, quæ per iugulum descendunt ad pectus. Hæc namque omnes pectoris musculus & cuti infertæ ad mamillas perueniunt longo nimirum ductu, quemadmodum in cap. 10. & indicati libri obseruauit Galenus, ut diuturniore mora & consuetudine conferente vale perfecta fieret sanguinis coctio, quam lactis natura postulabat. In bestiis verò, quibus hæc in inferiori ventre sunt, ex duobus illis ducuntur truncis, qui descendunt in crura. Quæ enim peritonium perforant, sursum vtrinque ratham ad abdominis musculos mittunt, qui mamillas quoque ingrediuntur. Venas nonnullas, sed obscuras ac repertu difficiles comitatur arteria. Nervi à subiectis musculus porriguntur. At papilla potissimum ex 4. ferè costarum interuallo insignior offertur: ut vehementiore ibi sensu posito præptiores essent matres ad lac præbendū infantibus. Delectatione scilicet allecta; quam tenellorum infantis laborum & linguæ contactu essent persensura. Cutis quoque hæc ob causam ibi tenuior.

**B** Sanguis ad mamillas ductus mutatur in lac, tum à propria glandosa illius substantia virtute; sicut de testibus semen, icorèque sanguinem elaborantibus antea dictum est: tum verò à perenni thoracis motu; quo magnopere concutitur & calefcit: ac demum à vehementi proximi cordis calore. Quæ fortasse est causa, cur perpaucæ & obscuræ illæ ducantur arteriæ. Vix enim corde tam propinquo opus eis erat. Atque hic est præcipuus mamillarum vsus, lactis generatio infantiumque nutritio. Quam ob causam non magnopere maribus, sed magis fœminis; nec paruulis ad gestandum fetus inceptis, sed grandioribus ad præcreandum aptis turgescunt & attolluntur; quorum facta sunt ostendentes. Et in matribus item, cum primùm pubescunt & semen emittunt, non nihil exurgunt & grandiores fiunt.

**C** Cur autem in pectore homini, bestiis non item, præterquam simia hominis fortasse annula (Aristoteles in 2. historia libro cap. 1. soli homini dixit) condite fuerint; duè in quarto libro de partibus cap. 10. extant rationes. Altera; quod homo latum & amplum habeat pectus; bestia angustum & acutum inter crura, quibus incedunt. Altera; ut cordi operimentum essent & propugnaculum. Prior sanè optima est: maximum enim inces sui impedimentum bestiis attulissent. Posterior idcirco non parum suspecta, quod si cor tegere & propugnare voluisset natura, non lateribus, sed medio apposuisset pectori: cumque tegmen adesset & propugnaculum ossium, durum, & robustum; quid opus erat carneo, infirmo & imbecillo? Alias ego rationes subijcerem. Primam, quod copiosissimus eo per thoracis vasa insluit sanguis ad lactis generationem. Alteram; quod cum erecta homo sit statura, in infimo ventre fuissent illi nimis molestæ, tum gestatu, tum vsu. Quo enim modo lactarentur infantes? Nec ferret humanus pudor nudata pudenda; nec incòmodus lactatus tolleretur. At dum ex pectore pendent, gestantur sine molestia, & abest pudor. Neque fœtilli animalis

manibusque vltro locus opportunior aut commodior vllus erat. Tertiam; quod si in imo fuissent ventre, tūm concubitus, tūm incessus, difficiliores extitissent: in pectore nec amplexum nec vllum brachiorum vsū impediunt; nec verò ad venerem parūm alliciunt; &, vt habet Plutarchus in libello de amore prolis, potest mater simul & filium alere, & amplecti & osculari, adde & gestare. Accedebat & illud non leue emolumentum, quod thoracis motu cordisque propinquo calore generatio lactis non parūm promouebatur. Denique eo loco posita non paruo futuræ erant humano corpori ornamento: quod tūm in maribus, tūm in feminis manifestum est.

*Numerus.* Tam cur homini & animalibus permultis binæ sint, alijs multo plures; ratio est partus alendi paucitas aut multitudo. Illarum autem vna est dextra altera sinistra; harum vnus ordo in dextro, alter in sinistro latere, vt in canibus & suis. Aut quoniam, vt Aristoteles tradidit, binæ sunt corporis partes, dextra & sinistra; organaque omnia bipartitò diuisa. Aut quoniam, vt significauit Galenus in 14. libro de vsu partium cap. 4. alendi atque educandi foetus instrumenta æquum est ijs respondere, quæ procreationis fuerunt: duobus inquam testibus duplicique vteri sinui duas aut certe duplici serie dispositas mamillas.

*Tamen.* Quare cum vtero hæ quoque crescunt: & puellis perexiguæ sunt & vix vllæ: grandioribus ad pariendum aptis, quemadmodum ad libidinem vterus incitatur, sic attolluntur mamillæ; verū compactæ & ferè absque lacte duriusculæ: hincque etatem ad coitum accommodatam voluit Aristoteles in quinto & septimo de historia & quarto de procreatione in feminis cognosci; vt in maribus ex testibus, mutatione vocis, & pubescentia. At suscepto femine si conceperint, quæ ratione sensim magis ac magis exurgit vterus crescente foetu; eadem turgescunt illæ ac lacte magis implentur: maximè que cernuntur & mamillæ & vterus, vbi perfecto foetu pariendi tempus aduenit. Quod sanè ex admirabili partium harum consensu prouenit: instinctuque naturæ, quæ ad eundem finem, hoc est propter foetum ac sobolem extruxit vtramque: non autem, vt in cap. 8. eiusdem libri conatus est explicare Galenus, propter easdem venas, quæ tum ad vterum, tum ad mamillas deducantur. Neque enim rem ita habere dissectio manifestat. Sicut & necessaria persuadet ratio minime fieri posse id, quod in septimo de historia cap. 11. affirmatum est ab Aristotele; vt pilum in poculo fortasse haustum mamillis reddat mulier. Etenim non solum per tot tamque angustos meatus nequit is duci: verū etiam tam accuratas coctiones, quæ in ventriculo & icore sunt extrematæque fecernunt omnia, noxia hæc & excrementosa substantia non euaderet; neque cum vtili alimento traduceretur atque à venis alliceretur.

## DE LACTE.

## CAPVT XIX.

*Lact quid.* Ac verò mamillis contentum in earum consideratione prætermittendum non est. Excrementi vtilis genus est hoc, vt & semen & sanguis menstruus. Quæ excrementa vocantur, quod animali, in quo sunt, superflua sint, atque ex redundante materia consistunt. Vitia tamen alteri sunt conseruanda que ac propaganda speciei necessaria. Semen inquam & menstruus sanguis gignendæ, lac educandæ soboli. Lactis, inquit, Philosophus in 4. libro de animalium procreatione cap. 8. naturam eandem esse quam excrementi, ex quo vnumquodque gignatur, apertum est. Eadem enim materia est, quæ alit & ex qua procreationem natura constituit: eaque sanguinis humor in sanguinem habentibus est. Lac enim sanguis coctus est, non corruptus. Propterea paulò post subiungit. Nec lactantibus sunt purgationes menstruæ, neque lactantes concipiunt; etsi conceperint, lac extinguitur: quoniam eadem lactis & menstruum natura est. Natura autem non tam largè profunderè potest, vt anceps sit: sed si alterutram in partem fecernitur, in alteram desit necesse est, nisi quid violentum acciderit.

*Lact quid.* Ex his tamen non licet statim colligere, in ijs omnibus reperiri lac, in quibus est semen aut menstruus sanguis. Quoniam tum in eodem loco, tum pluribus multò in cap. 20. lib. 3. de historia in hanc sententiam loquitur idem ipse Philosophus. Quæ lac habent omnia, mamillis id continent. Mamma autem ijs data sunt, quæ animal & intra se concipiunt, & in lucem edunt. At ea, quæ oua pariunt, aut ouo intus concepto animal post in lucem excludunt; hæc & mamillis carent & lacte; vt pisces & aues. Deinde in maribus abundat semen, lac ferè non gignitur.

*An mamilla.* Quamquam tum eodem in loco Philosophus, tum in cap. 12. libri primi in ijs quoque affirmet gigni interdum posse. Quippè tum in Lemno insula capro ex mamillis tantum lactis emunctum fuisse scribit, vt colostrum inde conficerentur. Tum etiam viris post pubem nonnullis exiguum expressum fuisse, perque suctum frequentiore aliquibus vel multum prodijisse commemorat: nec semel se comperisse Andream Vesalius testatur in lib. 5. cap. 8. & Hieronymus Cardanus in 12. libro de subtilitate, Antonium quendam Benzum narrat trigessimum quartum agentem annum, ex cuius mamillis tantum profuxerit lactis, vt infantem ferè lactare posset: nec effluxisse modò, sed impulsa prorupisse. Neque multò antè ex viris fide dignis accepimus viros in Brasilia tantum habere lactis, vt ipsimet suas alant proles. Quod videri mirum non debet. Siquidem eodem modo mas, quo femina, mamillas habet glandosa constantes substantia ad continendum coquendumque lac aprissima, & Americus quintus rex Hierusalem non minores, quam feminas dicitur, habuisse mamma. Sed femina, vt Hippocrates habet in li. de Natura pueri, & in lib. de glandibus, & Arist. in 1. de hist. cap. 12. rariorem habet,

habet, fungosam magis & foraminolentam mammaram substantiam, mas spissam magis ac densam: quare copiosior materiam feminine, quam mas, suscipere & continere potest.

*Quo tempore gignatur.*  
 Quod verò ab eodem Hippocrate proditum legimus in eodem libro de natura pueri, lac in mammillis gigni quo tempore fetus in utero moueri incipit: quoniam grandiore factò foetu magisque utero turgescente comprimitur venter & ad mammillas sanguis repellitur: ita fuerit accipiendum, ut non tunc primum gigni, sed copiosior materiam intelligamus. Hoc enim & proposita in superiori capite persuadet ratio, & natura finis reitatur. Nam & tempus accedit partus, quo extra uterum nutriendum erit fetus: & is humor, qui potuisset in lac conuerti, in fetus formatione antea absumebatur. Alioqui sagax & prouida natura factu statim concepto tum materiam ad mammillas submittere, tum lac coquere agreditur: ut sensim & cum minori parturientis mutatione fetus necessitati prospiciat. Quin virginibus quoque, si modò ætas ad viri complexum opportuna aduenierit, attolli mamillæ, ac sensim turgere conspiciuntur: ceteri minus adhuc perfectum lac esse credendum est. Sed & in maribus item lac dictum est gigni posse: & omnino ætate ad speciem propagandam idonea tum mari semen gignitur, tum feminæ menstruum & lac: illis turgescunt testes, his mamillæ, pruritque uterus.

*Optimum infans nutritum.*  
 Optimum verò & maxime opportunum infantibus recens natis lac præbet nutrimentum. Quippè cum in utero versarentur, sanguine semper sustentabantur, ex sanguine autem non nihil in mammillis mutato existit lac. Ità sensim natura progreditur. Ex sanguine formatus fetus sanguine primum nutritur & crescit: deinde sanguine non nihil mutato ad aliud magis diuersum ac solidum nutrimentum traducitur. Quod si quis obijciat humidissimæ illi constitutioni tam humidum alimentum non conuenire: quippè humidiores naturæ siccandæ potius videntur; sicut & sicciore humectari, & frigidiores calefieri, calidiorisque refrigerari oportet; & omnino contrariorum contraria solent esse remedia: Prudenter respondet Galenus in primo libro de sanitate tuenda capite septimo, adfertque Hippocratis sententiam in 7. Aphorismo libri primi. Victus humidi febricitibus omnibus conferunt: maxime verò pueris & alijs ita aliadfectis. Tria namque complexus est, morbum, ætatem, assuetudinem. Morbus contrario curandus est, ætas & assuetudo simili fouenda & sustentanda: contraria namque obessent plurimum nimaque mutatione perturbarent. Neque in pueris siccandus humor est, quo sustentatur natura totiusque vitæ momentum est. Cum præsertim tenella ætas & imbecilla molli & humido assueta cibo durum & siccum nec toleraret nec conficeret. Itaque in his tum ætas tum assuetudo conueniunt. Et omnino quæ corpora benè & secundum naturam se habent, ipsæ conseruari oportet.

*Matris lac optimum.*  
 Propterea omnium optimum in fante lac matris fuerit, modò morbo vilo vitiatum non sit. Indè namque & ortus primordia accepit & huic alimentum iam multo tempore assuevit in utero: estque illi maternum lac tum proprium, tum assuetum alimentum.

*Tres lactis substantie.*  
 Denique tres in lacte continentur substantie: pinguior vna, tenuior & aërea, omnium optima: altera crassior & magis terrea: tertia potius aquea. Prima butyrum est, altera caseus, tertia serum, quod dilutam laniam appellauit Philosophus.

## DE THORACIS ossibus.

### CAPVT XX.

*Thorax est medius in corpore.*  
*Thorax est pars ossis, partim carnis.*  
**T** Am verò de thorace ipso mammillis subiecto dicendum est. Is inter caput & inferiorem ventrem medius est: non solum situ inter superiora & os pubis, inter caput & abdomen: quam ob causam tutissimo loco positus est propter cordis conseruationem, cui totus dicitur, quippè nil aliud, quam cum pulmonibus, continet. Verùm compositio quoque ac natura. Neque enim osseus totus est, quemadmodum caput, neque prorsus carnis, ut inferior venter: sed osseus partim, partim carnis. Optimèque videtur natura tum à durissima & planè ossæ parte ad mollissimam & carneam totam non subito, sed sensim descendisse, aut ab hac contrà ad illam ascendisse. Tum verò etiam cordi optimè prospexisse, cui minus fuisset prospectum, si aut osse toto aut toto carneo loco fuisset positum. Osseus extendi non potuisset & comprimi respirando, ut illius membri refrigeratio postulabat. Et carnis minus fuisset tutus: neque cavitatem illam effecisset, in qua liberè pulmones attolli oportebat. Sed & aliquid firmum esse oportuit, cui scapulæ & brachia musculique tum ad brachia tum ad abdomen pertinentes alligarentur.

*Thoracis descriptio.*  
**L**ocus igitur primum describendus est: tum ea, quæ loco continentur, inspicienda. Locus tum superiore tum inferiore & media parte distinguitur. Superior est furecula, cui collum insidet: duæque in clauas diuiditur, quibus totidem subiacent iuguli, dexter & sinister. Media tum sternum habet & costas, tum plurimos adiunctos musculos. Infima demum initar fundi musculus ille est magnus, latus & rotundus, quem *diaphragma* seu transfuersum septum nominamus. Cum igitur totus thorax partim ossibus constet partim musculis, accuratè satis & optima methodo fuerit de illo dictum, si ossa primum seorsim, quibus applicantur musculi, deinde musculos singulos descriperimus.

*Thoracis ossa.*  
**O**ssibus thorax constat triplicis generis. Primum enim velut basis atque totius ædificij fundamentum duodecim ferè dorsæ spinæ subternuntur vertebræ. Deinde ex harum singulis producuntur singulique inferuntur costæ; quæ non rectæ, sed curuæ & arcus forma, ut capacitatem cordi ac pulmonibus necessariam deseribât, utrinque ascendunt. Quare ex duodecim vertebris duodecim item ferè utrinque existunt costæ: interdum etiam tredecim aut perrarò vndecim: quotque numerantur costæ, totidem quibus insistant, vertebras esse necesse est. Superiores septem perfectæ sunt & absolutæ (octo numerauit Philosophus in primo historiae libro cap. 15.

in ijs fortasse, qui tredecim haberent, maximumque posuit numerum, qui esse possent) quæ singulis sterni pectoris ossibus insertæ integrum abfoluunt ambitum: ideoque perfectè, germana, vera, ac legitima nominantur. *Septem* autem, id est, quod pectus appellare consueuimus, septemque ferè ossibus constat, in bestijs plerisque Isoscelis trianguli à fergula descendens, in homine manubrij ensis figura, extremitatèsq; costarum cartilagine interposita ex utroque excipiunt latere. Neque temerè cartilaginea hæc insertio adhibita est: sed ut ossium duritate interrupta facilius, & promptius thoracis motui obsequerentur costæ.

Sternum,

Xiphoides cartilago.

Costæ spuria.

Infirmæ porò sterni parti productior adhaerescit cartilago, quæ cum velut gladius & mucro exagatur, *Xiphoides*, id est, ensiformis & mucronata, vulgò malum granatum, à Galeno in libro de ossibus cap. 13. triangula, nominatur: estque diaphragmati & stomacho scutum & propugnaculum.

At quinque reliquæ inferiores costæ propterea, *Costæ spuria*, adulterine, spurie, & illegitimè dicuntur, quòd imperfectè sint, neque abfoluant ambitum, neque articulentur pectori: sed in thoracis desinant latera extremitateque cartilagine inuicem coniungantur; vltima solùm excepta, quam verè notham appelles, quòd nulli prorsus adhaereat.

Singulas verò costas velim obserues non vbi que sibi similes esse. Nam cum primùm ex vertebriis prodeunt, angustiores & subrotundè visuntur, nisi quòd finem quandam seu canalem continent, quo venam ab *Arteria* ducta & arteriam ab aorta neruùmque à spinali medulla suscipiunt: deinde latefcunt sensim, postremò angustantur rursum. Atque propè vertebrae solidiores sunt ac duriores; crasso nimirum & solido ossi velut aliorum basi propinqua: & cartilago item spuriarum minus dura & crassa, quàm legitimarum est: & quarundam productior, quàm aliarum. Ac demùm non vbi que æquè apparent laues: sed parte illa, cui inter costales inserantur muscoli, asperiores; vt facilius ac tenacius insertio fiat. Immo & in extima, minus quàm in intima parte sentiuntur laues. Neque plura in thorace ossa considerantur.

## DE THORACIS

## Musculis.

## CAPVT XXI.



Am verò his ossibus plerumque inserantur muscoli: & vt eos mittam, qui brachijs & scapulis mouendis dicati sunt; quia etiam inserantur thoraci, cum tamen non ad eum, sed ad alias partes mouendas referantur; proprij non sunt thoracis: quin extrà ipsum considerantur atque ad artus pertinent. Et eos item, qui ad abdomen descendunt, thoracique inserti eum quoque non nihil detrahunt: quoniam de his in abdominis descriptione dictum est. Qui proprie ad thoracem pertinent, partim distendendo, partim contrahendo dicati sunt. Scio nec ho-

Musculi desinentes.

rum anatomicos omnes eundem inire numerum. Sed primus ille sit, qui ab anteriore iugulo sub clausis ortus obliquè ad supremam attollendam costam descendit. Secundus ex interiore scapulae basi ad sex aut septem vel etià nouem superiores costas feratim progrediens. Tertius ex tribus ceruicis & prima thoracis spinis prodians tribus superiorum quatuor costarum interuallis insertus. Quartus ab inferioribus dorsi lumborumque superioribus spinis ad tres quatuorue inferiores ductus costas. Ita distendendo thoraci studiosè natura partibus illius costisque singulis, tum superioribus, tum inferioribus, exteriores musculos applicauit; quibus tum sacrum, tum deorsum tractus promptè ac plurimum distenderetur.

Pauciores adhibuit contrahendo; quòd inter ipsas costas & infra eas vis alia contrahens, vt mox ostendam, continebatur. Contrahit autem tum triangularis vnus in anteriori pectoris regione ab inferiore interna sterni parte longis duobus lateribus sursum progrediens; costarumque cartilaginibus adnatus costas ad pectoris os contrahit. Tum alter, qui ab osse sacro ac lumborum vertebriis ortum accipiens, etiam dorsi musculus permisceatur, tandem tamen in costas penè omnes duplici desinit tendone costisque deorsum trahit & comprimit.

Diceres toti huic operi fati fuisse prouisum. At diuturno nunquamque per omnem vitam intermittendo operi plures fuerunt ad mouendæ machinæ. Inter duodecim costas vndecim continentur spatia: hæc ita impleuit sapiens natura, tamque admirabili arte superiores & inferiores colligauit costas, vt duplicem distinxerit ordinem musculorum; qui ex loco, quem occuparunt, *Musculi thoracis* & intercostales dicati sint. Singulis namque costis bini per totam earum longitudinem alligantur; vnus exterior, alter interior. Exterior ex inferiori superioris costæ parte ad inferioris superiorem obliquè anteriorum producit: contra interior ex superiori costæ inferioris regione ad superioris inferiorem obliquè item ad priora fertur, exteriorè que vbi que deussarim & ad modum litteræ *X* interfecat. Ita vndecim illis vtrinque costarum interuallis musculus duplicatis, duo & viginti in latere vnoquoque, quatuor & quadraginta omnino inter costales existunt muscoli: omnes extendendo & contrahendo thoraci, hoc est inspirationi & expirationi famulari creduntur.

Qua in re haud fati constantem Galenum reperias. Quippe in 2. libro de musculorum motu cap. 9. externos inspirationi, internos expirationi: & mox in libro de causis respirationis, externos expirationi, internos inspirationi dixit famulari; dum aut thoracem stringunt aut laxant. Vtrumque mihi quidem cerè suspectum est; & cuius poteris esse, qui certum illud effatum suscipiat: Musculum vnumquemque mouere trahendo ad suum principium. Intelliget namque tum externos tum internos illos iunctis viribus contrahere costas, stringendòq; thoracem expirationi seruire, inspirationi autem non trahendo, sed laxando. Neque enim fieri potest, vt musculus, siue interior siue exterior, trahendo deducat ab inuicem costas, quibus infixus est. Eas potius coniungit: & exterior quidem inferiorem costam ad superiorem

Musculi trahentes.

Musculi thoracis.

Galeni inconstans.

Horum musculari visus.

superiorem adducit, & interior item superiorem ad inferiorem. Ideo bini fuerunt apposti. Et quam tandem sit causa, cur decussatum sese interfecerit? Si ad oppositum contractionis & distensionis efficiendum motum parentur, communis nimirum illa intersectio plurimum oberit, operationemque tantoperè necessariam retardabit. At instrumentorum copulatio & coitio communis est operationis argumentum quam certam maximè, constantem, ac diuturnam esse oportebat.

Alterum eiusdem rei argumentum est, quòd plures multò musculi externi thoraci attollendo ac distendendo, quam contrahendo, conspiciantur dicati singulos non multò antè commemorauimus. Huic igitur imbecillitati contrahendi duobus modis subuenit natura. Primum intercostales illos, plurimos quidem, sed exiles ac tenues, inferendo. Deinde infimam thoracis partem & quasi fundo amplum illum & rotundum musculum subijciendo, quem Diaphragma nominamus.

Diaphragma.

*Opis* vocarunt Hippocrates alijque veteres, hoc est mentem: non quòd sapientiam particeps sit aut ad sapientiam quidquam conferat: hoc enim idem ipse irrisit Hippocrates in libro de morbo sacro: neque enim ego, inquit, noui quam vim habeat *opis*, vt sapiant & intelligant. Sed potius quòd propter admirabilem membri huius cum cerebro consensum co laeso læditur mens; vt in 5. libro de locis affectis cap. 4. interpretatur Galenus. Inflammatum quippè delirium mentis adfert, & interdum perpetuum quòdque non procul à phrenitide ablit. In cordis vicinitatem maluit Aristoteles referre in 3. de fact. cap. 10. cor enim sensus principium est, sensusque turbatur mens. Nos transuerlum septum, quòd velut interiectus paries superiorem hanc partem, qua continetur cor, ab inferiori ventre; & omnino facultatem vitalem à naturali separet; & vt Galenus ex Platone loquitur, irascentem, qua est in corde, ab appetente, qua in iecore residet. Habent hoc (inquit Aristoteles) omnia, qua sanguinem habent, aequè vt cor & iecur, cuius rei causa est, vt sedem ventris à corde dirimat, & animæ sentientis origo inoffensa seruetur: nec facile occupatur exhalatione cibi & caloris aduentitij copia.

Hac enim causa natura interceptit, præcordiorum quasi parietis sepiusque interuentu: distinxitque partem nobiliorem ab ignobiliori. Quòd in medio musculi visitur membraneum & nerueum (habet autem à quinta & sexta colli vertebra neruos) velut illius caput est & principium mouendi vi præditum: quòd illius peculiare est. Inde in orbem carne intermissa extenditur velut ad corpus & ventrem musculi: finis verò est tum in xiphoidæ cartilagine, tum in spurijs costis primæque lumborum vertebra. Ita obliquum & decliuum habet situm, dum spurias costas insequitur, atque à pectore ad lumbos descendit. Xiphoidis tamen costarum uè extremitatibus non inseritur, sed interiori earum parti; vt factò quasi propugnaculo tutiorem haberet locum.

**A** Triplex profus est illius vsus. Tum cor vitalemque partem puriorem à naturali & sordida separet. Hoc enim & cordis dignitas & purissimi spiritus generatio postulabat: nè crassis ciborum exhalationibus inquinaretur spiritus, cordisque infestaretur quies. Tum communi muscularum vsu partes, quibus inseritur, mouere; contractioneque ac laxatione thoracis, respirationis motum iuuare. Quam ob causam, si plus aequo replearis cibo, difficilior est respiratione thoracis motus. Turgescente namque ventre minùs potest contrahi thorax, musculisque inter ventrem seu iecur & pulmones compressus minùs mouet. Tum verò excrementorum alui eiectionem iuuare: non solum contractione sui, sed & illa ipsa obliquitate ventrem & intestina comprimendo. Itaque in respirationis quoque motu expirationem per se ac primario vsu facit, secundario inspirationem quoque. Propria enim & primaria illius actio est contractio, qua ad caput musculi trahuntur adiunctæ costæ thoracique ad fundum contracto pellitur sursum inspiratus aër, fumidæque eicitur exhalatio. Secundaria verò laxatio, vt rursus contrahatur. Qua in re simul agunt diaphragma & intercostales musculi: iunctis inquam viribus thoracem contrahunt & expirationem faciunt, hisque mox laxatis attollitur thorax ab ijs musculis, quos distendendo dicatos esse dicebamus; & nouus inspiratur aër. Sanè in animali mortuo diaphragma sursum contractum cernitur: quòd, cum vita expiratione cesset, argumento est contractionem expirationem facere, hancque primariam thoracis actionem esse.

**B** Ita respirationi vnus & quinquaginta præter eos, qui abdominis sunt, musculi famulantur. Inspirationi quatuor antea significati, & expirationi septem & quadraginta, triangularis & alter antea indicatus, quatuor & quadraginta inter costales, ac demùm diaphragma. Neque mireris plures multò expirationi, quam inspirationi, famulantes: siquidem & illi ipsi secundario famulatu inspirationi quoque seruiunt. Et difficilior multò thoracis contractio est, quam dilatatio. Contractus namque præter naturam comprimitur, laxatus ad suum ferè statum redit.

**C** Scio tum veteres tum recentiores anatomicos plures commemorare musculos, secusque eorum officia partiri. Sed nec ego plures in homine repetio; illos præsertim inter cartilagineos viginti quatuor, quos nominant: nec officia partiri secus ratio permittit.

**D** In diaphragmate duo præterea obseruabis. Alterum tribus hunc musculum foraminibus patere: quibus triplici vasorum generi transitum præbere debuit; œsophaco, magnæ arteriæ, & venæ Cavae. Quamquam duo priora hinc inde spinæ vertebra adiacentia vnus dixeris amplum trianguli figura foramen facere, cuius basis in spina. Alterum, duabus illum membranis obtegit: altera inferiori, qua ad peritoneum pertinet qua parte ventrem & iecur spectat: altera, qua ad succingentem costas, superiori; qua cor & pulmones respicit.

**E** In diaphragmate duo præterea obseruabis. Alterum tribus hunc musculum foraminibus patere: quibus triplici vasorum generi transitum præbere debuit; œsophaco, magnæ arteriæ, & venæ Cavae. Quamquam duo priora hinc inde spinæ vertebra adiacentia vnus dixeris amplum trianguli figura foramen facere, cuius basis in spina. Alterum, duabus illum membranis obtegit: altera inferiori, qua ad peritoneum pertinet qua parte ventrem & iecur spectat: altera, qua ad succingentem costas, superiori; qua cor & pulmones respicit.

**F** In diaphragmate duo præterea obseruabis. Alterum tribus hunc musculum foraminibus patere: quibus triplici vasorum generi transitum præbere debuit; œsophaco, magnæ arteriæ, & venæ Cavae. Quamquam duo priora hinc inde spinæ vertebra adiacentia vnus dixeris amplum trianguli figura foramen facere, cuius basis in spina. Alterum, duabus illum membranis obtegit: altera inferiori, qua ad peritoneum pertinet qua parte ventrem & iecur spectat: altera, qua ad succingentem costas, superiori; qua cor & pulmones respicit.

**G** In diaphragmate duo præterea obseruabis. Alterum tribus hunc musculum foraminibus patere: quibus triplici vasorum generi transitum præbere debuit; œsophaco, magnæ arteriæ, & venæ Cavae. Quamquam duo priora hinc inde spinæ vertebra adiacentia vnus dixeris amplum trianguli figura foramen facere, cuius basis in spina. Alterum, duabus illum membranis obtegit: altera inferiori, qua ad peritoneum pertinet qua parte ventrem & iecur spectat: altera, qua ad succingentem costas, superiori; qua cor & pulmones respicit.

**H** In diaphragmate duo præterea obseruabis. Alterum tribus hunc musculum foraminibus patere: quibus triplici vasorum generi transitum præbere debuit; œsophaco, magnæ arteriæ, & venæ Cavae. Quamquam duo priora hinc inde spinæ vertebra adiacentia vnus dixeris amplum trianguli figura foramen facere, cuius basis in spina. Alterum, duabus illum membranis obtegit: altera inferiori, qua ad peritoneum pertinet qua parte ventrem & iecur spectat: altera, qua ad succingentem costas, superiori; qua cor & pulmones respicit.

DE MEMBRANIS SVCCIN-  
gente & intersepiente costis.

## CAPVT XXII.

Natura  
vbiq. sibi  
similis.

Bique sibi similis, vel in maxima rerum varietate ac dissimilitudine, natura est. Inferiorem ventrem peritoneo totum obduxit, quo & naturalia organa omnia ibi posita continerentur, & singulis singula conuoluerentur membranis. Idem praeterea in thorace. Totum enim ampla item obduxit membrana costis omnibus pectori, superiori que diaphragmatis regioni subtenfa, quam propterea succingentem costas vocamus, partesque omnes thorace contentas amplectitur. Graecis *σφραγίς* & *μμβία* dicitur: indeque morbus pleuritis nominatus, cui inter eam & costas quispiam intercipitur humor. Eadem illius, quae thoracis cauitatis figura est substantia tenuis, sed omnino firma, qualis & peritonei: quam aegre omnino a partibus separe, quibus adhaeret.

Succingens  
membrana.

Triplex illius est vsus: tum omnibus thorace contentis commune inuolucrum esse: tum proprias tunicas partibus omnibus ibi contentis subministrare, eaque firmare & colligare; non solum cor & pulmones, sed oesophagum, magnam arteriam & asperam, venamque azygos. Tum esse pulmonibus instar subferniculii; atque cauere, ne cum perrara & molli substantia content, ab ossium duritate laedantur, dum in inspiratione distenti in costas incurrunt. Tum vero prohibere, ne dum mouentur pulmones costarum spatij influent sese.

Propterea laeuis prorsus est interior illius superficies, vt benignus pulmonum contactus sit: & a quo quasi humore perfusa, propter plurimam contentorum membrorum euaporationem. Exterior autem asperior; vt ijs, quibus obducitur, partibus firmiter adhaerescat. Venas habet ab azygo, arterias a magno trunco, neruos a sexto pari & spinæ vertebris: ex quarum vinculis præcipuam habet originem: & id circa illam dorsi regionem crassior & durior, quam circa pectus, est.

Interse-  
pientes  
duæ.

Paulò autem tenuiores duæ illæ membranæ sunt, quæ in medio thorace cõspiciuntur appensa, vertebrisque spinæ retrosum, ossi pectoris medio antrosum, clauibus sursum, & xiphoidi cartilagini ac diaphragmati deorsum insertæ. Quas siue ex succingente exortas omnibus ijs in locis, in quibus ipsi iunguntur, siue illius partes ex spina ad pectus exportectas esse dixeris, nõ morabor. Sanè corde solo inter eas intercluso mediòq. in thorace appenso, duas in partes, dextram & sinistram, thorax vniuersus diuiditur. Quam ob causam *σφραγίς* Graeci dixerunt, nos intersepientes, inter se iudentesue membranas aut mediastinum nominamus.

Duplex est illarum vsus. Alter firmare cor, ne huic illucue impellatur atque in latera collabatur: sed certam in medio animalis teneat sedem. Alter thoracem totum bipartitò diuidere, vt si lateris vnum vulneretur aut alio quouis modo aperiatur ac refrigeretur, non cesset illico respiratio & pulmonum motus, pereatque animal: sed alterum lateris illesum & clausum atque ad respirandum ido-

A neum sit. Quòd tum in vulneratis hominibus, tum in viuis aliorum animalium sectionibus apparet.

DE PERICARDIO, CORDIS QVÆ  
sua & substantia.

## CAPVT XXIII.



Horacem vniuersum, qualem hactenus descripsimus, cordi principi ac regio mēbro, tanquam tutissimam optimeque omni ex parte munitam in medio animalis arcem, Natura poluit. Verum & in ipso thorace tutissimum atque ab omnibus, quæ noxam extrinsecus inferre possent, remotissimum locum occupauit cor. Illius quippe basis (est enim pyramidalis turbinatae figuræ, quæ ad illius membri motum maximè fuit oportuna: ferè tamen sphericæ, præsertim cum attollitur, quo spiritus capaciorest & firmiter) medium thoracis occupat, tantumdemque a pectore & spina, à iugulo & diaphragmate, a dextris & sinistris costis distat. Mactone tamen in anteriora & sinistra declinat, vt manus lateri sinistro intri papillam a nota testatur. In anteriora quidem, & propter partis illius nobilitatem, ad quam, vt in 3. de partibus lib. cap. 4. ratio citatur Philosophus, æquum est nobilissimum membrum accedere: & quoniam pectus ferè ex carne frigidius, quam dorsum, fuit set: & vt ea pars, in quam fit animalis motus, calidior euaderet. In sinistra verò; tum quia descendens Caua infixa iecori propter membri huius pedus basim cordis non nihil ad dextra detrahentur mucronem eleuat ad sinistra. Acciditque perbellè: tum vt basi ad dextra quoquo modo declinata sanguinem gignendo spiritui necessarium ex iecore commodius susciperet: tum etiam vt iecoris ad dextra magis accedentis situs utcumque in sinistris compensaretur frigidiorique parti calor apponeretur.

Cor vni-  
uersum  
mēbro  
suum.Cordis  
sua &  
sua.

Omninò membrum hoc caloris & spiritus officina est; vitalique virtutis, propter quem extructus est thorax; sedes ac domicilium. Eam in medio collocare oportuit, vt partes omnes foueret, omnes æquè irrigaret, subueniretque omnibus. Quiddid præter hoc membrum in thorace reperias, ascititium est & adiunctum: atque ad cordis conseruationem aut actionem exequentiam pertinet. Ad conseruationem pulmones pertinent asperaque arteria: hæc adducit aërem, quo refrigeretur cor; illi suo motu velut flabellum æstuantem calorem ventilant. Ad muneris autem executionem vena Caua comportans sanguinem, ex quo gignatur spiritus; & arteria aorta genitum illum distribuens per totum corpus.

Thorax  
sua.

Illud omni admiratione dignum, quòd huic membro, ex quo animalis vita tota pendeat, tam sedulo natura prouidit: vt nec in tam munito loco nudum & omni alio præsidio destitutum condendum duxerit: sed membrana quoque inuoluit firmissima, quam *περικαρδιον* propterea nominant, quòd velut capitula & inuolucrum cordi, quòd Graecis *καρδια* dicitur, obducta

Pericard.

ducta sit. Hippocrates <sup>ἡράκλειος</sup>, id est, vaginam dixit: Oritur ex vasorum quatuor venarum Ca-  
 30. Ferno-  
 10. l. 1. c.  
 13.  
 13.  
 Humor  
 pericardii  
 enciasus.  
 Cordis  
 palpita-  
 tio.  
 Vnde in  
 humor.  
 Cordis fi-  
 gura.  
 Substan-  
 tia.  
 Alimenti.

arteria magna, venarum arterialis, & arteriarum venalis membranarum. Et si ex ima potius membranarum dissepientis parte quibusdam placuit. Indè sensim descendens ita cor totum amplectitur, ut illius figuram imitata tandem in mucronem definat. Cordi tamen proximè non incumbens: verum aliquantò amplior tantòque distans intervallo, quantum cordis postulat dilatatio.

Et ne frustra quidquam videretur egisse natura, serosum & aquarum, aut vrinę persimilem includit humorem, quo perpetuò maderet cor illiusque calor temperaretur: & velut innatas cor minus graue animal foret. Hic est vnus pericardij vsus. Alter, ne quid perenni pulmonum appulsu atque incursum pateretur cor. Est enim velut aduersus pulmonum incursum optimum propugnaculum; tantò pulmonibus durius, quanto mollius osse. Porro is humor si copiosior, quam par est, euadat, palpitationem cordis facit; vt Galenus docet in 5. libro de locis affectis ca. 2. Quam graeci <sup>περὶ καρδίας</sup> vocant. Impedit enim, ne cor liberè attollatur. Quo argumento illi conuinci possunt, qui in viuentibus animalibus humorem hunc contineri negant, in mortuis autem exolutò cordis calore vapores in aquam densari aiunt. Cùm præsertim tam breui tempore mutatio tanta fieri nequeat. Et si viuentia libeat dissecare, in omnibus humor conspicitur. Et Hippocrates in libro de corde cor in vesica scriptis diuersari; siue is humor vt serum ex quatuor vasorum exudet tunica: siue ex cordis vaporibus frigore membranarum densatis gignatur. Frigida siquidem est omnis membrana: hæcque vix vllis calefcit arterijs aut venis nisi tenuissimis, ex illis, quę ad intersepientes pertinent, deriuatis. Nervos verò à recurrentibus exiles prorsus mutuantur.

Verum ipsius iam cordis considerationem agrediamur. Sanè in homine aliquantò breuius vilitur & latius, quam in plerisque animalibus ceteris. Quoniam thorax quoque corporis proportionè breuior homini & latior, bestijs angustior & longior. Extima superficies læuis planè tota; nisi aliquam inæqualitatem venarum inducerent & arteriarum, adepsque non paucus. Carne constat densa & solida (quam ob causam non dubitauit Alexander in primo libro de anima cap. vlt. affirmare inter carnem & neruum medium quiddam esse) tùm ne facile ab exterioribus causis pateretur illud membrum, quod vitę fons est: tùm ne perenni motu atque agitatione dissolueretur: neue efflaret tenuissimus in eo contentus spiritus. Tùm verò vt melius conseruaret insitum illum calorem, quem omnibus alijs membris impertiri debebat. Sed mucro densior ac solidior, quam basis: tùm propter fibrarum omnium concursum: tùm ne in violento motu in pectoris os inturret læderetur. Propterea crassiore cor vitetur alimento. Nō enim tenui sanguine sinibus eius contento nutritur; sed crassiore illo, qui à iecore per venam cauam ascendit, & antequam ingrediatur sinum, suscipitur ea

A vena, quę quòd ad modum imposita: coronarum cordis basin ambit, <sup>coronaria</sup>, id est, coronaria appellatur. Hęc siquidem plurimis deductis riuulis membrum totum ad cuspidem vsque irrigat & sustentat. Habet & coronariam arteriam in plurimos item discissam ramos. Habet & à sexto pari neruos, non tam ad motum, quam ad sensum: quippe motus animalis non est, neque perficitur neruis, sed calore, vt alio exponam loco. Habet & circumfusum non paruum adipem, quem in calidissimo membro magno pere miteris: sed omnino cauit natura, ne perenni cōflagraret motu. Ità cordis substantia carne, venis, arterijs, & neruis composita est; quibus obnascitur adeps. Meritoque Hippocrates fortissimum musculum appellauit, licet minus propriè loquutus. Non enim verè musculus est; quòd non voluntario, vt musculus; sed naturali motu mouetur: nec neruo constat & tendone. Et musculi quidem simplices habent fibras, quibus vnicum faciunt motum; cor & multiplices fibras, & plures motus. Et si enim ex illo genere sit illius caro, quod <sup>περὶ χυμῶν</sup> dicitur, triplici tamen fibrarum genere in texta est, rectis, obliquis, transuersis: verum tam studiosè permixtis & complicatis, vt cum reliquarum carnis fibrarum diuellantur facile ac separentur, & vel ipsi oculis diuulsa ac separatæ conspiciantur plerumque; hæc arte nulla diuelli ac separamur queant.

His tamen tum duplex cordis motus perfici creditur, tum intercepta constat quies; rectis inquam sese contrahentibus ceterisque laxatis dilatari, mucrone scilicet ad basis centrum retracto lateribusque distensis: rectis autem laxatis & contractis transuersis deprimi & subfudere ac demum in intercepta quiete vigent oblique. Qui enim ex superiori regione offertur neruus, ad sensum, non ad motum pertinet; eòque intercepto nihilominus mouetur cor. Cum his triplex ille communis fibrarum omnium coniunctus est vsus, attractio, retentio, expulsio. Rectę siquidem attrahunt sanguinem spiritui gignendo necessarium, attractum retinent oblique facta quiete, expellant transuersę compresso corde emissioque in arterias spiritu.

quamquam huius quoque densitatis ac soliditatis aliquis debet esse modus, qui ex comparatione ceterarum partium constituitur. Alioqui si absolute loquaris, existant illa Philosophi verba; Quæ sensu hebeti sunt, cor habent durum & densum; quę autem sensu valent, mollius. Quippe in tex. 94. lib. 2. de anima, de viuente corpore dicitur; Duri carne inepti mente; molles autem carne bene apti. Quia de re in illius loci commentario dicemus.

Sed & in illo ipso priori loco minus cor grandiori anteponitur. Pauida, inquit, sunt, quibus cor grandius; audentiora, fidentiora que, quibus minus, aut mediocriter. Affectus enim, qui accidit ex metu, iam in ijs præ est: quoniam calorem proportionè cordis non habeant; sed parum caloris in magno conceptaculo exolefcant; itaque sanguis frigidior sit.

Vasa,

Adeps,

Cor an musculis,

Coris motus &amp; fibra,

Densitas,

Magnitudo.

DE SINIBVS, VASIS,  
Auriculæ, & membranulis cordis.

## CAPVT XXIV.

Sinus  
duo.

**R**orò duas cor cavitates habet, duos specus, sinus, thalamosque; superficie interna inæquali & plurimis quasi punctulis inculpta; dextrum & sinistrum; illum ampliorem, hunc angustiorem. Dextro namque à vena Caua suscipitur sanguis, quo tum nutrantur pulmones ( tenuis enim illorum substantia tenui sanguine sustentatur) tum vitalis spiritus generetur. Itaque maiorem illum, quàm sinistrum, quo genitus suscipitur spiritus, esse oportuit. Quippè pulmonibus, quoque alimentum debuit suppeditare. Sed tenuiore dextere, triplo crassiore sinister pariete cingitur: tum quòd ut spiritus tenuior est & calidior, quàm sanguis; ita maiori custodia crassiorique propugnaculo fuit contentus: tum ut siue dextri amplitudo sinistri crassitudine, siue sanguinis dextro sinu contenti crassitudo & pòdus alterius lateris mole còpensarentur; sicq. cor in æquilibrio esset. Sinister dextro præstare creditur: quòd & calidior sit & præcipua caloris sedes, & spiritum contineat meliorem sanguine & principium sit pulsus & vitæ in toto corpore.

Septimum  
medium.

Sinus autem hosce duos interiectus separat paries, quem septum medium vulgus appellat. Crassum illud quidem & reliquæ cordis substantiæ per simile: sed tamen quòd haud magno labore tenuissimum & calidissimum peruadat spiritus; qui mox in cerebro temperatus magnoperèque refrigeratus densiorem ac solidiorem neruorum substantiam per corpus vniuersum percurrat. Est etiam septum plurimis vbique poris foraminulivè peruium. Pulchre hanc rem explicauit Galenus in 3. libro de naturalibus facultatibus c. 15. ex dextro, inquit, eius sinu in sinistrum trahitur, quòd tenuissimum est: habente scilicet in se eorù interposito septo foramina quadã, in quæ præaltè descendere obit licet, velut in profunditates quasdam: quæ ex latissimo ore magis magisque semper in angustum procedant. Ipsos tamen earum fines vltimos propter paruitatem: tum quòd in animaliam mortuo omnia sint perfrigerata ac densata, contueri non licet.

De tertio  
sinu.

Porò inter hos duos sinus medium tertium adiecit Aristoteles in cap. 17. lib. 1. de historia, & cap. 3. lib. 3. Quam sententiam de magnis animalibus interpretari visus est in 3. libro de partibus cap. 4. Aut quòd fortasse difficilem nimis transitum spiritus per tam crassum corpus iudicaret. Aut omnino spiritum volens in medio illo sinu tenuari magis ac perfici antequàm ad sinistrum veniat. Aristotelem secutus est Plinius in lib. 11. cap. 37. Acute scilicet excogitata sententia probabilique ratione conclusa. Sed quæ ex dissectionibus comprobanda sit in quibus diligentissimum & curiosissimum fuisse Philosophum constat. Nec leuiter tamen fuit à Galeno reprehensus in libro de venarum arteteriarumque dissectione cap. 9. & libro 7. de anatom. admin. cap. 10. & lib. 6. de vsu partium cap. 9. dextri sinus particulam esse asserente id; quòd tertium Philoſophus appellauit sinum.

**A** In eo verò consentiunt, vt in grandiorum animalium corde cartilagineum os quoddam in superiori agnoscant sede. Non solum enim ita Galenus tradidit in 7. commemorato libro & lib. 6. de vsupartium cap. 19. Verum & Aristoteles in 2. de historia cap. 15. & 3. de partib. cap. 4. & 5. de ortu cap. 7. Quòd tum ad cordis firmitatem & stabilitamentum pertineat: tum vt illi adnitantur vasa, quæ inde oriuntur, membranæque vasorum orificijs adnate. Quòdque in magnis animalibus est hoc os, id ipsum in paucis corpus fuerit ex cartilagine neruòque constatum.

Cartilagineum os.

**Q**uatuor autem ex corde prodeunt vasa, vtrinque bina; ex superiori scilicet cordis parte, quam basim diximus. Ex dextro latere vena Caua deorsum & sursum protensa, ex iecore adducens sanguinem & ad superiora transmittens omnia: venaque arterialis ad pulmones progrediens, sanguinemque ex eo cordis sinu nutriendis pulmonibus deferens. Vena dicitur, quòd vsum habet venæ, deferre sanguinem: arterialis autem, quòd substantia & structura constat arteriæ; densa inquam & crassa tunica, quòd tenuiorem & calidiorem contentura esset sanguinem. Ex sinistro autem arteria, magna aorta spiritum in vniuersum effundens corpus: & arteria venalis tum fumidos vapores, tum aliquid spiritus in pulmones transmittens. **C** Arteriæque vocatur, quòd arteriæ fungatur officio, venalis verò, quòd venæ substantiam ac texturam habeat. Singula hæc vasa singulos obtinent aditus ad sui lateris sinum: sed opposito ferè ordine. Nã ex dextro regione altissima prope septum arterialis erumpit vena, ex inferiori Caua: contrà ex sinistri elatissima magna arteria, ex inferiori arteria venalis. Quòd non sine causa factum est: sed vt idem esset crassior idemq. tenuiorù vasorù principiu: crassiorù supra cordis regio, tenuiorù inferior. Neque verum est illud, quòd in 6. de vsupartium libro asseruit Galenus, magnæ arteriæ orificiũ cæterorum omnium vasorum orificijs amplius esse. Dissecantes namque manifestè sermimus multò maius & verò etiam duplo venæ Cauæ orificiũ existere.

Vasè  
quatuor.

**V**erum circa hæc vasorù ostia duo summa cum admiratione conspicimus; exterius vnum, alterum interiùs. Exterius duæ sunt appendices carneæ ac membranæ nerueæque, nigriores paulo, quàm cordis caro sit: quæ non ab vsu, sed à situ & figura vocantur auriculæ, vtrinque vna; altera venæ Cauæ, altera venæ arteriæ incumbit. Hæc minor, illa maior: quippè venarum, quibus incumbunt, ostia ita diuersa sunt. In cordis compressione turgent, sanguine spiritùque repleta: in dilatatione concidunt quali rugosæ. Quòd autem non crassioribus arterijs, magne & venali; sed tenuioribus venis, Cauæ & arteriæ appositæ fuerint; certum est illarum vsus argumentum. Appositas nimirum fuisse ad tenuiorum atque imbecilliorum vasorum robur; ne perenni cordis motu periclitarentur aut disrumperentur orificia: crassioribus ac firmioribus arteriarum orificijs nullum imminere periculum. Alios scio ab alijs vsus doceri: sed parum omnino probabiles.

Cardia  
auriculæ.

**I**nteriùs potro singulis vasorum quatuor orificijs neruæ membranæ aliquot adnascuntur. Hæc vndecim prorsus numerantur. Tres ad orificium venæ Cauæ, foris intro pertinentes, foris aperte intus clausæ; quas *νεφραξιας*, id est, trifurcas aut tricuspides

tricuspidales appellant, quod triangulari cuspidi similes sunt. Totidem ad arterialem venam, intus foras spectantes, intus aperta foris clausa; at non communi affixa circulo, sed separatum, ac propter semicirculi aut literæ græcæ Σ figuram *σπυροειδής* dicta. Tres item ad arteriam magnam & modo & nomine similes. Ac demum duæ ad venalem arteriam foris intus spectantes; quarum figura nunquam fuit satis cognita. Membranulas hæcæ medici & anatomici propterea portas, valvulas, ostiolavè appellant; quod eorum vsum esse arbitrentur vasorum officia claudere, nè quod intromissum fuerit in cor, per eadem refluat vasa; aut quod è corde effusum, in illud ipsum redeat. Itaque dilatato corde omnes illas aiunt extendi, trifurcâque multas rimas facere, & sigmoidas vasorum suorum officia claudere. Contrâ compresso contrahi omnes, atque trifurcarum rimas claudi, sigmoidasque corrugatas efficere fissuras, per quas egreditur sanguis. Hæc illi ratiocinantur.

At mihi quidem certè nunquam persuadebunt: nec adducar, vt credam tam insipienter operari naturam, vt ibi adhibeat instrumenta, vbi nulla sit eorum necessitas. Egressus sanguinis ex dextro sinu timendus non est: tum quod alius semper atque alius ex Caua accedit vena, qui egressum illius prohibeat: tum quod non mouetur sanguis, nisi attractus à membris, quæ alimento indigent: atrahitur autem, non is qui corde, sed qui vena Caua, quæ alimenti & sanguinis distribuendi, instrumentum est continetur. Hæc enim tota semper est sanguine plena; qui & atrahatur à membris & attractum aut egressum eius, qui est in corde, impediatur. Neque magis verendum fuerit, nè spiritus ex sinistro sinu egressus ad illum remeet. Quid enim est, quod illum ad cor repellat cogatque redire? Neque spiritus aliam ob causam prodiit ex corde atque per venas funditur: nisi quia, compresso corde pellitur. Cum igitur pellatur semper, nec repellatur ab vilo, quid reditum vereamur? Immo verò si vera esset Medicorum sententia: non parùm ab illis valvulis ostium claudentibus retardaretur illius diffusio spiritus, qui corpori vniuerso in primis est necessarius. Præterea vt spiritus ille tenuissimus est iamque septi medij crassitudinem ac duritiem superauit; sic facilius multò tentes illas valvulas pluribusque rimis distinctas superaret, si ad suum principium remeare tentaret. Et sanguis, quem arterialis vena ad pulmonum nutritionem transmittit, sanè ad cor, etiam si maximè vellet, remeare non posset: fugunt enim trahuntque pulmones: & tamen adiunt ad illius venæ officium valvulæ. Denique vt cordis compressio aperit officia contentumque humorem effundit, ita dilatatio aperta officia claudit, reditumque si opus esset, melius multò, quam illæ valvule prohiberet. Nò igitur valvulas, portas, ostiavè dixero membranas illas esse; Verùm tum ad inuandum cordis motum simul cum carneis fibris (neruæ namque sunt: tum ad firmitatem appositas: tum officiorum, quam) ob causam imbecillioribus vasis non simplices hæc additæ sunt membranae, sed membranae integer appositus est circulus, qui velut corona pulchrè incumbens officium roboraret, atque ex eo ceteri radijs, pendent membranulæ. Tum totus cordis; ne perenni motu pateretur nimium ac dissolueretur. Perpetuò siquidem dilatatum suscipit sanguinem à vena

A Caua & per arteriam venalem admittit inspiratum aërem, quo refrigeretur. Compressum autem effundit spiritum per arteriam magnam, aëremque ac fumidos halitus per arteriam venalem repellit.

Itaque partim Aristotelis, partim Medicorum sententiam probamus. Aristoteli assentimur; dum eas membranas propter motum appositas fuisse voluit: non item, dum eas neruorum principia esse credit. Neque enim is motus indiget neruis, quem idem ipse Philosophus naturalem, non animalem ac voluntarium esse cognouit. Medicis autem dum non neruos, sed membranas esse voluit: non autem, dum officiorum valvulas aut portas esse adiiciunt.

## DE ASPERA ARTERIA.

## CAPVT XXV.

**C**Ordi pulmones incumbunt omni ex parte amplectuntur: nec aliud, quam illius refrigerationem spectant. Propterea namque pisces qui branchijs refrigerantur, pulmones non habent: neque hi nisi calidioribus animalibus insunt; quæ nimirum aëre suscepto atque ad pulmones cordi circumfusos deducto ac reducto, inspirato & respirato refrigerantur, vt interior ille focus conseruetur. Itaque duo sunt huic actioni instrumenta dicata. Alterum deducit aërem ac reducit. Alterum suscipit ac reddit. Deducit ac reducit aspera arteria, suscipiunt & reddunt pulmones. Aspera igitur arteria instar est fistulæ & canalis, quo aëre ore naribusque susceptus ad pulmones transmittatur indeque deducatur. *Artemis* absolute in 7. epidem. appellauit Hippocrates: sed Galenus & posteri *σπυροειδής* id est, alperam addiderunt. Arteria dicitur, non substantia, sed vsu; vt & venalis arteria. Non enim arteriarum substantia constat: sed cartilaginea tota est, tum vt aëri semper pateat; tum vt est in 3. libro de partibus cap. 3. quia non solum est spirandi causa, sed etiam vocis: quod autem sonat, læue ac solidum esse oportet. Non est tamen vna & simplex cartilago, sed pluribus orbibus seu anulis cartilagineis admirabili arte industriæque nature copulatis constat: quo tum robustior ac patentior esset, tum aptissimum formandæ vocis instrumentum, quippe inter durum & molle mediam quasi naturam habet cartilago. At nec integri orbis sunt, sed semioribus paulo maiores; posteriorique parte, qua oesophago incumbit arteria, intermissa cartilagineis duritie, mollior ac cedens membrana substantia accedit: vt & benignus oesophagi contactus sit, itaque dum ingeritur durior cibus cedente arteria turgere atque attolli possit: præsertim, cum ex illa parte nullum arteriæ periculum maius immineret. Membraneis item vinculis orbis anulivè vicissim iunguntur. Quare, tum ob inæqualitatem, tum ob cartilagineæ asperitatem dicta est aspera; cum læues planè sint arteriæ cætera.

Et in mutis quidem, quæ ad respirationem solam, non ad loquutionem hoc vsura erant instrumento, satis fuerunt membranae simplices: at in vocali homine tenuissimi quoque facti sunt musculi similes ferè intercostalibus seseque intersecantes, quibus tum contraheretur tum dilataretur, tum

Artemis  
v. 7.Cum as-  
pera ar-  
teria dis-  
catur.Substan-  
tia.Arteria  
musculi.

breuior, tum longior arteria fieret: vt formandę vocis necessitas postulabat.

*Tunica.*

Duplici demum conuectitur tunica: exteriori vna, quę tenuior est a succingente suppeditata altera interior paulo crassior, ab ore, lingua, palatoque deducta; nę facile a cerebri defluctionibus pateretur, moderatęque sicca, vt vox magis esset sonora. Nimio namque humore hebetatur & obraucefcit; & siccitate maior acuta nimis & clangosa efficitur.

*Larynx.*

Cęterum arterię huius caput lingue radici proximam *λάρυγξ* vocatur per quam primum ingreditur aer, præcipuęque formandę vocis instrumentum existit. Tribus constat cartilaginibus. Quę exterior apparet, omnium maxima est; quã a scuti a fabre facti & in medio quidem prominentis, lateribus verò ad posteriora extorsum deducti figura *θυρεοειδής* seu *θυροειδής*, hoc est, scutiformem vocant. Altera interior innominata creditur sed ab anuli orbis vđ forma anularis aut si maus orbicularis dici potest. Hęc minor est: tũmque apertam arteriam tenet, tũm cęteratum cartilaginum ac totius laryngis basis existit. Posteriori tamen sede, qua etiam cartilagineam tertiam fulcipit *ἀρβυραειδής* & *ἀρβυραειδής* dictam, quod vasculi figuram referat, quo maibus aquam infundimus, latior est. Duabus cartilaginibus cęagmentatur: quam ob causam quatuor aliqui cartilagineas memorant.

*Laryngis musculi.*

His ad formandam vocem eleuandis ac deprimendis, dilatandis & contrahendis musculi plures fuere appoliti. Bini enim a superiore & interiore sterni regione orti scutiformis partem inferiorem petunt, eamque deorsum trahunt. Toridem ab extremitatibus ossis, quod ad lingue radicem residet, & ob formam litterę *ο* *ὀστέος* & *ἀρβυραειδής* dicitur profecti sursum, eleuant. Pręter hos intra ipsas cartilagineas perexigui decem aut duodecim numerantur, qui laryngis proprii vocantur, cartilagineisque tum vicissim connectunt, tum dilatant & contrahunt. Omnes a recurrente accipiunt neruulos: & ideò recurrente intercepto aut secto sine voce illicò redditur animal, quod laryngis musculi priuentur motu. Ad sunt & duo musculi ab extremis lateribus scutiformis ad œsophagi posteriora pertinentes: quos qui inter laryngis musculos numerarunt, vt eam ad posteriora trahant; non animaduertunt illos ad œsophagum potius, quã ad laryngem pertinere. Primum siquidem mouens firmius esse oportet & validius eò, quod mouetur: propterea musculi mouentes ossibus ferè inseruntur: larynxque cartilaginea firmior multò est, quã membrancus œsophagus: quare larynx potius ad se trahet œsophagum, quã eòtrã laryngem œsophagus. Trahit autem larynx & ad se comprimit œsophagum, vt ciborum deglutionem viuet promoueatque.

*Cibiglansio.*

*Laryngis cauitates.*

Porro in interiori laryngis regione suprema vtrĩmque membrana cauitates qualdam & quasi cauernulas facit, quę susceptum aërem collidentes frangentesque præcipuum vocis simul cum epiglottide illiusque rimis instrumentum esse existimantur.

*Epiglottis.*

Superiorem namque laryngis partem atque introitum corpus aliud cartilagineum custodit, præclarum illius operculum: quod si quartam laryngis cartilagineam nominaueris, nihil morabor. A superiori & interiori scuti formis regione attollit sese gibbum, quã palatum respicit; cauumque, quã

laryngem; & suprema parte acutum. Hęc dę folio simile dixit in 4. libro de morbis Hippocrates. *ἐπιγλωττίς* passim ob lingue similitudinem appellatur. Eminent semper statque erectum, dũ respiramus, vt aëri semper pateat aditus. At dũ cibum aut potum deglutimus, tum ipso deglutionis ad posteriora motu, tũm maximè alimenti pondere ita deprimitur, vt laryngis ostium claudatur; factoque ponte ad œsophagum, qui post arteriam asperam latet, deuoluantur cibus & potus descendantque ad ventr. Itaque interiori parte minus, quã exteriori, durum est; multo que minus superiori, quã inferiori; vt benignior ac suauior œsophagi contactus sit. An potus per arteriam descendat ca. 27. Quã accuratè claudatur laryngis ostiũ, inter veteres video disputatũ. Plato siquidem in Timeo cibo tantũm solido & sicco, non humido & fluido potui occludi; atq. illum quidem per œsophagum ad ventrem, hñc verò per arteriam ad pulmones descendere voluit. Quod pluribus quoque alijs placuisse in quęst. 1. lib. 7. conuualium Plutarchus & Macrobius lib. 7. sat. cap. 15. & Cælius Rodiginus cap. 52. lib. 1. 4. antiquarum lectio num significant. Sed & Hippocratis inter alios fuisse sententiam scripsit in contradictionibus Stoicis idem Plutarchus. Deceptus opinor libello de corde, qui nũm sit germanus Hippocratis, dubitatur.

Dicerem risu hanc excipiendam esse sententiam, nisi prohibuisset Galenus in 8. libro de Hippocratis & Platonis decretis, & tanti fecisset Hippocrates vt multis argumentis confutandam duxerit in 4. de morbis libro. Si enim pulmones caui non essent, sed corpore aliquo pleni, non respiraret homo, nec vocem ederet. Cibus siccus in ventre absque potus liquore non coqueretur. Medicamenta quoque potata ad pulmones descenderent; quã tamen alium tum infernè tum supernè purgant. Esti in pulmones defluerent, tenerum nimium corpus exulcerarent, aut certè turbulento motu vehementer læderent: quippè vel sola ex capite defluens pituita breui tempore exulcerat. Qui vino replentur nigro, excrementa ijs existunt nigra: & si alium aut olidum quidpiam comedunt, vrinam eo odore reddunt. Si vel modicum quidpiam pituita in arteriam defluerit, multa & fortis oboritur tussis; quid si copiosus descenderet potus? Esti pueris lac ad pulmones tenderet, quo modo eos nutriet? Denique arterię ostium claudit epiglottis, superquam potius quã ac cibus ad posteriorem meatum transeunt. Hęc Hippocratis argumenta fuere. Pauciora, sed non minus necessaria, Philosophas habet in cap. 3. lib. 9. de partibus animalium. Si quid, inquit, cibi aut potus in arteriam dilabitur, strangulationes, tormina, & tussis grauissima incitantur. Neque meatus vilis de pulmone ad ventrem pertinet, sicut ex ore ad gulam tendere cernimus. Quinetiam per vomitũ vadè nam humor remeet incertũ non est. Ad hæc humorem non continuò in vesicam, sed prius in ventrem, certum est. Excrementa enim alui tingi videntur fœce vini atri. Vulnere etiam ventris sæpè hoc idem patefactum est.

Hęc tamen non videntur obitare, quo minus per epiglottidis rimas aliqua potius portiuncula in arteriam humectandam illabi queat. Nam & glandulę ad laryngis latera posite propterea sunt, vt subditas illas partes humore suo irrigent.

Contentis

Consentis Hippocrates aut quisquis fuit auctor libelli de corde. Homo, inquit, multò maximam partem in ventrem bibit. Bibit autem & in guttur: minùs verò & quantum latere possit per rham illapsum. Hòcque vtitur argumento: quòd si aquam colore caruleo aut rubrica temperatam fictenti valde bibendam dederis; deinde dum bibit, ipsius guttur refecet hoc colore tinctum reperies. Consentit & Galenus, ita Platonis sententiam interpretens. Si enim potio affatim & multa in arteriam illabatur, liberamque respirationem impediat, tussim nimirum excitat; Si verò tam pauca per anteriorem defluat tunicam, vt nullum faciat sensum irrorat, & humectat arteriam, nihil lequitur.

## DE COLLO.

## CAPVT. XXVII.

Collis  
vltus.

Vm arteria libet etiam de collo dicere, quòd propter arterie conseruationem, non vt caput sustentet ac portet, vt quispiam fortasse crederit, extructum est; & ideò in arteria potius ac thoracis, quam in capitis dissectionem considerandum est. Etsi enim in 3. lib. de partibus cap. 3. propter guttur & vocatum œsophagum scripserit Aristoteles fuisse conditum: primarium tamen naturæ scopum fuisse guttur atque arteriam, secundarium œsophagum: duplici ostendit argumento. Altero, quòd quæ animalia pulmonibus carent, vt pisces, ea collo item carent: & quoniam collum non habent, sed thoraci atq. alimenti loco statim caput coniungitur; fit vt manifestum quoque œsophagum illum non habeant, qui videntur in illis, que pulmonibus & collo prædita sunt. Altero, quòd venter alimenti locus potest ori esse continuus, pulmones non possunt: sed aliquem quasi tractum ad esse oportet, quo spiritus tum ab ore ad pulmones trahatur, tum à pulmonibus rursum ad os efficitur. Quoniam verò respirationis hoc instrumentum longitudinem habet, in hoc respirantium animalium genere œsophagum quoque inter os & ventrem apponi oportuit: quemadmodum & cætera omnia, quæ aut supernè deorsum, aut infernè sursum feruntur. Sic animalia, quæ alimentum sibi ex terra conquerere debent, longius collum & cruribus æquale habent. Homo tantum, quantum aspera arteria vsus postulat.

Collis  
par-

Constat autem collum tum anterioribus tum posterioribus partibus. Anteriores sunt larynx & arteria, laryngis musculi os hyoides eiusq. musculi, vigulares venæ, carotides arteriæ, illique coniunctus nervus sexti paris cum recurrente, glandula, œsophagus, & capitis collicque musculi aliquot. Posteriores vero, quæ communi ceruicis nomine continentur, vertebræ septem cum spinali medulla, musculique caput & cellum extendentes, & alij scapularum quidam; in quibus immorandum non est.

## DE PVLMONIBVS.

## CAPVT XXVIII.



Speram arteriam verè scripsit. Philosophus: in tex. 89. lib. 2. de anima, propter pulmones fuisse factum. Hęc namque ad pulmones integra ducitur, vt rotum in eos susceptum infundat aërem. Ibi vero in plurimos ramos discissa omnes eorum permeat partes, atque ad omnes deducit aërem. Itaque arteriæ alligati ac suspensi pendunt in thorace pulmones. Alligantur & spinæ: quod in homine præsertim erectæ figuræ animali, cæterisque item cum eriguntur, dilaberentur simul cum corde in diaphragma, ac in pectus dum in terram procumbunt; prohibereturque respirationis; nisi ex superioribus ac posterioribus partibus penderent firmiter. Anterior vero atque inferior pars libera est, vt liberè attolli omnique ex parte amplecti frigidòque aëre suscepto refrigerare cor possent. Adde- ret Auicenna, spinæ alligatos fuisse, vt cor tueretur, nè in illius vertebras incurrens læderetur. Propterea enim culcitram cordis appellat. Verùm hoc in anteriori parte non minùs erat necessarium: cum præsertim ad pectus inclinet cordis mucro, atque ad illud compressum moueatur.

Pulmonis  
forma.

Intersepiente membrana solum cor intercipiente bifariam quasi diuiduntur, thoracisque cauitatem, vtràmque occupant, dum suscepto aëre atolluntur. Figura iccori planè respondet: bouis vngulam diceret. Vt enim ventri iecur, sic pulmones incumbunt cordi: sed alio atque alio, imò & opposito sine: illud, vt calefiat, hi, vt refrigerent. Vtrumque membrum superiori parte gibbosum est: siue quod à continenti loco ita formentur: siue quod vndeque ad contenti membri complexum declinent. Ità inferiori parte cauum vtrùmque existit.

Disposi-

Figura.

Huc etiam spectant lobi, in quos discissos pulmones cernimus: tum vt facilior & expeditior esset motus: tum vt omni ex parte cor amplexarentur. Sunt qui lobos hosce alas appellent, Quod alarum imitatione dilatentur, explicentur, & colligantur. Eadem metaphora pinnae quoque dicuntur. Plures in bestijs, quam in homine, numerantur lobi: quod erectam homo figuram habeat, bestia terram spectent: & in plures item bestiarum iecur diuiditur. Quippè in omnibus, quantum fieri potest, similis sibi semper natura est.

Lobi.

Nam pertenui quoque vtrùmque viscus tunica regitur: quod pulmonibus sanè perbellè accidit; tum ne grauiores reddant atque ad motum difficiliore; tum quia tota quoque illorum substantia tenuis est, leuis, rata, spongia que similis; vt & aëri tota sit peruia, & aërem multum suscipiat, & atollatur facillè ac deprimatur. Quod si nulla obducta fuisset tunica, peruijs pulmones aërem non continentes eleuati nunquam fuissent. Iecur crassum, pulmones spumofum sanguinem concretum dixeris. Ea pulmonum tunica aut ab intersepiente, nascitur, aut à vasis illos subeuntibus: superior pars ab aspera arteria, inferior ab arteriali vena arteriaque venali, quib⁹ & cordi cōnectuntur pulmones.

Natura  
vbiq. est  
similis.

Tunica.

Nervi autem ad tunicam quidem à sexto pari de-  
ristantur: in pulmonum autem substantia nulli de-  
prehenduntur sensu. Sed tria duntaxat iamiam  
commemorata vasa: quæ innumerabili ramorum  
sobole per omnes illorum partes aërem, sanguinè,  
& spiritum deducunt. Ideoque membrum hoc  
eterogeneum dicitur, quod substantia seu paren-  
chymate, tunica, & triplici vasorum genere constat.

Plures illius vsus apud medicos reperias: Ego  
duos agnosco. Alterum cordis refrigerationem,  
ne perenni aëre motu, sed hoc quasi flabello  
ventiletur: vnde cordis flabellum & ventilabrum  
vocatur. Ad necessariam, inquit Alexander  
in 1. lib. de anima cap. vltimo, caloris redun-  
dantiam habet attrahentis & reddentis spiritum  
officinæ supplicias, quibus intercedentibus ad  
æquabilem caliditatis mensuram admota refri-  
geratione deducitur. Alterum, ad edendam vo-  
cem & ad loquendum. Nam quæ pulmonibus  
carent animalia, carent & voce. Et Aristoteles in  
tex. 88. libri 2. de anima naturam dixit respirato-  
ræ ad duo vti; tum ad interiorem calorem refri-  
gerandum, tum ad edendam vocem. Vterque vsus  
magnam pulmonum quantitatem postulat, ve  
plurimus aër susciperetur, quo & magnus calor  
refrigerari posset, & diutius produci vox & locu-  
cutio: præsertim cum cohibere interdum cogi-  
mur anhelitum.

De vitali facultate cordisque ac pulmonum  
motu hoc loco agendum mihi fortasse quispiam  
enseat. Sed ego corporis organici nunc tolim  
descriptionem facere institui, membræque animæ  
preparare: de facultatibus & operationibus post  
in animæ contemplatione differam.

#### DE CAPITIS NECES- sitate & vsu.

#### CAPVT XIX.

**N**ihil superest amplius, quod in thorace  
consideretur; nec quidquam in eo  
continetur aliud, quam cor cum pul-  
monibus. Ita ea omnia, quæ ad vege-  
tantis animæ organa, ad nutritionem  
inquam, procreationem vitalemque actionem  
pertinent accuratè satis pro instituti nostri ratione  
explicata sunt. Consequens est de ijs dicere; quæ  
ad sentientem spectant. Hæc duplicis generis sunt:  
quædam sentiendo, quædam mouendo dicata:  
sensus caput, motui artus destinantur. Ita hæc  
duæ animæ, vegetans & sentiens, æquè sibi cor-  
poris membra partiuntur. Nam cum quatuor  
in partes totum initio diuiserimus, altera ventrem  
occupat & thoracem, altera caput & artus: me-  
diam illa regionem, quæ corpus totum fouere &  
conseruare necessariaque partibus omnibus sub-  
sidia prouidere debet; hæc partes extremas.  
Tertia, quæ superest, intelligens anima nullo  
corporis vitur organo. Atqui cognitio motum  
antececit: prius igitur de capite, in quo sensuum  
omnium organa continentur: posterius de artibus,  
quibus ad res cognititas persequendas mouemur.

Caput hoc loco non ea acceptione nomina-  
mus, qua partem illam interdum significat, qua  
sumitur alimentum. Plantarum namque radices

caput diceremus. Sed tam animalium partem cõ-  
siderandam proponimus, quæ ossibus vnde quaq.  
constans substantiam quandam medullæ perlumi-  
lem continet, quam cerebrum appellamus, supre-  
mumque in toto corpore obtinet situm; vti in c. 15.  
lib. 1. de hist. Philosophus loquitur.

Sanè hanc partem non esse ad vitam omnino  
necessariam, testatea indicant animalia & eiusmo-  
di alia, quæ carent capite & analogum duntaxat  
quidpiam habent. Imò in ijs quoque quæ caput  
gestant, posse aliquandiu saltem absque illo con-  
seruari vitam, aut illud etiam prorsus necessarium  
non esse affirmavit in libro de Iuuentute & Sene-  
ctute cap. 1. Philosophus, & visus est indicare in 3.  
libro de partibus cap. 10. vbi credendum quidem  
non esse scripsit caput abscissum aliquandò fuisse  
loquutum: quippe aperiata arteria præcisâ & sine  
pulmonum motu vox nulla esse potest: corpus ta-  
men detractò capite progredi quoquam non tem-  
erè credi; cum ea, quæ sanguine carent, diutius  
etiam viuere capite truncato queant. Est & lucu-  
lentissimè Alexandri testimonium in extremo lib.  
1. de anima, argumento sumpto ex corde. Sicut,  
inquit, animalia nonnulla excelsò atque ablato  
corde viuientia longiore persistunt tempore, velut  
testudo & chameleon; sic in quibusdam excelsò  
capite reliquum corpus diutius viuere & vtram-  
que partem proprijs actionibus fungi, quam læ-  
pillimè cernimus. Quædam etiam truncato capite  
palpitasse Themistius memorat in 1. lib. de anima  
cap. 35. & Aueroes in com. 4. lib. 7. physice: arietem  
vidit abscisso capite ambulare.

Cur igitur tam multis ijsque præstantissimis  
animalibus fuit appositum? Credit Galenus in  
8. libro de vsu partium cap. præsertim. 5. caput  
vniuersum & cerebrum propter oculos fuisse con-  
dita. Egit namque locum actionem illorum  
postulasse, ostendunt illi, qui vt prædonum aut  
hostium incursum speculantur, muros, altas turres,  
montesue conscendunt, & nauæ ex nauium mal-  
lis atque antennis terram prospectant. Ex editò  
enim & excelsò loco plura omnino & longius  
prospicimus. Iam cancris, scarabæis, & alijs qui-  
busdam animalibus, quæ capite carènt, difficile nò  
fuit oculos ceruicibus altis imponere, quod hæc  
duros haberent oculos. At homini & ijs omnino,  
quæ molles habitura essent collocari tuto promi-  
nentes ac nudi non poterant. Propterea ceruicibus  
impositum est caput, intrà quod ijs conderentur,  
omniq. ex parte propugnaculis extructis defen-  
derentur supra quædam supercilij ac frontis ossè,  
infra verò malis; vtrinque naso iugalisque ollis  
processu. Rursus oculi cæterorumque sensuum  
organa molli indigebant nervo: neruorum princi-  
pium atque origo cerebrum est: prope oculos igitur  
aliorumq. sensuum organa poni oportuit: ce-  
brum; ne si longius producendi essent nervi, du-  
riores euaderent aut certè molles distemperentur  
aut contunderentur.

Cæterum multis contra disputauit Conciliator  
diff. 40. & meam quidem certè sententiam optimi hæc  
medici ratiocinatio non id conserit, quod ipse  
quærebat, quod quis tandem colligit; cerebrum in  
capite locatum esse propter oculos, reliquaq. sen-  
soria omnia propter cerebrum. Nam quæ in priori  
ratiocinationis parte accipit, propter oculorum  
deffensionem facta fuisse, fatetur ipsemet non esse  
caput, sed capitis partem quampiam. Cerebrum autè  
quod

V. S. A.

V. S. A.

De an-  
imis.Corpo-  
ri in  
animâ  
vegetans  
& sen-  
tensium  
partito.Caput  
quid.Capit  
vite nò  
necessa-  
rium.De cap-  
itis sensu  
leni sen-  
tentia.Cõsuetu-  
tis.

quod in posteriori ratiocinatione adiungit, cui caput fuerit extruendum, non minus ad ceterorum sensuum organa, quam ad oculos, ipsomet consentiente pertinet: quare non minus propter illa, quam propter has in capite locatum est. Neque sensoria cetera propter cerebrum, sed hoc potius propter illa in capite positum esse, concludendum fuerat, ut ad singula, sicut ad oculos, ducerentur nervi cerebri quoque videre debuisset non sentiendi modo, sed & movendi principium esse, ipsius præsertim sententia: neque ad sensuum organa, verum ad omnes corporis partes nervos moventes disseminare. Ex hoc enim manifestum est, non propter solos oculos, sed & propter aliorum sensuum organa; immo nec omnino propter sensum, sed & propter motum totiusque corporis & omnium illius partium usum factum fuisse cerebrum.

Caput factum propter cerebrum.

Verissimum igitur fuerit Aristotelis illud in 4. libro de partibus cap. 10. caput cerebri gratia positissimum est: Hoc etenim solum continetur & cõservaretur capite, quemadmodum thorace cor, & ventre viscera cetera: propter eaque capacitate hac crassum & durum os extructum est: & ex Hippocrate in libro de vulneribus capitis domicilium & propugnaculum cerebri appellavit Celsus. Quia enim facultatum omnium fons & origo sit cor, earum tamen actiones non potest ipsum immediate omnes exequi, sed suas vices aliis debet membris delegare, nutrientem iecori, procreantem testibus, sentientem & moventem cerebro: vitalem, tanquam in primis & omni tempore necessariam aliisque omnibus generale subsidium, sibi reservat. Quare ut cordi thoracem, iecori ac ventri abdomen, testibus scrotum, sic cerebro caput natura paravit. Hoc enim optimum illi domicilium. Tum quia frigidum & humidum membrum distare debuit à corde caloris fonte. Tum quia cum propter hanc temperationem plurima habitum esset excrementa optimum erat editum occupare locum, apertum, & liberum, ut facilis & expedita purgatio esset: atque huc spectant problematum 2. & 3. sect. 36. explicationes. Denique sensuum omnium organa prope cerebrum esse oportuit, ut & spiritum & molles nervos acciperent. Sensus autem edita illa regia erat optima. Nam oculis & plurima & procul cognoscimus, imminentiãque incommoda opportunè prospicimus: & fons sursum præsertim cum aère natura fertur & vnde quaque exauditur. Odoritem cum vaporoso habitu in sublime ascendit. Sapores cum cibo & potu, qui ore suscipiuntur, omnes gustantur. Tactus per vniuersum corpus diffusus est.

Caput sensuum organa prope cerebrum.

#### DE CAPITIS FIGURA & motu.

##### CAPVT XXX.

**K** *Asparakos* Græci membrum hoc nominant. Siue quod ibi *κρηται καὶ φαί*, hoc est sedantamina, ut fortasse Galenus diceret, qui propter oculos factum putat. Siue *κεφαλή* καὶ *καρπὸς*, quod est in arefcere, ut aliis placuit, quod arido prorsus ossis confert. Siue *κεφαλή* καὶ *καρπὸς*, quod est operio ac tego; quoniam cerebri operimentum ac tegumentum sit. Nos appellamus caput, aut quod sensus & nervi ab eo initium capiant: aut quod ipsum ca-

Caput cur dictum.

piat & contineat cerebrum.

**A** Osseum esse oportuit: tum quia mollem substantiam contenturum erat: tum quia in extremo & editissimo loco positum iniuriis omnibus ac damnis exponeretur.

Cur osses. Cur sphaerica.

Sphaericum item: tum ut plus cerebri contineret, hæc quippe figurarum omnium capacissima: tum etiam ut in se robustius esset atque externos ictus minus exciperet excepto tunc firmius sustineret. Cum præsertim in omnibus præstantissimam hanc figuram quam maximè potest procuret natura.

Optima capiti figura quæ.

**B** Optima tamen & maximè naturalis figura capitis non est perfectè sphaerica, sed oblonga & utrinque in anteriora nonnihil compressa: anteriorique parte, quam posteriori angustior. Sanè cerebrum peculiarem nullam figuram postulat: sed dum anteriori parte mammillares processus ad odoratum emittuntur, & posteriori cerebellum à cerebro separatur velut medullæ spinalis principium & caput alterum, atque in media regione cavitates & sinus continendo spiritui præparantur; longitudinem quandam consequi necesse est, ubi omnia benè habere se debeant. Comprimuntur autem anteriora magis, quam posteriora: quoniam vertebræ dorsæ & spinalis medulla paulò maiorem faciunt latitudinem. Ab hac porò naturali & optima constitutionem multis modis sæpè natura recedit, quos longum esset persequi. Quod tamè acuminato sit vertice, quale apud Homerum Theristis caput, deprauatum iudicatur à Galeno in libro nono de usu partium, & libro de ossibus, & in arte medica. Sed si valida sit cervice, robustos eos esse, qui illo præditi fuerint, affirmavit in 6. epidem. Hippocrates: quod non tam capitis, quam cervicis beneficium est. Magnum item corporis proportionem servata laudatur caput, paruum damnatur. Illud enim multum continet cerebrum & copiosum ac benè temperatum spiritum; hoc contra, ideòque præcipitis ac temerarij ingenij inditium est.

Capitis motus quatuorplex.

**D** Mouetur autem caput omnem in partem: tum ut ipsum noxam omnem vitaret & commodum prosequeretur: tum ut sensuum organa ac præsertim lumina duo usquequaque sensilibus obiectis cognoscendis admoneret. Motum igitur habet rectum, flexionem & extensionem; obliquum ad latus dextrum & sinistrum; ac demum semicircularem in utramque partem. Non enim omnino in orbem vertitur, nec verti decuit, nec potuit. Flectitur extenditur super primam cervicis vertebræ: vit cum ducitur supra secundam, cervice licet immota rigidãque quiescente: at ad latera non nisi inclinata ceruice inclinatur. Flectitur igitur antrotrorsum, annuendo duobus musculis (gravia namque facile deprimuntur) qui ex supra sterni & claviculæ parte ad temporales ossis processum ducuntur. Quod si horum alter trahat cessante altero, ad illud nimirum latus inclinatur caput. Extendunt autè in posteriora versus dorsum complures omnino, maiores alij, alij minores. Maiores tum duo ex superioribus thoracis & inferioribus cervicis spinis utrinque nascuntur, & in utrinque occipitis latus ab invicem mox recedentes inferuntur. Tum alij duo ex superiorum item thoracis vertebrarum transversis processibus ad medium occiput simul ascendunt. Minores item quatuor: duo ex spina secundæ cervicis vertebræ, totidemque sub his ex posteriori primæ vertebræ parte ad me-

Caput motu movetur in quatuor calis.

**E**

**M**

alium ferè occiput pertinent. Semicircularem porò motum quatuor alij exigui perficiunt: duo ex occipite medio obliquè ad transfuersum sui lateris primæ ceruicis vertebræ processum: aliique duo ex secundæ vertebræ spina obliquè item ad transfuersum primæ processum progredientes. Dum autem ad latera inclinatur ad humerum dextrum aut sinistrum, non peculiari villo agitatur musculo, sed illis ipsi, quos cõmemorauimus, si qui sunt vnus lateris trahant laxatis oppositis. Ita quatuordecim omnino sunt, vtrinque septem, caput mouentes muscoli.

*Ceruicem mouentes musculi.*

Cæterum secundarios etiam habet motus, quibus ceruicem sequitur. Hæc autem & flectitur, & extenditur, & in vtrumque latus inclinatur; octo prorsus musculis. Flectitur tum longis duobus ex quinta & superiorum thoracis vertebrarum lateribus vtrinque ab œsophago ad primam ceruicis vertebram aut etiam interdum occipitis os deductis. Tum scalenis totidem ex prima vtriusque lateris costa ad omnes ceruicis vertebrarum processus pertinentibus. Extenditur verò totidem: quorum bini ex superiorum dorfi vertebrarum processibus ceruicis processus petunt: totidemque ex septimæ & superiorum thoracis spinis, quo loco articulantur vertebræ, in ceruicis spinas inferuntur. Qui vero superest motus ad latera, eodem, quo de capite diximus, modo fit: illius scilicet lateris trahentibus musculis oppositisque cessantibus.

*Spinam mouentes musculi.*

Iam quoniam similis motus in tota quoque ceruicis spina, illius quoque motores subiiciam musculos. Octo illi numerantur. Quorum duo ab ilium ossis posteriori parte ad duodecimam thoracis costam ascendunt, omnium interim lumborum processibus affixi. Duo ab infimo osse sacro ad primam vsque thoracis vertebram progrediuntur. Duo sub his ab eodem osse altiori ex ortu ad vndecimam thoracis eiusdem vertebram terminantur. Ac demum duo ab hac eadem vndecima vertebræ ad primam vsque thoracis eiusdem ducuntur. Primi duo flectunt antrosum spinam: nec parum iuuant recti abdominis musculi thoracem deorsum trahentes. Reliqui omnes extendunt, eam præsertim spinæ partem, cui affixi sunt maioris quippe est operæ corpus graue sursum retrorsum extendere, quàm deorsum flectere. Denique ad latera quoque flectitur spina & erigitur; alterius scilicet lateris trahentibus musculis, oppositisque laxatis. Sed iam singulas capituli partes consideremus.

#### CAPITULI PARTIUM CONSIDERATIO. Ac primum de capillis.

##### CAPVT XXXI.

*Capitis partes quæ.*



Ristoteles in 1. libro de animalium hist. cap. 7 eam duntaxat partem, quæ capillis tecta caluaria in nobis dicitur, tripartitò diuisit, in priorem partem, posteriorem, & mediam; hoc est in sinciput, occiput, & verticem. At ampliori significatione totum etiam illud nominamus caput, quod sustentatur collo primæque illius innititur vertebræ; & in bestiis totum capillis intectum est. Cuius partes sunt caluaria & facies. Ambæ rursus aut continentes sunt, aut contentæ. Caluariæ continentæ sunt capilli,

cuticula, cutis, membrana carnosa, pericranium, periostium, cranium & meninges dug, contentæ cerebri & cerebellum cum neruis, qui ex illis procedunt. Facies cõtinentes partes hæc commemorantur; frons, tempora, genæ, labia, mentum; contentæ autem, ferè sensuum organa, oculi, aures, nares, lingua; ambæque maxilla.

Pilorum tota congeries coma vocatur. Eorum materia excrementosa est, ex coctione, quæ fit in membris, terreus halitus, crassus, fuliginosus & adustus, ad cutem per poros exhalans. Hic enim viscoso admixtus humido adhærescit atque vt fumus quispian consistit; indeque pili existunt. Et quoniam exhalat ad cutem pilorum subiectum euadit cutis: quare hæc abscissa non nascitur pilus; cuiusque varietatem pilorum quoque varietas sequitur. Viuis pariter ac terrestribus propriè insunt: neque his omnibus, sed homini, equo, canis, boui & similibus; reliquis animalium potius quidpiam, vt leoni iuba; oui vellus, capræ villi, herinæ eo aculei; volucribus item pennæ, piscibus squammæ, crustatis crusta, arboribus & plantis folia.

Efficiens autem causa calor est euaporans excrementosamque materiam pellens. Finis communis est, vt superflua secerentur meteria, quæ corpori obesse plurimum, morbosque adduceret. Bestiis verò instar vestium sunt atque à frigore ceterisque iniuriis tœnentur. Homini, qui mente ac ratione valet, atque vsu manuum omnia sibi necessaria & commoda parare potest, in capite velut cerebri propugnaculum sunt & à frigore caloreve externo defendunt; neque solum quod plurimum ibi fit per cranij futuras euaporatio, sed etiam propter illius membri necessitatem abundant maxime in capite pili: In superciliis sudores frontis arcent, ne ad oculos defluant eosque lædant; vix tamen crescunt; quia in parte prorsus ossæ & absque furua deest materia. In palpebris item tum oculos ab externis incuris custodiunt; tum obumbrando quoquo modo & dirigendo aciem aspectum iuuant. Ibi quoque parum crescunt, quod in membrana sit nec magno opere excrementosa palpebrarum materia. Sed & impediunt aspectum, si nimium producerentur: In mento & barba ad reuerentiam dixeris pertinere: idè maribus potius nascuntur, quàm feminis. Nam & calidior sexus. Denique circa genitalia honestatem faciunt ac turpitudinem tegunt. In partibus ceteris nec abundant magno opere, nec vllum habent vsum sed materiæ solam necessitatem: aut generalem illum, vt excrementosa secerentur meteria. Cùmque in quinque præcipuè locis nascuntur homini pili, in capite, superciliis, ciliis, mento, & genitalibus; soli capitis pili vocantur capilli; quasi capitis pili.

Canities porò pilorum aegritudo est, quæ deficiente calore oritur, cum humorem pilique materiam coqueret satis non valet. Ideò enim putrescit. Et ex morbo interdum aliqui canuerunt; deprauata scilicet cuti, vt confirmat Philosophus in 3. de hist. cap. 11. & 5. de ortu cap. 4. qui post sanitatem calorisque integritate recuperata pristinum quoque pilorum colorem recuperat. Quæ etiam veneri nimium indulgent aut grauioribus negotiis occupantur, canescunt citius, quod magno opere debilitetur calor. Quibus item crassior capillus est: quoniam plus humoris habent; quod aegrius dissoluatur. Quibus autem tenuis & mollis, quod minus

*Barba.*

*Cervi capilli.*

*Capilli.*

*Canities.*

*Pilorum.*

nus habet humidum idque tenuius, quod facilius consumatur; ij aut nunquam aut tarde canescunt: Tuuare plurimum si oleo aquae permixto inungaris sapienter auctor est in 5. de ortu cap. 5. Aristoteles. Refrigerans enim aqua calorem externum arcet, qui putredinem adfert; oleumque ne facile siccetur, prohibet.

Quamquam non ex putredine semper aegritudineque pilorum canities nascitur: sed ex aliis etiam causis. Tum ex sola caloris imbecillitate, qui materiam non potest perfecte resolueret. Ita iuuenes aliqui sani ac robusti visuntur profus cani. Tum ex ingenti quopiam timore, quo ad interiora calor confugiat: quemadmodum quibusdam accidisse scimus, ut vnica nocte repente canuerint. Tum demum ex nimia siccatione: sicut segetes a sole adultae albescunt. Constat vero sulphuris fumo aliisque artibus capillorum colores a mulierculis immutari, de quibus Albertus & alij.

Canities  
hominis  
propria.

Solius autem hominis proprium esse canescere dixit in sua introductione Porphyrius; & confirmavit Philosophus in cap. 1. & 3. commemorati iam libri 5. Etij equum quoque addidit in eodem cap. 3. & 5. quoquomodo videri canescere, quod os, quo cerebrum continetur, tenuius habeat. Cur vero hominis proprium sit, causam reperies in problem. 62. sect. 10. Cetera namque animalia pilos quotannis mutant: aut si non mutant, haud longam habent vitam; pilusque non senescens neque canescere. Homini neque deciduus pilus, & vita longa. Sed potior extat ratio in cap. 4. & 5. scriptis iam indicati libri. Homo namque praeter ceteris maximum proportionem corporis & humidissimum ac frigidissimum habet cerebrum. Quare cum humor non nisi ab innato calore dissoluatur, putrefcat ab externo; senectute adueniente innatus calor debilitatus humorem nequit consumere: atque ut cibus non coctus aegritudinem adducit corpori; sic humoris non coctus putrescens canitiem adfert velut pilorum aegritudinem seu cruditatem humiditatis in cerebro, ut loquitur Aristoteles in cap. 1. eiusdem libri.

Decalari  
sic.

Caluescit etiam homo. Et in 3. quidem hist. lib. caluities definitur capitis esse laxitas: at in quinto de ortu libro, amissio, defluxus, & casus pilorum ex capite; qui ex calidi & pinguis humoris inopia nascitur: quemadmodum in plantis huiusmodi humoris defectu cadunt folia. Sed & potest cadere pilus aut quod illius substantia fuerit in radice consumpta quod in quibusdam morbis euenit. Aut quod cutis quapiam ex causa obdurerit plus aequo. Cessare namque in ea pilum oportet: proptereaque cicatricibus non adnascitur. Hominem maxime animalium omnium decalari constat; nec nisi post pubertatem feminisque emissionem: praesertim si veneri nimium indulgeat. Plutimum enim caloris & humoris amittit, citiusque refrigeratur & siccat. Sola tamen anteriori, non posteriori capitis parte caluescimus: quoniam anteriori cerebrum frigidissimum continetur. Feminae, spadones, & pueri non caluescunt, quod semen non emittant. Eandem ob causam castratos boves legimus in problem. 56. sect. 10. habere maiora cornua: quod superflua materia, quae semine fuisset eiecta, conuertitur in cornua. Sed feminis & pueris ea quoque occurrit causa, quod perquam humida corporis constitutione sunt. Quocirca in problem. 5. sect. 31. cum quaesitum esset, cur qui nati sunt

caeci, caluescant nunquam, responsum fuisse reperies; quoniam abundat nimium in illis humor in capite, qui tum caecitatis fuit causa, coagulando & obruendo oculos, tum capillis materiam suppeditat.

## DE PERICRANIO periostio, & cranio.

### CAPVT XXXI.

**P**er cranium dicitur membranae carnosa dicendum esset; nisi de illis antea fuisset dictum. Ut enim toti corpori communes sunt, ita specialem nunc considerationem non postulat.

Proximum his est *periostium*, dura & praevulsa membrana: quae ex dura menynge percranij suturas, quibus illa adheret, erumpens circa cranium extenditur: inde nomen accepit. Haec tum totum integrit ac tuetur cranium: tum duram suspendit menyngeum craniumque adfirmat, ne in cerebrum prolabatur.

Pericranij.

Non tamen immediate incumbit cranium, sed tenuioris alterius membranae interuentu, quae ut ceteris ossibus, ita cranium quoque obducitur: generalique vocabulo *periostium*, hoc est circa os appellatur. Aegre sane diuellitur ab offe: si diuulseris, nudam habebis caluam seu caluariam: quam *periostium* dicimus, quod quasi *periostium*, id est galea, incumbat cerebro illudque obuallet ac defendat. Hac quippe cauitate ut proprio domicilio cerebrum continetur. Crassum vbi que est os cranij, ut firmum esset cerebro propugnaculum: crassiorque posterior pars, quam occiput occupat. Tum quod crassius iungitur vertebri, & quasi spinae principium existit. Tum quod maius ibi admodum fuit propugnaculum, vbi maius erat periculum.

Periostium.

Cranium.

Anteriori namque parte adsunt exploratores oculi, qui damna imminetia praevideant. Sed etiam posteriori parte cerebellum siccius continetur, anteriori mollius cerebrum. Rarum tamen & plurimum peruium foraminibus: tum ne pondere nimio grauaret: tum ut succum aliquem pro alimento contineret; locusque simul esset perspirabilis. Eandem ob causam non vnicum os integrum factum est, sed plurium congeries: quorum contextu futurae fiunt, quibus tum ab externis iniuriis minus patitur, dum cum ipsis ossibus terminantur fracturae neque per totum progrediuntur cranium: tum alligatur dura menynx tum pericranium emergit: tum exhalant fuliginosi vapores. Si quidem corpori vniuerso velut tectum calidae domui; & ut Hippocrates loquitur in 4. libro de morbis & in epist. ad Demetrium Regem, tanquam encubita, quae vndique ad se trahat, impositum fuisse videtur. Propterea cum homo plus, quam animalia cetera caloris habeat, cum Aristoteles in 2. de partibus ca. 5. plures in capite futuras, & plures mare, quam feminam, habere scripsit; ut spirantior esset locus, qui vaporibus pluribus atque exhalationibus abundat. Quare non fuerit mirum, si feminas grauiora, quam viros, capite gestare pondera videamus; si pauciores futuras habeant. Tres vero praecipuae obseruantur. Prima anterior transversa in sinu capite, quae coronalis nominatur, siue ex figura litterae,

Cranij futurae.

(, siue quod illi potissimum parti imponantur coronæ, aut ipsa tanquam corona sincipiti imposta frontem cingat: nam Græci *σφαιρα* vocant. Altera posterior in occipite, quæ a summis ad ima dilata formam Græcæ litteræ *Λ* referens *λამβοειδής* appellatur. Tertia in vertice à coronali media ad summum lambdoïdis apicem producta *επιλαιοειδής* & *σφαιρα*, hoc est sagittalis & virgata dicitur, quod ut sagitta seu virga procedat recta. Hippocrates verò ad initium libri de vulneribus capitis tres omninò harum futurarum differentias fecit. Qui enim caput habent benè formatum atque tum anteriori tum posteriori prominens parte, figuram, inquit præ se ferunt velut litteræ *Ζ* si verò altera tantum promineat pars, litteræ *Γ*, ac demum neutra parte prominentiam habeat, quale fuerit acutum caput, velut litteræ *Χ*, sagittali nimum obolita. Cæterum etsi petrarò & vix vngulam in feminis, interdum tamen ad nasum vsque licet obscurior progreditur sagittalis: in bestiis ad medium vsque superciliorum. Quinquam in 3. historiae lib. cap. 7. canis cranium continuo constare osse, & viri quoque caput sine vlla futura fuisse visum scripserit Aristoteles, pluraque in Persia reperiri Herodotus, Celsus, & alij confirmant. Quod eò minus mireris, quod in valde senibus concresecunt atque ita coalescunt futura, ut vix vlla cernantur.

Dux alia præter has vtrinque circa tempora æquè à sagittali distantes, semicirculi ferè ac litteræ (, à lambdoïde ad coronalem protensa, obseruantur futura: quæ mendosa, notha, & squammosa dicuntur; quod verè plurium ossium commissuræ non sint, sed velut duo ossa sibi mutò incumbentia dum sincipitis aut verticis os sensim instar petrosæ squammæ attenuatum descendit, atque sub illud os, quod ab auribus ceu altera itè squamma tenuarum ascendit, subintrat.

Cranij ossa.

His quinque futuris, coronali, lambdoïde, sagittali, & duabus squammosis, septem in crano distinguuntur ossa. Duo in sincipite omnium infirmissima, quod sub illis humidissimum cerebrum continetur hæc tum quadrilatera vocantur propter figuram, quam exteriùs ostendunt, tum sincipitis ossa propter regionem, quam occupant. Tertium est os lambdoïde futura in occipito contentum, indeque appellatum: crassissimum omnium & durissimum. Quartum os frontis inter hæc crassitudine & duritie medium: quod & coronale dicitur. Quintum & sextum ossa temporum quæ petrosa quoq. & squammosa vocantur, quod superior eorum pars squammæ, inferior prærupte rupis formam referat. Septimū ac postremum os

Os cunei sinus eius.

palati, os basilare dictum; quod cranij & cerebri basis existat: & *σφαιρα*, id est cuneiforme; non à figura, sed ab intertionis modo. Sunt qui colatorium appelleat, quod in fundo sinum & foramina habeat, quibus cerebri pituitosa excrementa glande excepta in palatum desluunt. Sinus *σφαιρα* dicitur, ob lecti mentis similitudinem: quatuorque illius eminentibus partibus dura committitur cerebri meninx. Sed & inferiori & externa parte quatuor emittit processus, vtrinque binos, inter quos musculus inferiorem maxillam mouens nascitur. Vespertilionum alas hi processus referunt, ideòque *σφαιρα* nuncupantur. Glandem autem pituitariam sub dura menynge in ossè cunei positam, superiori que parte concauam, infe-

Gland. pituitaria.

riore gibbosam, ac ferè quadratam reperies; multò, quam ceteras glandes, duriorem.

Et hæc quidem sunt futuræ, hæc ossa cranium constituentia. Verum in his duæ iam adhuc futuræ continentur. Altera in ossè frontis, altera in sphenoidè. Interiora namque medio frontis ossi ad summam nasi radicem inferitur illud, quod odoratus excipit organum; & nominatur *σφαιρα*, hoc est cribrosum, quod instar cribri aut coli, quo & purgetur mucus & abditis odoribus pateat, sit perforatum. Hic tum galli cristam obseruant, quæ interiùs in acutum extuberans, dextrum ac finistram mammillarem processum distinguit: tum os *σφαιρα* id est spongiosum, quod in narium cauitatibus mollius ac tenuius apparet.

Quæ autem ad sphenoidem pertinet, ea est quæ hoc os cum superiori maxilla, occipitis ossè, coronali, & ossibus temporum iungitur. At ex hac duplici futura vno duntaxat cranij ossium numerus crescit: illo scilicet quod ethnoides appellauimus: quo superioribus addito octo prius existunt cranij ossa. Nam quod præter hæc à Græcis, *σφαιρα*, à Latinis iugale os vtrinque commemoratur, quod boum iugis simile videatur; peculiare os non est, sed processum duorum coitus, quorum alter ex temporali ossè procedit, alter ex ossè externum oculi angulum constituente. Optimum est hoc os temporali musculo propugnaculum; cuius læsio maxima homini adfert incommoda.

DE DVPLICI Menynge.

CAPVT XXXIII.

**R**anio cerebrum continetur: at non nudum. Tristis enim ac molestus nec sine damno mollis cerebri & duri ossis contactus fuisset. Neque in thorace iectur cum visceribus ceteris, nec in thorace cor cum pulmonibus nuda continetur: sed peritoneo illa conuoluuntur, his thorax succingente membrana obducitur. Mollis cerebro fluxæque substantiæ duplicem naturam membranam adhibuit, quas *σφαιρα* Græci, matres arabes appellarunt: alteram duram, crassam, & omninò firmam, ideòque exteriorem & cranio proximam: tenuiorem multò alteram, molliorem, benignoque magis amplexu adherescentem cerebro. Illam quasi mediam inter durissimum & crassissimum cranium, mollioremque ac tenuiorem membranam alteram: hæc inter membranam priorem & cerebrum mediam. Ambæ magnitudine & figura æquales sunt continenti corpori & contento: eo sine positæ, tum vt contingant cerebrum, altera foriter ac robustè, potiusque ab externis iniuriis, præsertim in cranij fracturis, defendat: altera suauiter magis ac benignè. Tum vt intra eas cerebrum moueatur, vt mox exponam. Tum vt venas nutriendo cerebro aut etiam cranio necessarias excipiant, sustentent, distribuunt. Tum demum vt separent atque vt animalium bono opportunum erat, interdistinguant cerebrum. Idque duobus modis, in anteriorem & posteriorem partem: in cerebrum, inquam, & cerebel.

Sinus eius

Ossis eius

Gallina

Ossis eius

Ossis eius

Cerebel

cerebellum: & rursum cerebrum in dextrum & sinistrum: utrobique non penitus, sed aliqua ex parte sese insinuando; quod dura potissimum præstat meninx, atque ubi ad dextram & sinistram cerebri partem separandam descendit, arcuatam quasi messoriam falcem describit; Falxque dici solet. Cranij basi firmiter ubique, præterquam pituitariæ glandi, adhæret hæc meninx; superiorique parte futuris alligatur villis illis, qui mox per cranij principium exiunt. Alligatur autem & suspèditur, ne cerebrum grauet & prohibeat motum: tantumque à cerebro distat, quantum villis dilatatio postulabat. Superiori parte tota continua est; inferiori pluribus, quemadmodum & cranium, foraminibus peruia, quibus procedunt nerui, spinalis medulla, pituita, & subeunt venæ, arteriæ, odores. Altera, quæ adhæret cerebro, vixq. propter nimiam tenuitatem vel tenuissimo stilo acutissimo cultello diuelli potest, propterea tantopere tenuata fuit, ne graui molestaque cerebro foret. Cùm præsertim in omnes quoque illius anfractus sese insinueret. Cùmque plurimis ubiq. venulis conspicitur aspersa, *χρησθή*, quoque, vt & fetum continens membrana, nominari solet.

CEREBRI PARTIVM  
consideratio.

CAPVT XXXIIII.

Cerebrum  
si appellatur.

**M**enyngibus inuoluitur cerebrum; quod apud Græcos proprium nomen non habuit. Quippe *ἐμηνίγγος* dixerunt, hoc est, quod in capite continetur. Plato *μυελός*, id est medullam. Sophocles *κεφαλή*, *κεφαλή*, albam medullam. Alij *ἐμηνίγγος* *κεφαλή*, capitalem medullam seu quæ capite continetur: ad differentiam spinalis. Nihil enim aliud, quàm cerebrum, meninges continent.

Inter præcipuas corporis partes habetur; eadem penè in homine ac animalibus cæteris conditione. Sed multò maior in homine quantitas, corporis maximè proportionè: ob animalium functionum varietatem perfectionemque maiorem. Figuram habet à continente cranio. Substantiam penè medullarem: at minimum habet pinguedinis, glutinosique multum; vt in libro de principiis habet Hippocrates. Quadruplex Galenus in 1. de musculorum motu cap. 1. discrimen agnouit: Primum, medulla fluxilis est, nec ex ea oritur neruus. Alterum, medulla membranis non inuoluitur. Tertium; nec arteriis nec venis intexta est. Quartum; ne vlla illi comunicatio intercedit cùm musculis, quæ omnia in cerebro cõspiciuntur. Sed nec cerebrum cranio continetur propterea, vt illi præbeat alimentum, quemadmodum ossibus medulla præbet: sed ideo potius nutritur cranium, vt cõtineat cerebrum. Neque inedia vel alia ex causa minuit; vt medulla reliqua.

Cerebri  
anfractus

Continuatum totum est, sed pluribus modis interdistinctum. Primum anfractibus plurimis & circumuolutionibus (vt & intestina in ventre) quæ bonam illius molis partem penetrant vt subeuntibus venis nutriatur commodius. Nec parùm ad motum mollèmq. substantiam fulciendam

**A** conferunt. Nam quod ad intelligendum conferre dixerit Erasistratus, merito irriti Galenus in 8. de vsu partium lib. ca. 13. quippe intelligerent quoque alij, qui cerebrum non minus, quàm homo, anfractibus illis distinctum habent. Albicant anfractuum partes mediæ, pallescunt extremæ & cinerum colorem habent.

**B** Deinde anteriori & posteriori parte: Facit hanc diuisionem dura meninx in occipite, non nihil arctata cerebrumque subiens. Anterior totum occupat sinciput & verticem sagittalemve futuram, decuplo vel vndecuplo maior posteriore, quæ in occipitij regione sub lambdoidei iacet. Quare illa totius nomine vocatur cerebrum, hæc cerebellum, qualiparuum cerebrum, Græci *ἡμιεγκέφαλον* dicunt. Minus hæc albicat pars; immò tubilaua prorsusque cinerica visitur.

Cerebri &  
cerebellum.

**C** Denique pars anterior quæ cerebri nomen retinet, in dextram & sinistram messoria menyngis falce diuiditur. Tum ob maiorem cerebri firmitatem: quia dum subintrat meninx, firmius omninò vtrinque continet, quàm si vnica esset massa. Tum vt dextra pars & sinistra distinguerentur, quas cerebri sinus, sensuum organa, neruorum distributio & omninò corpus vniuersum deinceps retinet. Tum verò etiam vt facilius esset illius membri motus, commodiorque nutritio, quàm si vnica rudis esset moles. Cerebellum cùm sit exiguum, solidiorque substantia, & satis possit per circumfusos anfractus nutriti, diuisione hac non indiguit. Totum tamen cerebrum diuisione non penetrat, sed ad duos circiter digitos, quibus ferè eminet cerebello.

Dextra &  
sinistra.

**D** Hos si cultello secueris, continuum totum reperies cerebrum; illudque membrana obductum nulla & cæcidius multò ac durius. Frigidior enim locus: tum quia medius: tum quia receptaculum vitalis spiritus, quem eo loco refrigerari natura voluit. Eandem ob causam interiores anfractuum & circumuolutionum partes magis, quàm exteriores, dixeris albicare, quia frigidiores sunt. Exteriores quippe venulis & arteriis calefcunt plurimis. Sensum etiam inferiora durantur, quòd durioris medullæ spinalis principium esse debeant.

Mediarégiõ.

Ergo in hac media regione cerebri, media inquam inter dextrum & sinistram, inter supremum & infimum, iam candidissimum corpus ob longum & angustum à prioribus ad posteriora productum apparet, Græcis *νομοειδής*, nobis callosum corpus propter duritiem nuncupatum. Hoc cùm cerebri partes antè diuisæ continuantur: tum sinus duo & ciuitates distinguuntur.

Corpus callosum.

**E** Sinus hi longiores sunt in priora & posteriora obliquo cauati ductu, perquam ampli, vt plurimum caperent spiritum animalibus functionibus necessarii: candidissimoq. vbiq. & aqueo humore oblito corpore obducti, tum ne obscurus & tenebriofus, sed clarus, purus, & quàm maximè fieri poterat limpides euaderet spiritus: tum vt frigidore loco melius temperari posset. Faciunt etiam hi duo sinus inspirationem & expirationem cerebri: ideòque ex anteriori & inferiori parte mamillares duo processus velut canales mittuntur ad nares, partim respirationis, partim excrementorum purgandorum gratia.

Sinus.

Separantur autem septo eiusdem cum cerebro substantia: quod superius calloso & inferius cæmatio adhæret corpori. In medio tenuissimum

est, & quod pelluceat, septum lucidum speculari vel lapis appellatur.

*Em duo sinus.*

Ceterum cur duo sint sinus, vnus dexter, alter sinister, non omnino à Galeno excogitatam rationem probo in 8. de vsu partium cap. 10. vt altero leso subseruieret alter: quippe Smyrnæus iuuenis in altero vulneratus euasit, quod alter illæsus esset. Sed illam magis, vt & locus esset capaxior, & simul firmior (Si enim vnicus fuisset, tam amplius infirmior sanè fuisset, nec tantam cerebri incumbentem molem sustentasset) & geminatis vtrinque sensuum organis responderent, quibus illos subministrare spiritum oportebat. Hi namque duo priores sinus sensibus planè dicatū sunt, illisque studiosè famulantur.

*Tertius sinus.*

Tandem hi duo sinus ad cavitatem quandam deorsum in cerebri medio terminantur, quæ tertius censetur sinus: Galeno medius, siue quod inter priores duos & quartum alium posteriorem sit medius, siue quod in cerebri medio versetur. Huic veluti tectum triangulare corpus quoddam incumbit, quod propterea *καμάριον* dicitur, quod fornix & camera formam referat: eandemque ob causam à Galeno *καμοειδές* & *καμοειδής* appellatum est. Oblongum existit, tribusque columnis, vna in anteriori parte, ac duabus cæteris in posteriori sustentatum. tres arcus efficit: eiusdem cum corpore calloso substantiæ. Eius vsus est, vt quasi testudo & fulcrum superiorem cerebri molem sustentet, ne tertium cum opprimat sinus.

*Corpus conariū.*

Ab hoc rursum patet ductus ad quartum sinus. Quo in ductu statim offert se se glandosum corpusculum *καμάριον* dictum, cono pineæ vel nuci simile, communem glandibus vsus habet, vt venas & arterias in cerebri sinus fufas suffulciat, vt liber pateat spiritui ad posteriora transitum. Post conariū enim meatus est, per quem transire debet. Is inter duo rotunda corpuscula iacet, quæ *γλῆνα* nominantur, quod paræ quædam nates esse videntur. Sub quibus & testes *σβόλαι* dicti apparent: quorum alius non agnoscitur vsus, nisi vt meatum illum efformet ac tuto deducant, tucanturque ne à superioribus partibus comprimatur. Meatus autem sub natibus progredienti aliud quiddam incumbit, quod epiphylis vermiformis nuncupatur. Oblongum enim est & vermiforme. Transitui spiritus ad postremum sinus præesse videtur; vt cum opus fuerit, claudat & aperiat meatum.

*Duo glutina & testes.*

*Epiphylis vermiformis.*

*Quartus sinus.*

Etenim in postrema quoque parte, quæ cerebelli est, quartus & postremus continetur sinus, ad principium item dorsalis medulla pertinens. Angustissimus omnium ille quidem & oblongior forma; calami, quam atramento intingimus, partem referens: sed qui vltimò excipiat spiritum mouendo iam præparatum, atque per cerebelli ac medullæ neruos in totum corpus distribuat. Itaque priores duos sinus sentiendo spiritum temperant, tertius mouendo, quartus susceptum spiritum distribuit.

Sed neque hi, neque duo reliqui sinus vlla (quidquid Galenus scripserit) obducuntur membrana: tum quia interior ille locus vt à nullo poterat lædi, sic nullo eguit propugnaculo: tum vt vehementior cerebri esset ad spiritum temperandum actio.

*Plexus choroides.*

In duobus præsertim prioribus, qui & insigniores sunt, & in hoc munere plus ponunt opera, plexus apparent choroides, venularum & arteriolatum pertenuis membranæ portiuncula labyrin-

theca prorsus textura tenuando ac præparando spiritui comparata.

Ex tertij autem fundo meatus patet ad cerebri basim, qui membranula excipitur, quæ ad modum infundibuli aut cyathi sensim angustatur; peluisque infundibulum, impleuium, & lacuna dicitur. Huic meatus alius interdum adiungitur ex eo loco, quo meatus tertij huius sinus ad quartum progrediens inter nates testese versatur. Itaque fuliginosa & tenuiora cerebri excrementa sursum per suturas, pituitosa & crassiora partim antrosum naribus si magnopere affluant, partim deorsum meatus hisce & maxime secundum naturam purgantur. (Nam & auribus quoque & oculis non nihil feceruntur) glandeque substrata excipiuntur & per cunei foramen emittuntur.

Toto demum detracto cerebro plexus retiformis reteve mitabile conspicies cunei ossi intratum. Neque hoc rete simplex est; sed quasi plura, alia aliis superposita: ita tamen, vt vnum alteri permixtum & implicatum sit. Ex plurimis intextitur venis & arteriis, quæ ascenderunt ad caput; in quibus coquitur plurimum & elaboratur spiritus, antequam cerebri subeat sinus. Ità credidit sanè Galenus. Sed contra obiecit quædam Vesalius lib. 7. cap. 12. quæ non facilem habeant explanationem. Nec spiritus à corde transmissus coctionem aliam aut perfectionem querit, quam frigoris temperationem, quam in sinibus cerebri abundè consequitur. Itaque vt in sinibus ipsis plexus cernuntur eiusmodi, ita & in loco. Neque ex vasis putat confici antequam petant sinus, sed ex ramis hinc inde collectis, quibus ea cerebri pars calore alio destituta foueatur totique cerebro frigidissimo membro igniculus quasi subiiciatur, qui & membro toti prolit, & deffluentem pituitam à frigoris congelatione tueatur; & apertos meatus conseruet vt leceratur facilius.

Minus etiam mihi probatur eiusdem Galeni & medicorum illud; ad cerebrum & priores sinus inspirari per nares aërem, ex quo in sinibus gignatur spiritus. Est enim consentaneè illi loquantur, qui in corde quoque ex inspirato aëre magna ex parte generari spiritum voluerunt. Vniuersum tamen spiritum in corde gigni ex sanguine alio loco demonstrari, neque nunc immorandum est: sed consentaneè item atque constanter affirmandum, nullum in cerebro generari spiritum; Hoc enim magnum omnino calorem postulat: sed illum ipsum, qui abundè subministratur à corde, temperari optimè atque ad animales functiones affici. Aëremque cerebro inimicissimum esse obesseque plurimum, si vel exteriores illius partes subeat, Galenus ipse consentit. Et inspiratus per nares meatus habet, quo ad os & palatum declinat cordique refrigerando famulatur: nullum autem in manillaribus processibus ad cerebri sinus. Hæcque narium respiratio duas ob causas instituta fuit: tum vt refrigeretur cor, dum ore non respiramus: tum vt cerebri excrementa purgentur, dilatenturque foramina, quibus pateat odoribus aditus.

Nullum autem aërem in cerebro gigni.

Narium respiratio con.

## DE CEREBRI TEMPERIE

O v. u.

## CAPVT XXXV.



Vz de neruis cerebro tūm anteriōri tūm posteriori alligatis disputatio esse solet, nūm ex hoc membro primūm erūpant, quamquā multiplex sit illorum soboles; in 3. lib. satis abundē fuit explicata. Itaque quatuor duntaxat, quæ de cerebro sunt, difficultates examinandæ supersunt. Prima est, quænam illius natura sit, quæ temperatio. Altera, quem vsūm in corpore habeat. Tertia, an dilatazione & compressione moueatur, vt cor. Quarta, an sentiat.

Atque inter omnes quidem video conuenire, innata temperatione frigidum illud & maximè humidum esse. Frigidum enim esse oportuit: tum vt spiritus, qui sensioni & motui famulaturus erat, temperaret calorem: tum ne calore nimio spiritus ascendens ex corde inflammaretur: quippe substantia est vt cumque pinguis magno perēque glutinosa, vt inde profecti nerui testatur, quos viscosos & tenaces esse oportuit. Tum verò quia in calido cerebro temerarij furibundiq. fuissent motus, ac deliræ sensiones, quales ferè phræneticorū sunt. Debit autem esse molle & humidum: tum propter sensiones, quæ in capite specierum aut spirituum impressione & susceptione vigent: nam & sensuum omnium organa humida sunt. Tum propter neruorum propagationem, quæ ex dura & consistenti materia nō fieret: nam & flexibiles neruos esse & spiritum ex cerebro transmissum promptè suscipere necesse fuit: Et cū cerebrum in supremo loco esse deberet; si duram accepisset substantiam, nimium omnino grauasset caput. Estque manifestum mollitudinis argumentum tot membranis tamque duro osse inclusum ac munitum à natura fuisse.

At si temperies tota per influentem & aduentitiam actiua spectetur; permulti sunt, qui cū Aristotelem audiant in 2. libro de partibus cap. 7. probantem esse frigidum; tūm ex tactu; tūm argumento illo, quod terra & aqua sit eius substantia; & sanguine ferè careat; affirmantemque conditum in animalibus hoc membrum à natura fuisse, vt calorem cordis temperaret; actiua quoque temperatione abundare illud frigore credāt. Præsertim cū in libro de principiis Hippocrates quoque sedem atque metropolim frigidi & glutinosi cerebrum appellat. Verūm hi affirmare solum voluerunt innatam temperiem frigidam esse; aut etiam influentem, antequam spiritus accedat à corde atque hoc Philosophi argumenta testantur. At vbi callidissimus accessit spiritus, plus sanè caloris habet, quàm frigoris. Nec pessimè Galenus pronuntiauerit in 8. de vsu partium lib. cap. 2. cerebrū tūm calidum esse, tum aère calidiore: hoc scilicet impuro aère; quem plurimis vaporibus frigidis permistum respiramus. Cū enim in eo membro plurimus contineatur spiritus immò amplissima vasa calido spiritu plena; fieri non potest, quin calefcat tan to pere, vt calor frigiditate superet. Maximè quod membrum est, si non primū sentientis ac mouentis virtutis principiu, ad eas certè tanquam cordis vicarium exercēdas institutū; ille verò calotesium opus absolunt. Tum ex thorace totoque

A corpore plurimus semper ad caput exhalat vapor, qui calorem augeat: adsuntque propugnacula frigida, mēbrana & cranium, quibus contrario circumiecto crescat calor. Adsunt exiguè quidem, sed plurimæ venæ, quæ cōtento sanguine calefaciant. Reque ipsa constat nimiam aëris alteriusue rei frigiditate capiti obesse plurimūm: animalibus; quibus friget caput, imbecillam operationē omnium hebetq. ac tardum ingenium esse: ac demum tangenti caput exterius calidum esse; vnde interiora quoque calorem colligas.

B Defluxiones enim illæ cōtinuæ ac frigidæ pituitæ, quæ distillant ex capite; somnus item & id genus alia, quæ ex cerebri frigore proficisci dicuntur; magnæ quidem humiditatis argumenta sunt: ac de altera qualitate solum ostendunt minus ibi caloris esse, quàm in corde ac cæteris membris, quæ tantam non habent frigiditatem innatam. Propter eam namque vapores, qui ex calidioribus attolluntur mēbris in parte minus calida ex maximè humida; propter caloris inopiam humorisq. copiam densantur, grauescunt, & ad subiectas partes descendunt.

C Quod autem Aristoteles cerebrum ad calorem cordis refrigerandū positum fuisse dixit. Galenusque ad principatum neruorū, motus, ac sensus; in superioribus fuit disputatum; nuncq. satis hæc fuerit repetita sententia: cerebrum animalibus propterea fuisse insitum à natura, vt natiuo suo frigore spiritum à corde ascendentem præcalidum atq. ad sensum & motum minus opportunum temperaret atque ad sentiendum ac mouendum aptum efficeret: simulque neruos effunderet, quibus temperatus spiritus transmitteretur: essetque hoc membrū quasi cordis vicarium & in hoc duplici actionis genere excquendo sedulus ac fidelis adiutor.

## DE MEMBRI EIVSDEM

motu ac sensu.

## CAPVT XXXVI.



N verò systole ac diastole, compressio nis & dilatationis motu moueatur; quemadmodum cor, paucis respondendum cenfeo, moueri sanè. Namque detracto cranio conspicitur motus in animali viuo; atque in recens natis mollissima quoque ossa palpant. At anteriorem solam partem, non posteriorem. Habet enim prior amplissimos sinus, qui plurimum continent spiritum, eumque præcalidum ascendentem ex corde. Posterior & angustissimos continet sinus, & exiguum spiritum, eumq. à prioribus sinibus refrigeratum. Itaque cū is motus à calido instante atque humidum attollente proficiscatur (præsertim cū vitalem in cerebro virtutem motus principium & causam cogitare non liceat: nec vlli in eo sint villi, quibus à seipso dilatari & comprimi queat) in duobus prioribus sinibus erit motus; mitior & tardior, quàm in corde; quia minor calor: in tertio vix vllus, in quarto omninò nullus. Ex effectu etiā duci argumētū potest. Quippe interdū ita sese dilatat & attollit cerebrū, vt mēbrana durā attingat: interdū autē ab ea nō parū, distat, quemadmodū & in pericardio cor. Et quenam tandem fuerit alia causa, cur amplio rem illam atq. à cerebro remotam cranioque affixam natura fecerit, nisi vt attolli contentum cerebrum posset?

M iij

Obiectio  
solutio.Innata  
operatio  
ne frigidū  
esse ex hu  
midum.Actiua  
operatio  
ne calidū  
esse.

Cerebri respiratio.

Denique non minus nec necessitate minori respirat cerebrum, quam cor: tumque ore, tum naribus suscipimus aërem & reddimus: tum vt non nihil spiritum cōtinens locus refrigeretur: tum vt odorum meatus dilatentur extremitaque cerebri purgentur, & spiritus à prioribus contractis sinibus ad posteriores trudanur. Atqui vt dilatari thorax non potest, quin simul extendantur pulmones: ita & in capite euenit. Accedunt & ea, quæ ad sternutationem pertinent; de quibus Philosophus in 33. sect. problematum. Colligit enim sese tunc cerebrum & contrahit ad noxiæ rei exclusionem: quodque est in thorace rullis, & in ventre singultus, hoc in cerebro sternutamentum est. Naturalisque planè hic motus existit, non animalis. Neq. enim in nostra est potestate: neque vt nobis liberit, intenditur aut remittitur; sed sponte sua semper mouetur cerebrum.

Sternutatio.

Cerebri sensus ex- perit.

At sensum ego quidem certè in hoc mēbro nullum agnosco: nec agnouit Philosophus in 2. lib. de partibus cap. 7. & 10. & lib. 3. historia cap. 19. Immo nec Galenus; qui in primo. de symptomatum causis cap. vlt. cerebrum dixit, non vt esset sentiens organum, sed vt sentiendi organum vim præberet, fuisse conditum. Et libro rutilum 3. organum non sentiens appellauit. Diximus hac de re pluribus in 3. lib. cum de neruorum origine disputaretur. Atque in promptu est experientia; qua vulneratū cerebri duræ & acuto cōpressum ferro aut etiam diuisum, nihil sentire deprehenditur. Illaque ipsa ratio locum habet in cerebro, qua ossa, neruos, & pilos in tex. 79. lib. 1. de Anima, & text. 124. lib. 2. non sentire probauit Philosophus: quod eam non habeat qualitatum mediocritatē ac tēperationem, quam tactus præsertim postulat. Frigore namq. & humore nimium abundat cerebrum. Et cum inferiorū ac subiectarum partium exhalationes continenter excipiat, perpetuò nimium doleret, præter naturam ab illis affectum. Itaq. dolores, qui sæpè sentiuntur in capite, membranarum sunt, non substantiæ cerebri.

DE FACIEI PARTIBVS.

CAPVT XXXVII.

**F**aciei continentes partes antea cōmemorasse satis. Iam si rationem quæras, cur solius frontis cutis, non item reliqui corporis, sponte nostra moueatur: ego eam in superioribus respōdi; quoniam membrana carnosa illi subiecta carnis fibris neruorūq. ramulis adiectis vsque ad capillos musculosa est tota in reliquo corpore profus membrana. Cum præsertim tā firmiter adhæreat cuti, vt vnum videatur esse corpus ægreg. admodū separetur. Sed & frōtis duo musculi sunt frontē ac supercilia attolentes. Oculorum palpebræ membranæ existunt ad oculorum custodiam à pericranio ductæ, adiecta cuti membranæque carnosa. Inferior immobilis est; superior duo musculi mouent, vnus in maiori situs oculi angulo, alter in minori; ille attollit, hic deprimit palpebram: altero scilicet laxato & quiescente, dum contrahitur alter & operatur.

Frōtis.

Palpebra.

Nasus.

A fronte ad labia inter duos oculos ducitur nasus; quo animalia percipiunt odores. Medium profus faciei locum tenet, oblonga & prominētī figura. Tertia hæc est faciei pars à summa frōte ad

inum mentum, si faciei partes proportionē consentent. Substantiam partim ossæam ad medium ferè habet propter firmitatem, efformādoq. cavitatem partim cartilagineam reliquam; vt in odoratione, respiratione, ac purgatione cerebri dilatari & cōprimi atq. omnino moueri posset, faciliusq. emungi. Hi enim tres sunt præcipui vsus nasi. Frontis ossi ethmoidi & cribiformi quod in spōgium mollius desinit, adnascuntur cartilaginee: indeque ad nasi longitudinem bipartitam distinguntur; duabus formatis fistulis, quæ vocātur nares: tum quod, vt est in 2. de partibus cap. 10. geminis sensum organis natura gaudet: tum ne altera parte lesa ante causa quauis obstruata, pernecessaria animali operationes cessarent. Quod nares diuidit ac separat, cartilagineū septū est: externa partes alæ seu pinne vocantur, siue propter figuram & situm, siue quod mobiles sint, atq. vt alæ pinnae vè dilatentur & contrahantur. Ad has dilatandas à fronte perexigui duo extenduntur musculi: atque ad contrahendas duo alij à musculis labiorum accedunt.

B

Labium vtrumque sursum trahitur binis musculis à malo ortis deorsum totidem à mento profectis. Adestq. præter hos musculi alij, quem buccinatorum vocat, quod buccas circundans contrahat contractus, laxatusque laxet.

Labia.

C

Mentum maxillæ partē fecit Philosophus, cum in 1. de hist. cap. 11. duas maxillæ partes posuit, anteriore mentum, posteriorem mandibulam. Quod de inferiori maxilla verum est, quæ per se spectatur & sola moueatur, dū superior in fixa cranio immobilis manet: solo statuatili crocodillo excepto, qui, vt eodem in loco ca. 7. liq. Philosophus idem confirmat superiorem, non inferiorem mouet.

Mentum & mandib.

Tempora demum iugali osse temporaliq. musculo; Genæ hoc ipso & massere, mentum deniq. insertis, ipsi musculis constant.

Tempora.

DE OCYLI SITV, FIGVRA, & vnicis.

CAPVT XXXVIII.

**O**culi sensuum organa consideranda supersunt, oculi, aures, lingua: de nato quippe odoratus instrumento dictum iam est, tactus autem organum vbique dispersum reperitur.

Oculi aspectus organum sunt, velut præclara microcosmi lumina: ab oculendo dicti, quod in re condita & alta cranij cavitare & sub palpebris lateant. Per has quasi fenestras anima & prospicit omnia & sese prodit: omnium namque affectuum indices sunt. Immo & vniuersi corporis habitū ex solis oculis cōiectare nos Hippocrates voluit. Sic enim habet in 6. Epidem. l. scct. 4. oculi vt valēt, ita & totum corpus editissimo loco & anteriori capitis parte positi sunt, vt prospiciat omnia antrosum præsertim, quorsum moueatur animal, nam & nerui molles, quibus egebant illi, anteriori cerebri parte prodēt. At profunda cavitare cōduntur tum vt spiritus vsiq. vsotia magis vnita: tum vt ipsi tutiores sint. Ad sunt nimirū obtegentes palpebræ, quæ si quid immineat dāni, clauduntur illico. Ad sūt & palpebris in fixa velut sepes cilia, quæ tum externos præsentiant incurfus, vt & in limacibus exporrecta cornua: tum non minimum conferant ad videndum. Ad sunt & supercilia, quæ in 2. de partibus

Oculi in diti.

Oculi in diti.

Oculi in diti.

Palpebra.

Palpebra.

Palpebra.

partibus lib. cap. 15. à Philosopho velut imbricamentæ dicuntur esse aut grandæ humoribus; quæ ex capite defluunt, præparatæ, ne oculos lædant. Ad sunt denique omni ex parte firmissima ossaque propugnacula, vtrinque nasus & os iugale: & ad nasum quidem angulus maior efficitur, ad os autem iugale oppositus minor: supernè verò frontis os, atque internè pomum seu malum. Bini sunt oculi; quòd organa ferè omnia geminauit natura vt vno læso alterum esset vsui.

Ossa  
indiquæ.

Figura  
oculi.

Figura eorum rotunda est, perfectissima scilicet perfectissimi organi, robustissima instrumenti pernecessarii; ac demum maximè mobilis mobilissimè plurimaque lustratur mèbri. Tum verò vt vndeque in orbem exquisitè perspiceremus; perpendiculari linea vndeque ab obiectis ducta. non est tamen exquisitè tornata sphaera; sed posteriori sede oblongior paulò, qua & visorium suscipit neruum, & infigitur cranio ac cerebro.

Oculi  
tunica.

Constat porò totus oculus tunicis aliquot atque humoribus. Tunicas complures audio nominari. Nam & adnatam commemorant seu coniunctiuam, & corneam seu duram, & vream, & choroidè seu secundinam, & retinam, & araneam. Ego non nisi tres agnosco integras & perfectas; quæ ex triplici nerui optici substantia dilatata existunt; diuicatas plures. Namq. adnatam & corneam vnicam esse comperio, quæ mutata substantia mutet quoq. nomen atq. in posteriori quidem oculi sede appellatur *συνευκωσ*, adnata seu coniunctiuam; in anteriori cornea seu dura. Hęc omnium crassissima est, quòd extrema & aliarum totiusque oculi quasi propugnaculum. Partem eam totam, quam albam cernimus, adnatam dicimus, quòd reliquis adnascatur extrinsecus: & coniunctiuam, quòd oculum totum adiungatur membranarum interuētū cum capite ac proximis partibus coniungat & colliget. Plurimum tuetur oculum, nè circūiectorum ossium duritiæ lædatur: idèd crassa est & densa, musculisq. subfermitur oculi: & vt est pinguis, sic illius rigore prohibet. Huius quippe tunicæ beneficio nunquam riget oculus. Pars verò anterior *αεραειδης* & *αεραειδης* cornea & dura dicitur, quòd laminæ illi corneæ, quæ lateris apponitur, similis sit, duritiæque & pelluciditate cornu pertenuè & accuratè politum referat. Densa est & dura, vt pupillæ atq. humoribus omnibus totique oculo firmum sit propugnaculum: pellucida & perspicua luminisq. perua ne perpetuis tenebris visionem impediatur. Quam ob causam tum anterior hæc pars multò est posteriore tenuior: tum venis ac vasibus cæteris caret, quæ oculum obumbrat, visionique impedimento essent, sed ab altera illi subiecta tunica nutrimentum haurit. Plerique adnatam ex pericranio & corneam ex crassa cerebri membrana deducunt.

Adnata  
& cornea.

Verum si vnica est tunica, vnicus & cõmunis erit exortus. Neque adnatam video cum pericranio coniunctam: sed optico neruo & circūiectis oculi musculis, qui membranulis pluribus additis adherent cranio. Propterea vniuersam hanc ego tunicam ex dura mèbrana ad oculi quasi amplexum dilatata deduci non dubito.

Vrea  
secundina.

Alteram ex 2. mèbrana, tertiam ex propria nerui substantia. Ad eundem igitur modum, quo prior, vnica est integra tunica, quæ & *αεραειδης*, & *αεραειδης*, & vrea & secundina nominatur. Anteriori quidem parte vrea, quòd nigra vrea acinum, à quo auulsus peduncululus sit, & colore & forma præ se ferat. In

deq. cornea propter vream nigram illi subiectam apparet nigra, cum vilo ex se colore sit prædita, sed lumini duntaxat perua. Posteriori autè choroides aut secundina: siue quòd veriùs vbiq. inspersa *αεραειδης*, secundina factu inuolueri mèbrana persimilis sit, siue quòd à secundina cerebri mèbrana, quæ etià choroidè vocat, ortum habeat: Tria præ cæteris habet hæc tunica. Primū; cæterarū omniū vasa continet, quòd à secunda cerebri deducatur mèbrana, quæ tota venis aspersa est. Alterum; anteriori sede perforata est: quòd foramen *αεραειδης*, pupillam & quasi fenestrā oculi vocamus. Per eam namq. cristallinus humor colorem prospicit & lumē suscipit, alio qui perpetuis in tenebris obfcurus delitesceret. Immò angusto foramine tum luminis radij, tum visoria virtus vnitur & acutiùs videt. Est & illud cõmodi, quòd per illud exterior tunica cornea nutrimentum accipit ex vasibus, quæ interiorè choroidis sedè irrigat. Tertiu, sola hæc inter omnes tunicas est colorata, nisi adnatam dixeris albam esse: sed hæc post cristallinum humorem iacet, neq. visionem poterat impedire. Anteriorè perspicuas ac lumini peruas esse oportuit. At nimis obesset, si vndeque accederet. Itaque peruo facto foramine reliquū opacauit natura. Non est tamen vnus vbiq. color. Sed interior pars, qua cristallinum respicit, nigra ferè conspicitur: nigri siquidè est congregare: qua verò cornicam, alio atq. alio colore prædita, in quibusdā caruleo, in aliis cario aut nigro, vt varia est cerebri & oculorum tēperies: indeq. varij oculorū colores in homine præsertim apparent. Nam in cæteris animalibus, vt Aristoteles obseruauit in cap. 1. li. 5. de animalium ortu & post eū Plinius lib. 11. cap. 37. idem semper in sua specie est color, boui niger, oui aquinus, aliis alius: soli equo interdum glaucus. Etiā & alia sunt colorum illorum causæ, quantitas, situs, puritas aut impuritas humorum, spiritus copia vel inopia. Posterior verò pars foris nigrorem ferè, intus colores varios habet, subalbū, viridè, ceruleum, qui omnes ad confortandū cristallinū non parum, & verò etià ad refrangendum lumen faciunt.

Pupilla

Tertia tunica est *αεραειδης*, retina seu reticularis, & retiformis; quòd veluti filis ab optico neruo productis retis habeat similitudinem: mollis est & alba, visoriumque diffundit spiritum. At non totum ambit oculum, sed posteriori solū sede vitreum humorem amplectitur cristallinoq. insertur ibi, vbi amplissimus est. Huius enim posterior pars infigitur vitreo: anteriorique obducitur illa tunica, quæ *αεραειδης*, aranea idcirco nominatur, quòd tenuissimæ aranearum aut ceparum telæ simillima videatur. Hanc si quartam tunicam nominaueris, nõ morabor: monebo tamen integrā non esse tunicam, sed integram ex hac & retina potius absolui, qua tum vitreus, tum infixus illi cristallinus continentur. Tenuissima prorsus est aranea & pellucida, ne visioni moram vllā aut impedimentū adferret. Itā sensim natura progreditur, à cornea & adnata maximè crassa & dura, per vream & choroidem tenuiorem ac molliorem, ad hanc tenuissimam araneam, in qua cristallinum videndū præcipuum organum medio oculi loco condidit: circaq. illum ex retina atq. araneæ coitu corona quasi describitur, quæ cilia oculis exterioris appo- sita pulchrè representat.

Vrea  
lores.

Quarta tunica est *αεραειδης*, aranea idcirco nominatur, quòd tenuissimæ aranearum aut ceparum telæ simillima videatur. Hanc si quartam tunicam nominaueris, nõ morabor: monebo tamen integrā non esse tunicam, sed integram ex hac & retina potius absolui, qua tum vitreus, tum infixus illi cristallinus continentur. Tenuissima prorsus est aranea & pellucida, ne visioni moram vllā aut impedimentū adferret. Itā sensim natura progreditur, à cornea & adnata maximè crassa & dura, per vream & choroidem tenuiorem ac molliorem, ad hanc tenuissimam araneam, in qua cristallinum videndū præcipuum organum medio oculi loco condidit: circaq. illum ex retina atq. araneæ coitu corona quasi describitur, quæ cilia oculis exterioris appo- sita pulchrè representat.

Retina

Quinta tunica est *αεραειδης*, aranea idcirco nominatur, quòd tenuissimæ aranearum aut ceparum telæ simillima videatur. Hanc si quartam tunicam nominaueris, nõ morabor: monebo tamen integrā non esse tunicam, sed integram ex hac & retina potius absolui, qua tum vitreus, tum infixus illi cristallinus continentur. Tenuissima prorsus est aranea & pellucida, ne visioni moram vllā aut impedimentū adferret. Itā sensim natura progreditur, à cornea & adnata maximè crassa & dura, per vream & choroidem tenuiorem ac molliorem, ad hanc tenuissimam araneam, in qua cristallinum videndū præcipuum organum medio oculi loco condidit: circaq. illum ex retina atq. araneæ coitu corona quasi describitur, quæ cilia oculis exterioris appo- sita pulchrè representat.

Aranea

Quinta tunica est *αεραειδης*, aranea idcirco nominatur, quòd tenuissimæ aranearum aut ceparum telæ simillima videatur. Hanc si quartam tunicam nominaueris, nõ morabor: monebo tamen integrā non esse tunicam, sed integram ex hac & retina potius absolui, qua tum vitreus, tum infixus illi cristallinus continentur. Tenuissima prorsus est aranea & pellucida, ne visioni moram vllā aut impedimentū adferret. Itā sensim natura progreditur, à cornea & adnata maximè crassa & dura, per vream & choroidem tenuiorem ac molliorem, ad hanc tenuissimam araneam, in qua cristallinum videndū præcipuum organum medio oculi loco condidit: circaq. illum ex retina atq. araneæ coitu corona quasi describitur, quæ cilia oculis exterioris appo- sita pulchrè representat.

DE OCULI HUMORIBVS  
& musculis.

## CAPVT XXXIX.

**H**umor aqueus. Res omnino humores hisce tunicis continetur. Primus est is quem, *ὕδαρ ὀφθαλμικόν* & *αὐγὴ*, aqueū & albugineū ob aquæ ouī albuminis similitudinem dicunt. Anteriorē hic oculi regionem occupat, partimque inter corneam & vucam, partim etiam vucæ foramen subiens inter vucam & araneam continetur. Nam & humectat, & distendit, & separat tunicas hæc; prohibetque corneæ & vucæ lapsū supra cristallinū, ne illarū duritie pondere eū lædatur: & lumen forissecus accedens excipit & transmittit: ac demum cauet, ne subito dissipet spiritum.

**C**ristallinus. Alter est *κρυσταλλινός*, cristallinus & glacialis, atanea obductus tunica. Velut concretam aquam aut glaciem ad cristalli modum densatam & consistentem, non pari tamen duritie, illum esse dixeris. Omni caret colore, vt omnes diiudicet. Figuram habet rotundam, sed non omnino sphericam, lupino ferè aut lentis similem: anteriori parte magis planam, vt melius suscipiat lumen; posteriore magis acutam, vt humori vitreo infigatur firmius, nec faciliè ex proprio exturbetur loco. Itaque inter aqueum humorem anteriorē & vitreum posteriorē sedet in medio prorsus ac centro oculi, velut princeps vidēdi organum, propter quod oculum totum verè extructū dixeris. Quippe illi tūm humores duo reliqui; tum tunice omnes adstant, illiusque conseruationem & bonum spectant.

**V**itreus. Tertius igitur humor *ὕδαρ ὀφθαλμικόν* & vitreus, fuso vitro planè persimilis, retina tunica continetur, semiglobi ferè figura, cristallino mollior, sed aqueo magis consistens. Hic si antè cristallinum fuisset positus, densitate nimia impedimentum attulisset visioni; posteriori sede locatus firmat eum & sustinet, alimentūque illi præparat: ne colore rubro & venulis infricatur is, quem omnis coloris expertem oportebat esse, vt idoneum videndo colores omnes esset. Auicennam & Aueroem non ignoro existimasse aut certè visos fuisse existimare humorem aqueum exteriorum quasi excrementum esse. Verū omnes planè sunt animatæ partes animati oculi constitutrices, propter quas tunice ipsæ paratæ fuerunt: nutriuntur omnes: etsi semel pereat non recuperatur & visio cessat. Sanè aperta sunt Philosophi verba in tex. 82. lib. 2. de anima, ærem insitum auri animatum esse asserentis, sicut pupillæ humidum.

**M**otus oculi. Totus igitur oculus tunicis tribus totidemq. humoribus absoluitur. Absolutum verò septem ambiunt motores musculi, quibus mira volubilitate in sua cavitade ad videndum atque explorandum mouetur: siquidem perpendiculari linea hæc actio constat, pupillamque ad videnda obiecta conuerti necesse est. Vnus igitur musculus ad nasum conuertit, alter ad oppositum angulum, tertius sursum, quartus deorsum. Qui omnes vt rectum & similem faciunt motum, sic rectis constant fibris sibi que similes sunt & similem habent exortum ex interiori ossis cranii cavitade ceu summo ac stabili fundamento: & similem item terminū in suprema ferè adnatæ regione. Post hos minores alij duo accedunt obliqui oculum circumuertētes: prioribus similem hi

**A** quoque obtinent ortū, sed mox obliquo ductu alter ad maiorem, alter ad minorem oculi ascendunt angulum. Septimus denique grandior multoq. referus adipe opticū neruum in orbē ambit, adnatæq. tunice in orbē item inferitur turbinata figura. Eius actio est firmare oculum fixumque tenere in motu tonico quo alicui obiecto attētē diutiusq. inspiciedo applicatur oculus. Bestiarū, quæ terrā spectat, proprius hic esse à Faloppio & aliis creditur.

**B** Ex cerebro porrò tum ad oculum optici ducuntur nerui visorium spiritū differentes, tū alij ex secundo pari ad musculos hosce mouendos. Adstant verò vtrinque ad oculi angulos exigue glādulæ humoris excipiendō paratæ, nē obstit oculo; indēq. erumpunt lacrymæ. Deniq. Galenus in 10. de vlt partū lib cap. 2. in ea oculi parte, in qua corneæ & adnatæ in inserto visitur iidem quandam ceu coronā fieri obseruauit in septem omnino sibi insidentes circulos partitā: in quibus nunc immorari non placeat curioso lectori in dicasse satis.

**C** Illud obiter considerandū; quo fiat, vt eūm singuli oculi suos habeat motores musculos, ambo tamen simul & eodē moueantur motu; neq. vnus altero immoto moueri, aut vnus in vnā parte, alter in alteram trahi possit. Duplicē reperio causam, vnam efficientē, alteram finalē. Efficientem significauit Philosophus in explicatione problem. 7. sectionis 31. quoniā vnūcū est principium motus eademq. vtrinque origo, anterior cerebri pars; neruiq. optici, etū mouentes hi non sint, cerebro tamen proximè colligant oculos; dumq. coeunt ambo, faciunt vt vnus in vnā partē mouens alterū secum ad eandem trahat: minuscq. omnino est per hunc neruorū coitum oculorum consensus. Finalis autem causa fuit, vt tale prorsus, quale est, obiectum quodque appareat, exquisitāq. prorsus & certa sit hæc actio animalium bono tantopere necessaria: quæ ex diuerso oculorū motu imperfecta foret geminæ recte obiecta. Multa in hanc sententiam Galenus disse- rit in 10. lib. de vlt partium cap. 12. & 13.

OCVLVM AQVEÆ, NON  
igneæ naturæ esse.  
CAPVT XLI.

**H**ic organi natura aliquādo fuit. Plato igneæ aqueæ Aristoteles naturæ esse contendit. Platonis sententiam Pythagoreorum quoque fuisse testatur Priscianus Lydus in Theophrasti librū de anima cap. 44. Quoniam oculus est luminis susceptulum, tum propter tenues & nitidissimas tunicas tum propter humores ad summum perspicuos. Lumen namque igneæ species est. Deinde oculus est agilis, rotundæ figuræ, maximeque spiritalis, quæ ignis conditio est. Tum quorundam animalium oculi, vt falis, lucidi sunt & micant quemadmodum ignis. Et oculus quilibet compressus lucem quandā & splendore emittit. In quam sententiam Galenus in 7. li. de Hippocratis & Platonis decretis ca. 4. fuisse quendam memorat, qui cū in oculorū morbū incidisset, affirmauit se antequam id ei accideret apertis in somno repētē palpebris magnā antē oculos lucem videre fuisse solitum: quod tū sibi tūm aliis multis euenisse testatur. Etsi 8. lib. de rerum varietate Hieronymus Cardanus cap. 45.

eam testatur intuem se oculorū conditionem habuisse, vt in obscurissima nocte à somno excitatus iustraret omnia. Quod & Tiberio Cæsari accidisse refert Plinius lib. 11. cap. 37. Et Marcellus Ficinus in Platonis conuiuium, oratione 7. cap. 4. S. Augustinum addit tam claros & nitidos habuisse oculos, vt si acrius quemquam intueretur, eum quasi ad solis splendorem coegeret vultum dimittere. Tum verò nunquam riget oculus: nec alia videtur esse causa, quàm ignis. Postea nobilissimo organo nobilissimi sensus nobilissimum elementum debetur. Et Aristoteles ipse in problem. vltimo sect. 31. apertè scripsit aspectum ex igne esse auditum ex aëre. Extatque in 5. lib. de animalium ortu cap. 1. Empedoclis illud, cæcios oculos igneos esse, nigros aquæ.

At longè aliter in libro de sensu & sensili cap. 2.

Aristotel. & lib. 5. de animalium ortu cap. 1. & problem. 23. sententia. sect. eiusdem. Vbi quaerens, cur oculus membrorum omnium solus non rigeat, eam adfert causam,

quia est optimus, nec carnis quidquam continet: eosque irridet qui propterea non rigere inquebant, quòd in eo sit ignis. Vbi que autem aduersus Platonem contendit aquæ potius esse naturæ. Quare in tex. 82. lib. 1. de anima pupilam dixit esse humidam: & in text. 130. eam esse aquæ, auditum aëris, odoratum alterius horum; ignem aut nullius esse sensus aut communem omnibus. Certè si vili tribui debeat ignis, odoratum potius tribuendus videtur, qui in fumoso habitu caloris vi resoluto consistit. Vt sic liceat de sensibus omnibus ratiocinari. Tactus & gustatus terræ sunt, odoratus ignis, auditus aëris; alpectus igitur aquæ. Cùm enim oculus tunicis consistet & humoribus, illæ natura frigida sunt & sicca, hi verò, propter quos fabricata sunt tunicae, aquæam planè tēperationem habent. Et pupilla ipsa præstantissima pars, cuius gratia totus est oculus, nò aliam, quàm aquæ, naturam habet. Itaque læso aut fracto oculo magna ex eo fluit aquæ copia. Et ita humores separantur à tunicis, vt non nisi aqua vel aqueum prorsus quidpiam fecernatur. Ad videndū autem opus fuit oculum esse perspicuum, vt suscipere lumen posset: terreus igitur esse non potuit, quia fuisset opacus: neque aëreus aut igneus; tum quia hæc elementa aliis potius sensibus debebantur: quia non diu retinuisset lumen: tum quia si interiorent haberet ignem, lux interior exterioris aspectū prohiberet. Aqua ad suscipiendum & retinendum aptissima est. Denique oculus est propè cerebrum, proximèq. cum eo per opticū neruum coniungitur, & inde accipit tunicas: quare credendum nò est eum naturā habere illi prorsus contrariā, sed simile potius. Propterea mobilis est & agilis: quoniam humiditas multa lubricum facit, & musculorum multitudo promptissimè mouet. Quòd sit lucidus; externa lux facit: ex se autem perspicuus est, quia aqueus. Rotunda figura aquæ potius attestatur, quàm igni. Aqua enim eam semper figurā quaerit; ignis pyramidalem magis. Dicitur spiritalis; non natura, quòd tam materiale corpus est, quàm reliqua; sed operandi modo, quia & momento agit & species intentionales suscipit (aut etiam ijs omnino non eget) seu lumen, quod immaterialis penè qualitas est.

Quod verò alicubi dixit Philoſophus esse ex igne, loquutus ex aliorū sententia est: quod in problematice illo opere ac præsertim in ea sectione sæpè fa-

**A** cit. Quare in problem. 23. sententiam illam grauitè reprehendit. Neque mirum est postremæ illius quaestionis propriam eum tunc solutionem non exposuisse: quoniam in problem. 12. 13. & 19. iam aperuerat quid ipse sentiret. Quæstio erat, cur manus dextra & pes dexter differant à sinistris & perfectiùs operentur; oculus & auditus non differant. Duplicem iam solutionem exposuerat. Alteram ex assuetudine; quòd ab initio statim sensus vterque tam sinister quàm dexter æquè exerceatur. Alteram ex ipsa sensationis ratione: nam sentire est pati & affici ab obiecto; perindèque sensus vterque patitur & afficitur. Facultates ceteræ sunt actiue atque in dextra parte robustiores, quòd in ea maior animæ virtus & efficacitas. Vt magno perè verendum sit, ne vltimum illud problema inconsultò ac temerè à quopiam additum sit aut certè non eo, quo debuisset, insertum loco: nimirum tanquam aliqua præcedentium pars.

**B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **K** **L** **M** **N** **O** **P** **Q** **R** **S** **T** **V** **X** **Z** **AA** **BB** **CC** **DD** **EE** **FF** **GG** **HH** **II** **KK** **LL** **MM** **NN** **OO** **PP** **QQ** **RR** **SS** **TT** **UU** **VV** **XX** **YY** **ZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR** **SSS** **TTT** **UUU** **VVV** **XXX** **YYY** **ZZZ** **AAA** **BBB** **CCC** **DDD** **EEE** **FFF** **GGG** **HHH** **III** **KKK** **LLL** **MMM** **NNN** **OOO** **PPP** **QQQ** **RRR**

motus, relinquit oculus speciem sui in proximo aëre, eamque ibi cernit. At tribus modis peccant. Primum, quod speciem accipiunt per se ipsam videri: quod illius auctoris non admittunt. Deinde quod oculus non videt seipsum nec sui speciem, sed lumen. Postremò quia cum oculus ad suum locum & situm rediit, non videtur amplius fulgor, sed dum comprimitur. Alexander igitur & Sanctus Thomas oculum inquirunt esse laevem ac tersum, & idèò semper in se reflectere aliquam lucem, licet exiguam; qua nunquam destituitur aër. Deinde eum idem oculus sit mollis, compressus potest quodammodo dividi, ut una illius pars emineat magis, quam alia; & idèò pars inferior cernat lucem, quæ in altera eminentiori est parte. Sed queri potest, cur is fulgor quasi extra oculum cernatur? Cur rotundus videatur? Quomodo sensibile positum supra sensum sentiat? Albertus oculum dixit necessariò debere habere lumen, ut videat: quod si frigeret, lumen illud splendere. Fuerit id fortasse verum, si oculus innatum lumen habeat. At si aliud, quam externum, non habet, non video quomodo remoto corpore lucido remanere in oculo possit. Videtur potius is effectus referendus in spiritum; qui tenuissimus cum sit, dum fricatur oculus, facillimè inflammatur; præsertim cum oculus lævis sit & tersus: & idèò inflammato spiritu facillimè fulgeat. Breui tamen tempore cessat fulgor; quia tenuissimus spiritus citissimè extinguitur. Sanè Philosophi verba significant inferiorem oculi partem pressam cernere superiorem tanquam lucidam: quia lævis est & tersa. Apparet autè quasi extra oculum; quia superior est extra partem eam, quam videt. Apparet rotunda, quia oculus & vasa eius pars eam verè figuram habent. Denique quomodo sensibile positum supra sensum possit aut non possit sentiri, alium habebit magis proprium explicationis locum.

## DE AVRE.

## CAPVT XII.



Vemadmodum in oculo aspectus, sic in aëre auditus organum contineri nemo ignorat: iureque optimo Alcmeonem inquit Philosophus in primo historiarum libro cap. 11. captas auribus spirare credentem. Appellatio quidem certe indè videtur ducta; aut quod sonos hauriant, aut ab audiendo, aut demum à Græca voce *αὐδή*, quæ vocem significat. Atque in edito loco & utrinque positæ aures fuerunt, ut incurrentes ex omni parte sonos haurirent. Quæ verò potissimum oculorum auriumque parte colores aut soni sentiantur, eo loco docebo, ubi de facultatibus disserteram: nunc organorum descriptionem facio.

Auris igitur duæ sunt partes: exterior vna ex cranio capitæque prominens, foramini auditus in orbem inhxæ: proprio nomine auricula dicitur. Altera interior cranioque recondita. Exteriorem nec ossæ esse oportuit, nec prorsus carneam. Ossæ namque & facillè frangeretur, & inutiles gravaret potest, & duritate atque inflexibilitate plurimum esset molesta. Carneam verò tum facillè contenderetur, tum multitudine nimia minus esset ad excipiendum & traducendum sonum idonea. Neque erecta stare, sed concidens aditum soni præ-

cluderet: atque ab externis demum plurimum pareretur iniuriis. Ergò cartilaginea est, mediâ inter os & carnem substantiæ: obducta tamen pelle, communi partium omnium tegumento. Sic enim erecta stat, nec vllum animali adfert incommodum. Propterea pars inferior carnea propemodum est & prorsus mollis; quod iam infra foramen auris pendeat ad ornatum potius quam ad vsum. Inferior hæc pars fibra dicitur, superior pinna.

Tota caua & sinuosa atque in nobis semicirculari figura; semperque patula excipiendis parata sonis, & intrò conueniendis oportuna. Nam & ut melius audiamus, manum cauam obtendimus auri: & in 5. lib. de animalium ortu cap. 2. audire acutiùs dicuntur animalia illa, quæ longas ampliusque imbricatas auriculas habent, quod sonos excipiant melius & intrò tradant: quibus auriculæ præcise sunt, acutiùs illi audiunt. In animalibus ceteris mouentur, homini stant immobiles: tum ob mouentium musculorum defectum, nimiamque tenuitatem & imbecillitatem nervorum: tum quia ut in 2. lib. de partibus cap. 11. legimus, cum erectæ figuræ sit homo, duobusque nitatur pedibus, facile potest in omnem se partem conuertere ad sonum omnem percipiendum. Denique multa, quæ aurium motu animalia cætera faciunt, ut abigere muscas & si quid sit eiusmodi aliud, manibus homo præstare potest. Quibusdam tamen interdum hominibus mouentur, & quendam ipse mouentem vidit: quod nimirum pars aliqua circumiectorum ceruicis musculorum ad eam vsque regionem progreditur interdum. At quem tandem vsum habeat auris tam parua, etsi in hominibus cunctis mouerentur?

Auribus & piscibus pars hæc non prominere: nimio enim esset volantibus aut natantibus impedimento: nimiumque aues aëre & pisces aqua per auriculam suscepta læderentur. De marino vitulo loquens Philosophus in 5. lib. de animalium ortu cap. 2. hanc ipsam & aliam quandam causam exposuit. Auribus, inquit, caret, meatusque tantum habet, quibus audiat. Causa est, quod vitam hic in humore tradit: pars autem aurium addita meatibus est, ut motus à longè delatus aëris seruetur. Itaque nihil vtilis ei auriculæ forent. Immo verò offenderent, cum intrà se copiam humoris recipere. Et exterior quidem auricula sic se habet.

Interior autem locus obscurior multò est maiorique opera & arte insculptus. Est enim anfra ctui cochleæ similis, ut Aristoteles scripsit in 1. de historia cap. 11. tam est tortuosa fluxuosaque pars hæc. Amplia principio est, sed mox in foramen desinit, quod propterea nominatur cæcū: ob flexuosam, inquam, meatus tribus maximè gyris contentam obliquitatem. Aut etiam quod tam sit angustâ ut vix vllum esse videatur. Quod propterea factum est, ne vehementi motu aërisque ac soni appulsu interior organum læderetur, contunderetur, aut etiâ penitus rumperetur. Nam & obliquitate meatus frangitur, & foraminis angustia retardatur, & verò etiam arcetur bestiola, quæ & cruciatum maximum & damnum attulissent.

Sordes in eo colliguntur, cerebri excrementa biliola. Inde illud accedit commodi, quod bestiolis ingressus vltior prohibetur, dum sæcis illis quasi visco detineatur. Cur autem eæ sint amaræ, eam Philosophus in problem. 4. sect. 32. voluit esse causam, quod ex putri & excrementosa oriuntur

Auris cur ducta.

Aurium situs.

Auris partes.

Aures et cartilagineæ.

Auris figura.

Hominis auris.

Auribus et piscibus.

Auris meatus.

Aurium sordes.

orianatur materia, quæ salâ nimirum est. Sed & nimia siccitas & adultio salsedinem faciunt, tum in omni excremento; absumpto scilicet humido dulci; tum in aqua maris, quæ austione sallescit. Hæ verò sordes biliosa excrementa sunt, adusta, calida, & sicca. Et ideo etiam flavescent: bilis enim flauus est humor: Viscida sunt & tenaces: tum propter bilis naturam: tum quod cerebri, cuius excrementa sunt, substantia tenax, siccataque in aere tenaciores euadunt; cum præsertim locus ipse sit tenax.

Meatus sursum potius, quam deorsum, progreditur: quod & cerebri sordes commodius defluant, & si quid extraneum ingrediatur, difficilius penetret elabaturque facilius. Cæterum foramen cæcum in cranij cavitatem temporis ossi insculptam pertinet: Ad eamque nerulum à quinto pari admittit. Cavitatis huius partes quædam læues sunt, aliæ pumicis instar asperæ. In eaque & tympanum & incudem, & malleum, & stapetem mirabili artificio extructa cernimus. Nô procul enim ab aurium foramine osseus orbiculus est veluti linea descriptus, tenuique membranula à menyngæ dura obductus. Inter hunc circulum areamvè contentam & aurem ossiculum est, quod paræ incudis formam referat. Hic aër ille continetur, quem in tex. 83. lib. 2. de anima auribus insitum & in ædificatum Philosophus dixit: tympanumque veluti facit membranula illa foramini cægo obliquè obducta ac tympani modo tensa, aëremque illum includente: qui tamen elementaris aër non est, sed vapor aëri similis. Obliquè autem membrana tenditur, vt ab externi aëris sonu impulsi minus patiat. Tympanum hoc meringa vocatur aliqui: & illud eiusque vsum paucis descripsit in libro de principijs Hippocrates. Aurium, inquit, foramina ad os durum, & siccum lapidi simile pertingunt. Tam verò ad ipsi os cavitatis est antrofa. Pellicula verò in aere iuxta os durum tenuis est veluti aranei tela, omnium pellicularum siccissima. Quod autem siccissimum est, maximè resonat. Nimirum tympani vsum communis est, vt percussum resonet, hæcque membrana externi aëris impulsu percussa resonat, sonumque interiori renuntiat organo. Si humoris defluxu madecat, grauior sonorum auditus est: humida namque minus resonant. Si crassior sit & densior, surditatem omnino adfert.

Porro hæc resonantia trium fit ossiculorum vsum, quæ cavitatis hac continentur. Vnum incudis molarilidè dentis, alterum mallei, tertium antiqui stapetis aut Græcæ litteræ Δ (triangulare enim est) figuram referunt. Solidissima omnia sunt & siccissima, vt magis resonent. Malleolus membranæ appensus in incudem desinit, in eus alligatur stapeti membrana impulsu aëris motu malleolum mouet, is incudem percutit, & interior fit resonantia, sonusque quali cuditur: quodque facilius transmittatur, fenestella duæ, superior & inferior, ad sunt. Adest & canaliculus ad palatum asperæque arteriæ officium cartilagineus: tum quia inter ossa opus fuit materia solida: tum vt patens semper esset: eiusmodique omnino solet esse aëri transitus. Hoc quippe insitus ille purgatur aër & subinde mutatur, ne diutius inclusus putrescat: aut etiam, vt alijs placet, ad tympanum quoque & contentum aërem recreandum inspiratus penetrat aër.

Hinc mirus inter aures & palatum ac guttur consensus existit. Vt propterea quidpiam atten-

tius audituri non respiremus: & vt Aristoteles habet in 5. libro de animalium ortu cap. 2. & problem. 13. sect. 32. oscitantes non bene audimus sonos; quoniam aère subeunte inflatur nimium ac distenditur auris tympanum; nec pulsare malleolum valet. Nec oscitantes audemus aurem inscalpente: quoniam cum inflatur membrana, si auriscalpio tangatur, læditur plurimum; aut certè oscitatio cessat. Nonnulli etiam, cum suas inscalpunt aures, tussunt: quod ex aurium cõfrictione quidpiam ad guttur per meatum defluat, quod tussim mouere possit: aut si prorsus sicca sit tussis, ex sola vasorum communicatione mouet: Surdastri per os audiunt melius: subit enim per meatum sonus. Ac demum tangentes aures saluam excitamus in ore: magna siquidem est aurium cum radice linguæ coniunctio.

Verum interior alia cavitatis in aere est, quam labyrinthum vocant, quod multis quasi circulis cõstet; in quibus susceptus tandem sonus sentitur. Adest enim auditorius neruus ex anteriori conclauis protensus ibique in membranulam dilatatus, quæ sensum sonorum habet.

## DE ORE ET PARTIBVS EIVS.

### CAPVT XLII.

**E**tiam superest gustandi organum considerandum. Illud est lingua: quam inspicere si libeat, aperias os, vastumque illud antrum & amplam cavitatem, in qua delitescit lingua, simul intuearis. Et ego dicturus de lingua, simul etiam oris partes omnes percurram.

Oris vniuersi duplex est generalis vsum, tertius specialis. Generalis & animalibus omnibus communis est, tum ad respirandum, tum ad sumendum alimentum: hæc enim parte & aërem ad pulmones & alimentum ad ventrem transmittimus. Adde etiam si placet, excrementa multa secernimus. Homini autem proprius, loquutio est. Aère quippe inspirato & respirato ad loquendum vsumur. In multis hic quoque vsum quoquo modo inest, siue ad gemitus & in conditos edendos sonos; siue in aibus ad cantum.

Quæ in ore aperto considerantur, hæc sunt: palatum, gurgulio, fauces, mælopharynx, lingua, maxilla, gingiæ, dentes. Palatum quasi tectum testudovè incumbit: Græci *σπερον* dicunt, quasi oris Cælum. Ad huius finem faucibus imminet gurgulio, græcis *σπερον*, catnea & fungosa particula, superius latior, inferius angustior: quam ob causam infundibulum appellant aliqui. Vocis modulationi plurimum confert: quibus enim auit præfectus aut derosus est, ijs loquutio deterior. Proptereaque plectrum à quibusdam vocatur; solusque homo & aues quædam eo vtuntur. Omnibus verò communis vsum est, vt frigidior aërem mitiget; qui pulmonibus obest & plurimum in ijs obest, quibus gatgarcon præcitus sit; quos tabe consumi auctor est. Alexander in 3. problem. lib. 2. quod crassescat sanguis pulmonisque densentur & ad motum tardiores euadant: quare magno ad motu conatu rumpuntur vasa, vt tabe orti necesse sit.

Columella

Quid verò à gargareone differat columella, & yua, seu triula; explicare melius nò possum, quàm fuerit ab eodem Alexandro expositum. Collumella, inquit, vitium gargaris est (gargar enim etiam dicitur) cum in longum per fluxionem efficitur. Et vnam gargar idem per morbum appellare solemus, quoties per inflammationem speciem accipit vix acini.

Fauces.

Iam Fauces Græcis φάρυγγα totam hiantis oris capacitatem nominamus, ab inferiori maxilla ad cervicis vsque vertebrae circumscriptam. Angustam hanc regionem plurimis refertam organis idipsum quoque veteres dixerunt Græci. Vnde melior glandula iuxta isthnum vtrinque posita quibus lingua, fauces, & os irrigantur salua, fuerit dicta.

Palat.

Lingua.

Lingua verò siue à lingendo fuerit nominata, siue quòd alligata faucibus sit; tum sapes gustat & discernit, vtilèque alimentum ab inuicili dignoscit: tum suo motu cibum ore susceptum dentibus terendum subijcit: tum eundem tritum in gulam trudit: tum sonos ac voces format loquutionemque totam moderatur; ἀγγελοι λογισται, sermonum Angelum ac nuncium appellauit Euripides. Sunt & alij quorundam animalium vsus proprij: vt canis ad bibendum, lambendòque morbos & curandos; vrsi ad expellendum & perficiendum festum, atque aliorum alij. Communissimus & amplissimus omnium is est, qui circa sapes & alimentum versatur. Et quoniam sapor non nisi in humido gustatur, saluæ humor à proximis suppeditatur glandulis, qui loquutioni non minùs proficit: nam nec voces eudere arida lingua potest.

Salina.

Figuram, magnitudinem, situm, & substantiam vsui maximè habet opportuna. Figura est longa nec magnopere lata, sed basi, quàm mucrone, latior. Ori magnitudine planè congruit, vt eòmodè in omnem eius pertingat partem. Basis alligata, mucro solutus ac liber, vt expeditè moueri & cunctis oris partibus applicari queat. Omnino inter dentes continetur, atque ad gulam & arteriam asperam desinit. Dentes namque cibum comminunt, gula comminutum suscipit, arteria aërem trahit & reddit: omnibus adest lingua, gustando inquam & comminuendo alimento, eoque deglutendo, ac voci ex aëre respirato formanda. Inferiori medio ipsius corpori validissimum subijcitur ligamentum, quo suffulta facilis in omnem partem mouetur. Extremæ huius parti funiculus adnascitur, quem lingua frenulum vocant. Radici adstat os, quod à similitudine litteræ υ hyoides nominatur. Nullum os substantiæ linguæ insertum aut cartilaginem admirabilis illius agilitas patiebatur. Hyoide vtrinque fulcitur, & super illud mouetur. Ligamentum pro osse datum est: quod non solum firmat linguam, sed etiam facit vt non nimium in se colligatur retrorsum, quòd difficilior esset ad anteriora extensio.

Lingua frenulum.

Os hyoides.

Lingua substantia.

Substantia igitur carnea tota est, mollis, rara, laxa, ac penè spongiosa fungosaue: tum ob motus agilitatem, tum vt sapos humores facilius susceperet. Itaque tenuissima obducitur membrana & palato communi. Bipartita cernitur ac diuisa in quibusdam animalibus, vt in serpentibus, sicut bina sunt exterorum sensuum organa. In homine ac reliquis vnica continua tota, in dextram tamen & sinistram partem linea media per longitudinem eius ducta distinguitur. Lingua, inquit Philoso-

phus in 2. lib. de partibus cap. 10. et si obscurius, quam oculi, certius tamen, quam tactus, geminum gustandi vestigium ostendit: fissura enim linguam distingui perpicuum est.

Venas à iugulari externa accipit, arterias à superiora, nervos tum sentientes à tertio & quinto pari per tunicam sparsos, tum mouentes à septimo musculus eius insertos. Accuratè hos distinguere per quam arduum, tantopere ipsorum permiscetur fibræ. Hi tamen esse videntur, qui omnem in partem moueant: sursum duo ex temporalium ossium processibus egressi: deorsum item duo ab inferiori maxilla, qua molares continentur dentes, pronati: vterque autem hic motus aut rectus est, si musculus vterque trahit; aut ad alterum declinat latus, si alter trahit laxato altero: retrorsum duo alij ex ossis hyoidis basi protensi: antrosum totidem ab interiore procedentes mento: dextrosum vnus, sinistrosum alter à cornibus hyoidis ossis aut paulò inferius interdum (si cornua illa ossa planè non sint, vt in mulieribus ferè) ad latera linguæ producti. Omnes verò medio ferè longitudinis inferuntur, qua ligamenti finis est.

Ph.

Magni lingua.

PROBLEMATVM ALIQVOT explicatio.

CAPVT XLIII.



Vociferis auribus non cum palato modo & gutture, vt in superiori capite dictum est, sed cum lingua quoque magnus omninò consensus existit. Quòd sit, vt quemadmodum confirmat Philosophus in cap. 9. lib. 4. de hitoria, surdi omnes à natiuitate sint imbecilli. Qui verò penitus surdi non sunt, aut non ab ortu; et si non omni voce priuentur, ægrius tamen, & vridem Aristoteles loquitur in problem. 2. & 4. sect. 11. & problem. 14. sect. 33. per nares loquuntur. Quod enim landunus prodidit in quaestione 7. in libro de sensu & sensili, & post eum Iacobus Carpentarius in commentarijs ad caput primum Alcinoi, surdos propterea mutos esse, quòd nullum potuerint audiendo addiscere idioma: veram rei causam non continere, manifestum ex eo est, quòd ij quoque, qui penitus surdi non sunt idiomaque perdiscunt, ægè tamen eloqui ea possunt ac propemodum muti sunt: quoniam difficilis est illis respiratio; cumque vix possint guttur attollere, vox per nares truditur. Eos verò, qui à natiuitate sunt surdi, sæpè compertum est tantopere priuari voce, vt ne naturalem quidem sonum, gemitus & suspiria, quæ addiscere non oportuit, edere possent. Et primi nominum inuentores, qui ab alio nullo idioma didicerunt, quo modo loquuti sunt? Quo enim modo illi voces excogitarunt, quibus animi præderent sensa, possent & excogitare surdi, si nil aliud esset impedimenti: quemadmodum alijs atque alijs corporis vtuntur gestibus.

Surdi ab natiuitate.

Huius igitur rei causa petenda est ex eo, quòd vt Alexander quoque confirmat in explicatione problem. 138. prioris libri, paridem nervorum sit, cuius pars altera ad aures, altera ad linguam vsq. porrigatur: atq. ita cõmunem accidere affectiõne necesse sit. Quintà enim par, vnde auditorius descendit nervus,

dit nervus, ramum quoque ad linguam & laryngem mittit: larynxque prima quinti huius paris origine laeditur quoque ab ea pendens ramus; & si quis nascatur surdus, nascitur item mutus. At si non ex vitio nervi principio, sed quod aut auris forami aetate procedente oppletum sit, aut tympanum factum crassum aut molle non resonet; minimè necesse est cessare simul aut saltem vitari vocè. Nam neque muti omnes continuò surdi sunt: quoniam vitium in lingua ramulo esse potest & nò in quinti paris radice, quod ad aurem præcipue ducitur.

Puer ante aetatem loquutus.

Huc verò spectat & illud Philofophi problema 27. lect. 11. qui fiat, vt puer quispiam antè aetatem incipiat loqui; & vbi semel fuerit loquutus iterum obmutescat. Nimirum fit interdum, vt necessaria loquendo dispositio citius adueniat linguæ; atque ex sola phantasia & apprehensionis vi ad loquendum absque voluntatis impulsu lingua solvatur. Quemadmodum perpèrè nomen aliquod vel non cogitantibus nobis aut volentibus, propter vehementem antea factam apprehensionem in linguam incurrit. Euenit quoque, vt quæ dispositio est vno tempore, desideretur alio: sicut notissima rei nonnunquam remissio non possumus cum maximè volumus; quæ post cum minimè cogitamus occurrit. Denique fieri potest, vt non simul facultas audiendi & intelligendi, facultasque mouendi linguam & loquendi perficiantur; sed illa potest esse perfecta antequàm hæc absolvatur. Interim verò dum perficitur, vehementi impressione aut imaginatione quapiam euenire potest, vt ad loquendum lingua solvatur, postque locutio cesset.

Nim mutua loquutus.

At postquam nemuti aliquando loqui, etsi loquantur, quenam est causa? Cræsi namque filius, cum nunquam antea loquutus esset, prompsisse dicitur verba, quibus caueret, ne patrem in bello captum occiderent. Confucius sanè natura ad discendi & loquendi facultatem simul absolueret; vt alijs ea, quæ didicerimus ipsi, communicare possimus. At fit interdum, vt loquendi, quam intelligendi, facultas breuiori tempore absolvatur; postque perfectè quispiam intelligere atque addiscere idioma, nec tamè quidquam loqui: tum verò lingua quoque virtuteque loquendi perfecta loquatur illic, neque noua institutione fit opus. Quod Cræsi fortasse filio accidit, vt antea non loqueretur, quod loquendi vis nondum esset perfecta, post vehementi capti patris imaginatio ne spiritusque commotione verba quedam protulerit.

## DE MAXILLIS, GINGIVIS, & Dentibus.

### CAPVT XLIV.

Maxilla.

Axillam duplicem in hianti ore spectamus, superiorem & inferiorem, immobilem illam, hanc mobilem, vt in superioribus traditum est. Superior ex pluribus omnino constat ossibus: ad vndecim vel duodecim numerantur, quæ nunc commemorare superfluum. Inferior duobus, quæ ad medium mentum cartilagine vniuntur, quæ in prouectioribus in ossis naturam degenerat homini. Breuissimam hoc animal sui corporis proportionè maxillam ha-

bet: quod facie ferè rotunda, non oblonga, vt animalia cætera, præditum sit. Atque vt minus graueret faciliusque moueretur, sinus & cavitates medulla plenas continet.

Maxillam mouentes muscoli.

Mouetur autem inferiori maxilla, & sursum, & deorsum, & ad latera. Sursum trahunt vtrinque musculi terni. Primus temporalis propterea dictus, quod supra temporum cavitatem natus; per eamque sub iugali osse in maxillam inferiorem exterius inferitur. Alter, quem masseterem vocant. Triangularis est ferè totumque genarum occupat locum; atque ab osse partim iugali, partim à malo profectus, ad mentum maxillæque extremum angulum tendit. Tertius exiguus in ore latitans à sphærænoide ossis processibus ad eiusdem maxillæ interiora descendit. Hi omnes sursum trahunt, cum ora claudimus. Deorsum autem, dum aperimus, digastrici duo dūtaxat; vtrinque vnus. Facilius enim est deorsum, quam sursum, graue corpus mouere. Et deorsum quidem trahenda solum maxilla est; sursum autem non trahendo modò, sed & fortiter ac vehementer cum superiori comprimenda, dum manducamus cibumque dentibus aut diuidimus aut terimus. Gracilis est hic tertius musculus & oblongus, ex temporalis ossis processu sub aure prodiens, carnosus primùm, deinde in medio neruosus, tum rursum carnosus interiori summo infigitur mento. Hi duo contracti atque in se collecti aperiant os maxillamque deorsum trahunt. Cur autem præter visitatam musculorum conditionem in medio euadat nervi (quidquid Galenus & alij dixerint) duas opinor fuisse causas. Alteram, quia cum graciles essent & oblongi, periclitari fuissent in motu, nisi hic arte fuissent in medio roborati. Alteram ne recta versus aurem, vnde oriuntur; sed deorsum traherent. Vtriusque argumentum sumas ex rectis epigastrici musculis, quos ob longitudinis & intestinorum compressionem sæpius membraneis admixtis fibris interrumpi diximus. Denique ad latera mouetur maxilla, dum manducamus cibumque terimus; non peculiari aliquo alio musculo, sed his ipsis, quos commemoravi: masseterem potissimum, qui propterea mansorius & molitor appellatur. Duplici namque principio duplicique fibrarum sese intersectantium serie constat: dūmque laxatis alijs contrahuntur aliæ, motum eiusmodi faciunt. Nec parum temporalis iuuat, dum lato natus principio atque in acutum desinens, has aut illas fibras laxatis alijs colligit. Denique omnes omnino commemorati musculi, tum masseter, tum temporalis, & in ore delitescens digastricus, motum eum faciunt, dum in vno laxari latere contrahuntur in altero.

In vtraque porrò maxilla tum cavitates sunt dentibus excipiendis paratæ, quas alucolos, locellos, fossulas, præsepiola, & mortariola vocamus: tum obductæ gingiuarum carneæ immobiles, vt in alucolis dentes firmiter stabiliantque. Scio non leuiter disputari, an dentes inter ossa commemorandi sint. Sed ego duo constanter aio. Primùm enim ab ossibus cæteris specie illos ac natura differre non dubito. Non eandem, inquit Philofophus in cap. 4. lib. 2. de animalium ortu, naturam, quam cætera ossa, dentes habent. Et antè illum Hippocrates in Aphotismo 18. lib. 5. Frigidum, inimicum ossibus, dentibus, nervis, cerebro, spinali medulla. Quæ omnia tanquam partes natura diuersas commemorat: alioqui commemoratio vitiosa.

Dentium alucoli.

Dentes ab ossibus natura differre.

N ij

si ossium nomine dentes quoque continerentur. Sanè vt in 3. libro positum est, ossa partes corporis animatae sunt, dentes non sunt: ossa in prima foetus conformatione simul formantur omnia, dentes post adueniunt: & illa quidem ex communi formandi foetus materia, hi ex excrementosa prorsus & reiectanea: ossa certum ac statum habent accretionis terminum, dentes vt continuo vsu mutuoque attritu consumuntur, ita crescunt semper: illa contenta medulla nutriuntur, hi ex terreo halitu constant: ossa per omnem vitam cum ceteris partibus conferuantur corporisque integritatem timentur, dentes decidui sunt & pro illis renascuntur alij.

*Dentium generatio triplex.*

*Dentes ossibus natura similes.*

*Dentium partitio & vsus.*

*Situs.*

*Radix.*

*Ortus & casus.*

*Sapientia dentes.*

*Numerus.*

Et Hippocrates in libro de principijs triplicem illorum generationem fecit: primam in vtero, etsi nondum ex gingiuis emerferint: alteram post ortum lactenti puero, dum è gingiuis prodeunt: tertiam procedente etate, dum puer solido iam vitur cibo. Illis enim cadentibus renascuntur alij.

Alterum tamen fateor, per similem eos ossibus naturam habere. Sicillimi namque sunt & frigidissimi, durissimi, laeues, & candidi; & quidem magis, quam ossa omnia. Etenim quod ad soliditatem & duritatem attinet, maiorem omnino, quam ossibus, inesse illis oportuit. Quoniam ossa suffulciunt solum carnem & molliores partes: at primarius dentium vsus in diuidendis ac terendis cibis, qui duriores persapè sunt, apparet. Quam ob causam tripartitò diuiduntur: quidam acuti prorsus sunt ad frangendum; qui canini dicuntur: alij acuti & lati ad scindendum, incisoresque appellantur: alij demùm penè quadrati & molares ad terendum & molendum. Singuli locum suo muneri quam conuenientissimum occuparunt. Anteriores enim & primores sunt incisores, in vtraque maxilla ferè quaterni: his vtrinque adstant canini duo: reliqui sunt molares. Omnes insiguntur maxillis radice sua, quæ incisorijs & caninis vnica est, molaribus duplex, triplex, & quadruplex: sed plures in superiori maxilla, quam in inferiori radices habent: tum quòd illa rarior sit ac mollior: tum quòd in ea penduli insistant dentes: inferior densior est & durior, atque in ea dentes vel proprio pondere sustentantur. Incisores prius, quam molares, nascuntur, quòd & minores sint illi, & secandi vsus prior, quam molendi. Prius etiam decidunt; tum quia prius nati; tum quia acuti cum sint, hebetantur citius, acutioresque alios & ad vsus idoneos par est succedere: tum verò maximè quòd vnica illi radice atque in tenui maxilla, molares radice multiplici in maxilla lata nituntur. Diutius quoque molares oriuntur: & in 3. libro de animalium ortu cap. 8. habet Philosophus, vigesimo anno & nonnullis etiam senescentibus prodeunt illi, qui vltimi omnium sunt: quos propterea in libro de principijs Hippocrates *εωπριεσίντες*, id est, sapientia dentes appellauit, quòd in quarto septenario erumpant, quo incipimus sapere. Auicenna dentes sensus & intellectus nominauit.

Triginta vel triginta duo in plerisque hominibus dentes numerantur: in quibusdam plures vel pauciores. Nec defuerunt, qui duplicem eorum haberent ordinem: vt Timarchus Nestoris Cyprij filius, Dircelinæque Mithridatis filia: immò & triplicem Phæbus Columbi periti Anatomici

A filius. Sed rarissima sunt hæc & præter naturam consuetum. Extat autem illud Hippocratis in 2. epidem. sect. 6. Qui longæ vitæ sunt, plures dentes habent. Et omnino paucitas & raritas dentium damnatur. Et mares propterea longiorum, quam feminas, degere vitam scripsit Aristoteles in problem. primo sect. 34. Cuius rei multiplex ratio esse potest. Philosopho illa probata est in problem. 47. sect. 10. quòd qui raros & paucos habent dentes, ijs crassius est capitis os: cumque cerebrum minùs perspiret, citius putrescit. Nam & ideò vir magis, quam femina, viuax est, quòd plures in capite suturas habet, liberiùsque perspirat cerebrum. Sed & alia adferri possunt. Prima, quòd multitudo dentium ex caloris & solidæ substantiæ copia prouenit; à qua prorogatur vita. Altera, quòd qui plures & coniunctos magis obtinent dentes, ij meliùs cibum mandunt accuratiusque conficiunt, vnde melior coctio diuturniorque vitæ conseruatio sequitur.

Hic igitur primarius est ac præcipuus dentium vsus. Alij sunt minùs præcipui. Nam & articulandæ voci famulantur: & ad oris ornatum faciunt: turpe siquidem edentulum esse. Et animalibus quibusdam armorum instar sunt. Nec defuerunt, qui homini ad garulitatem compescendam datos fuisse moneant.

C Finem toti huic imponam tractationi, si duo paucis exposuero. Alterum, cur dentem totum natura renouet, partem illius fractam non possit reponere. Alterum, cur dentes in senectute decidant. Prioris ea fuerit causa, quòd dentis truncus, qui in maxilla remanet, renouationem prohibet: eo extracto libera est natura, vt ex noua accedente materia, si robustus adhuc fuerit calor & virtus integra, dentem alium reponat. Posterioris autem, vel eadem est, quæ pilorum casus: nempe humoris & caloris inopia: vel ea etiam, quòd dentium incipit cessare vsus, aut ad occasum iam præcipitata natura, aut copiosioris cibi non amplius indiga.

DE CORNIBVS.

CAPVT XLV.



Am verò cum dentibus cornuum quoque consideratio coniuncta est. Hæc namque animalibus ijs insunt, in quibus maxilla superior dentibus caret:

quòd ea materia, quæ dentium esse debuerat, abeat tota in cornua, superflua, inquam, & excrementosa materia. Ea sunt quadrupedia animalia: non omnia, sed viuipara & grandiora. In alijs quibusdam per similitudinem nominantur, vt est in 3. de partibus libro cap. 2. Illis verò sunt velut arma, siue ad inferendam vim, siue ad repellendam. Duplex ferè est cornu, ita geminis delectatur natura, æquumque est, vt dexteræ & sinistræ maxilla dentes dextro & sinistro compensentur cornu. In quibusdam tamen vnicum est in medio capite positum, vt vtraque pars illo participet. Quæ duplex habent, vngulam quoque diuidunt: quæ vnicum, non item. Quoniam

Cornu & ungula.

Quoniam cum similis vtriusque natura sit, equum est & vngulam similiter findi & cornu. At non ita semper est, sed vnicum interdum cornu cum vngula diuisa cernitur.

Cornua curru capite.

In capite gestantur cornua animalibus cornutis omnibus: tum quod in ea parte materia illorum plurima suppeditatur: tum quod ea maximè pars incommodis & damnis omnibus exposita præsidij hinc fuit munienda. Et in alijs quidem partibus officia multa impedirent, in capite omnino nullum: immò in hac parte commodissime illis animalia vtuntur. Sed pars ea cornuam, quæ infligitur capiti, latior est ferè, vt firmius stet, & caua, vt minus sit in capite pondus. Desinit autem in fortissimum & acutum mucronem, qui sine sui detrimento ferre possit. Solis ceruis solida prostris sunt: at & in illis solis decidua, fortasse propter nimium pondus ita natura prouidit. Ceruæ tamen cornua non habent, quia ne maribus quidem sunt necessaria: sed tamen in illis offenduntur, quàm imbecilliores famine.

Cuti in fixa cornua.

Cuti potius, quàm capitis ossi, adherent. Quare & cutis colore imitantur, & simul cum cute detrahuntur, & vt in 3. lib. de Historia Philolophus prodidit, in Phrygia & alijs in locis visuntur Boues, qui cornua perinde, vt auriculas, moueant. Ex materia namque ascendente cutique circa os adherescente formantur.

Cornua mobilia.

DE SCAPVLA & Brachio.

CAPVT XLVI.

Animalis & arboris similitudo.



Vod in arboribus truncus est, hoc in animalis corpore id totum, quod ventre & thorace continetur à collo ad podicem. Quod radix radii suè exortus, hoc caput. Quod denique rami, hoc manus & pedes, quæ communi artuum nomine nominamus, brachiaque & crura comprehendimus, quod illa propter manus, hæc propter pedes adiuncta sunt. Vt enim arborum trunco adnascuntur rami, sic reliquo corpori artus. Hominis manus & brachia anterioribus quadrupedum pedibus cruribusque respondent: vt vel homo sit erectus cælumque spectans quadrupes, vel quadrupes in terram spectans & incuruatus homo.

Artuum dispositio.

Horum omnium compositio ex ossibus est, musculis, & externa cute: Has verò, vt & cæteras corporis partes, percurrunt arterie, venæ, ac nerui. De his satis antea dictum. De ossibus & musculis dicendum. Musculi mouendo necessarij fuerunt, ossa robur & stabilitatem præstant: nec sine illis extendi potuisset membrum, nec firmiter apprehenderet aut cõtineret quidquam, & omnino tremulum semper penderet.

Manus totius partitio.

Ab extrema portò scapula ad summos vsque digitos manus extenditur: cuius quatuor sunt primarię partes; scapula, brachium, cubitus, & extrema manus. Scapula insidet dorso, velut basis & fundamentum brachij. Brachium à scapula humeròque ad cubiti vsque coniunctionem protenditur. Cubitus seu vlna lacertusue à brachio ad extremam manum oculus ipsis notam.

Scapula

Scapula humeruse, Græcis ἀκρωτηριον, vnicò cõ-

stat osselato & tenui, trianguliferè figura; cuius apici excavato inseritur cubitus. Pars eius, quæ modicè curuata incumbit dorso, plana tota est & posita: altera verò exterior in duas quasi cauitates media spina diuiditur. Itaque tum costas tectur, tum brachij & musculorum plurimum insertionem spina & extremitatibus cæteris excipit. Inferuntur enim illi; tum ij, qui ipsam mouent; tum aliqui ex ijs, qui brachium agitant. Anteriorum namque triangularis musculus trahit à superioribus quinque costis ortus, antequàm in cartilagine designant. Surfum, tum trapezius ille, qui ex occipitio ita per totum descendit dorsum, vt vtrinque coniunctus Monachi cucullam referens cucullaris quoque dicatur. Tum alius à prima & sequetibus cervicis vertebris pronatus. Deorsum item & retrosum trapezij, pars inferior. Vt enim supernè descenditibus hbris trahit surfum; ita & deorsum infernè ascendetibus: & retrosum illis, quæ ex recto immittuntur loco. Sed & is, qui à figura nominatur rhaboides, partim à cervicis, partim à thoracis vertebris ductus, retrosum, ad superiora tamen, trahit. Omnes enim hi musculi ex dictis producti locis inferuntur in scapulam, eamque ad suum quisque principium trahit.

Scapulam mouentes musculi.

Brachium vnicò item, sed rotundo, magno, & robusto constat osse; quod cartilagine multa scapulae inseritur cauitati, vt firmior insertio sit; cum in omnem partem & vehementer moueri brachium oporteat. Ad pectus namque adducit pectoralis musculus ex media pectoris longitudine natus supraque mediam ferè brachij partem infixus. Abducunt retrò simul tres ex scapulae basi vnus per superiorem ipsius externam cauitatem, alter per inferiorem, tertius perimam & internam partem ad paulò elatiorem, quàm superior, brachij partem progredientes. Surfum cleuaris, qui valde carnosus ex clauicula longitudine per scapulam ad eundem ferè pergit locum. Deorsum recta duo detrahunt: latissimus vnus ab ossis sacri & lumborum spinis; & alter ferè rotundus ab inferiori scapulae basi sub brachij caput inserti. Denique in orbem circumagitur brachium non peculiari alio musculo, sed his omnibus successiuè agentibus.

Brachij os.

Brachium mouentes musculi.

DE CUBITO ET RADIO.

CAPVT XLVII.

Am cubitus à brachio ad manum extensus duobus constat ossibus, quorum vnus altero longius paulò est. Id, quod est longius, exteriùs est, & cubitus vlnaue vocatur. Huic breuius alterum incumbit interius, radiusque appellatur. Hoc nimirum interius os breuius esse oportuit, vt exteriùs illo in brachij sinu articulo flexi cubitus ad anteriora posset: eandemq. ob causam excavatur idem cubitus grandiq. factò sinu semicirculo profundiori brachium vicissim excipit; vt & fortis cartilagineum ac vinculorum interuentu articulatio sit, & commoda cubiti flexio. Hic enim ipse radius brachio articulatur rotundo sinu, qui brachij caput excipit: articulatur etià cubito, tum supernè, tum infernè. In medio longitudo tota protuberat atque dehiscit à cubito: tum vt musculis, qui circa cubitum ducendi erant, locum cedat: tum vt in pronum & supinum promptè

Cubiti & Radius ossa.

N iij

duplicis articulationis vsu ageretur; qua superne quidem cubitus excipit radium, at inferne à radio excipitur. Ideoque pars cubiti superior crassior, inferior tenuior: contra superior radij tenuior, inferior crassior. Et magis in homine, quam in animalibus ceteris dehisceat radius: quod promptiores homo manuū motus habet; minus ea, quibus pes in digitos discissus est; minime in illis, quibus solida aut bifurca vngula. Sanè proprius cubiti motus flexio est & extensio; radij verò pronam & supinam manum facere.

Cubitus  
mouens  
musculi.

Cubitus flexitunt musculi duo. Alter biceps est, tum ex eminentiori scapulæ ceruice, tum ab eiusdem processu, qui anebore similis esse dicitur, exortus per summum descendens brachium in vnicum mox coit ventrem validoque tendone in inferiorem radij partem sub brachij articulatione inseritur. Alter planè carnis ex ea brachij parte ductus, in quam musculos brachium mouentes infigi diximus, anteriori cubiti & radij parti propè illos articulationem infigitur. Extendunt autem totidem. Primus ab inferiore scapulæ costa, quæ ad ceruicem accedit: alter à posteriori brachij ceruice, & cum priori coniunctus musculo tendone vnicò in extremum cubiti processum vterque definit. Quare si vnicum hunc bicipitem musculum commemoraueris, consentaneè flexioni dixeris, quæ bicipitem item alium obtinet. Fibrarum tamen diuersitas cernitur & insertionis loci. Prior quippe interiori, posterior exteriori processu parti videretur inferi: atque ita simul ambo totum processum ambiunt.

Radium  
mouens  
musculi.

Radium item quiescente ad brachium cubito, quatuor in pronum & supinum agunt musculi: duo internam, totidem externam cubiti sedem occupant: illi in pronum, hi in supinum mouent. Primus est quadratus ab imò cubito in imum radium: qui radium in rotisum trahens adducit in pronum. Alter longissimus ab altiori externa brachij parte prodians radiòsque intratus in ipsius ferè extremum definit atque contrarium priori motum facit. Tertius longior vnus interior ex interna inferiori brachij parte obliquè ductus supra medium radij sistitur; contractusque radium ad pronum trahit. Et exterior alter interiori planè respondens ab externa cubiti articulatione ad mediam item superiorem radij sedem fertur; dumque contrahitur, radium supinum facit. Atque hæc quidem ita se habent in homine. In bestijs namque, quæ anterioribus quoque pedibus, hoc est brachijs, incedunt, nonnulla diuersitas.

#### DE CARPO ET Metacarpio.

#### CAPVT XLVIII.



Anus verò extrema supremaque, Hypocrati & Græcis ἀρσάριον, propter quam hæc omnia fuerit tacta, admirabili profus arte constat. Et verè Aristoteles pronuntiauit in cap. 10. lib. 4. de partibus, eam non vnum, sed multa instrumenta esse: tum quia digitis multis velut instrumentis pluribus

Manus  
multa in  
strumta.

constat: tum quia plurimis ipsa, imò omnibus instrumentis vitur omniaque sibi præparat. Et omnino instrumentum est ante instrumenta. Quodum præditi sumus, non est quoddam nudos nos atque inermes conditos esse dolemus. Non enim vno, sed omnibus omnino præfidijs instructi sumus, dum manum habemus: & vt verbis vtat Philosophi, Manus & vnguis est, & vngula, & cornu, & hasta, & ensis; & quod vis aliud armorum aut instrumentorum genus: quippè quæ omnia hæc sumere ac tenere potest. Itaque & hominem prudentissimum animalium omnium esse dixit cum Anaxagora; quoniam manus habet: & item cum Aristotele, manus eum habere; quoniam prudentissimus est. Vt enim animi prudentia atque intelligentia, qua vt manibus posset, causa fuit, vt manus corpus acciperet, quibus obsequeretur animo: sic prudentia atque intelligentia animi argumentum atque indicium sunt corporis manus. Ita nudum atque inermem hominem duobus maxime ornauit natura; ratione & manu. Illa instrumentum animi est, hæc corporis; vt est in problem. 3. sect. 30. Nec satis vna manus fuit: duplicare oportuit, quòd vna non posset sola amplecti omnia & operari; & verò organa omnia duplicauit natura.

Manus igitur partibus tribus coagmentatur, <sup>Manu</sup>carpo, metacarpio, & digitis. <sup>partis</sup>Quam partem <sup>Carpi</sup>Græci nominant, nos brachiale dicimus: articulum scilicet illum, quo manus cubito iungitur. <sup>Coli</sup>Octo constat magnitudine & figura in aequalibus coniunctis ossibus, ordine duplici in quaternos & quaternos distinctis, intusque non nihil fungosis. Hæc cartilaginibus & vinculis cubito metacarpioque alligantur. Sed multitudinis duplicisque ordinis ossium eam ego causam agnosco, vt promptior sit & expeditior multiplici articulatione manus flexio, directio, & ad latera motus flexio duorum est musculorum ab interno brachij processu prodeuntium; quorum alter in quartum carpi os, alter in metacarpij primum terminatur. Extensio autem duorum item ab externo brachij processu deductorum; quorum alter in primum & secundum, alter in quartum metacarpij os definit. Lateralis denique & obliquus motus eisdem musculis aut seorsim singulis aut binis flexore & extensore, simul trahentibus.

Iam quod <sup>Metacarpij</sup>Græci, post brachiale nos appellamus; latam illam & amplam partem, quæ carpo brachiali iungitur. Interior illius pars <sup>Thenar et</sup>brachij, <sup>hypothenar</sup>quod est percutere: nobis vola & palma. Exterior huic aucta <sup>Thenar et</sup>propria nos vocem non habemus. Nec satis scio, quomodo in mentem Hieronymo Cardano venerit in 15. libro de rerum varietate cap. 79. Thenar spatium illud appellare, quod inter pollicem digitum est & indicem; & hypothenar id, quod illi opponitur sub imo digito, quo solemus etiam percutere; nam si à communi libuit vsu vocum recedere, contra potius loqui debuisset: siquidem thenar à percutiendo dicitur. Sanè & palma & hac ima metacarpij parte percussimus.

In palma mira nugatur chiro mantici, mōticulis, qui digitis subsunt, in planetas distributis, lineisque per totam palmam descriptis diligenter cōsideratis. Philosophus tamen longioris in illis vitæ agnouit signa, si sigula aut binæ per totam manum produ-

Chiro mantici

et sint;

tae sint breuioris si secus, in primo libro de historia cap. 15. & problem: 48. sect. 10. & problem: sect: 34. praesertim si lata sint, profundę, & omnino bene formatę, minimeque interruptę. Cuius rei rationem in superioribus, eum de vitę duratione dicere mus, in primo libro docuimus.

Metacarpi ossa.

Quatuor porro oblongis ossibus totum metacarpium constat; quę pedinis figuram quandam referunt; ideoque pedem a quibusdam vocatur. Superiori parte carpo inferiori digitis articulatur: pollex siquidem ab illis separatur. Longissimum omnium est; cui insistit index, quoniam carpo alterius inferitur. Et quoniam in omnibus, quantum conditio rerum paritur, similis sibi semper natura est; respondet in eo metacarpium cubito; vt quemadmodum radij, & vlnę coniunguntur extremitates medięque dehiscent; ita & in horum quatuor metacarpij ossibus factum est. Coeunt enim vinculis interiectis superiora inferioraq. extrema, vt quęm optimę ac firmissimę sit colligata manus: & vacuantur distantque media, vt minus grauis & ad motum atque operationem omnem expeditior existat; pluribusque musculis pateat locus ad digitos. At omnibus obducitur is, quem palmarem vocabimus; quod ex interno brachij processu egressus angusto mox, sed pręlongo tendone ad manus palmam perueniens, per eam totam ad extremos ferę vsque digitos expanditur, firmiter cuti adherens; manūque apprehensioni plurimum famulatur.

Musculus palmaris.

DE DIGITIS MANVS.

CAPVT XLIX.



Quatuor demum Metacarpij ossibus totidem adiunguntur digiti; index, medius, anularis, seu medicus, & auricularis seu minimus: Quibus a carpo quintus accedit, qui quod virtibus ac robore prę ceteris polleat, pollex dicitur. Veteres quoque ἀπὸ χειρὸς quasi manum alteram nominauerunt; vt auctori est inter ceteros Macrobius lib. 7. satur. cap. 13. Tres opinor fuisse causas. Primam, propter virtutem & robur, quo ceteris omnibus equalis est. Sic enim apud Homerum ἀπὸ χειρὸς aequalem Deo significat; & Amazonas ἀπὸ χειρὸς, id est, viros virtute pares, & Alexander in præfatione ad lib. 5. toporum & Philoponus in com. ad tex. 1. lib. 1. physic; & Sextus Philosophus in libro aduersus Mathematicos id, quod Aristoteles in 1. de arte dicendi Rethoricam scripsit ἀπὸ χειρὸς esse dialecticę, interpretantur esse ἰσορροπία, æqualem & similem. Alteram, quod non metacarpio inseratur, vt ceteri digiti, sed ex carpo velut manus altera nullius interuentu prodeat. Tertiam, quod aliorum digitorum apprehensionis pollex post velut altera manus accedat.

Pollex digiti carpi pollex dicitur ab ἁπλοῦς.

Est autem præhensio propria manus operatio, propter quam & ipsa in digitos & digiti in articulos diuiditur, vt in flexione multiplici apprehendere vel minutissima posset, fortiterque apprehendentibus ceteris vltimus admouetur pollex, vt illorum omnium apprehensionem firmer. Hunc si remoueris, infirmi sunt ceteri, facileque reuel-

Manus apprehensio.

les omnes. Nec temerę putes digitos ceteros inæquales factos. Confert id plurimum apprehensionis, dum omni ex parte res inæqualitate hac attingitur & tenetur. Verum totum hunc locum præclare tractauit Philosophus in cap. 15. lib. 4. de partibus; flexus, inquit digitorum ad capiendum præmendūque commodissimę habent. Vnus a latere adiunctus digitus est, ilque breuis & crassus. Vt enim si manus omnino deesset, potestas capiendi non fieret: sic nisi digitus hic a latere adesset, non eadem illa facultas probę daretur. Hic enim a parte inferiori sursum præmit; vt ceteri a superiori deorsum: quod fieri ita oportet, si validę quasi copula forti colligandum sit. Pollet hic plurimum, vt vnus multos equiparet. Breuis etiã est, vt robustus sit, & quoniam nullam præstaret commoditatem, si longus esset. Rectę etiã nouissimus digitus paruus est, & medius longus, tanquam remus nauigij medius. Quod enim officio capitur circum, per medium digitum completi potissimum necesse est. Sed enim pollex & magnus, qui a latere iunctus est, ideo appellatur, quamuis paruus sit; quoniam ceteri sine illo inutiles ferę sunt.

Digiti carpi plures, & inæquales, & in articulos diuisi.

Vniuersam porro digitorum seriem φαραγγίς Græci, id est, aciem & agmina vocarunt. Stare enim quodam modo in acie videntur.

Digitorum phalanx.

Singuli tribus ossibus constant. Quorum articuli & nodi κόρυμβοι vocantur. In primo de historia libro cap. 15. δακτύλου ὅ το ἐπι καμπτῆρος κόρυμβος τὸ ἐ ἀκαμπτῶν φάλαγγες. 1. id est, digiti quidam pars, quę flectitur, nodus, quę verò non flectitur, phalanx. Suprema digitorum pars interior acinus seu vertex. Inferiores articuli ἀρκαδίου δὲ μοι μέδι κόνδυλοι. Supremi ἑσταυρόσδουλοι. Singulis quędam adstant ossicula telami semen referentia; bina in 2. pollicis & 1. reliquorum; & vnicum in tertio pollicis secundoque ac tertio ceterorum articulo: quę ad articulationis robur ac tendonum eò pertinentium propugnaculum spectant.

Digitorum ossa & articuli.

Ossa sesamoides.

Singulis enim articulis infiguntur plures illorum motores. Flectunt hi & contrahunt: primus ab interno brachij, processu prodiens, antequam ad carpum perueniat, in quatuor tēdones diuiditur, qui forti vinculo, veluti anulo, quem pericarpium dixeris (hinc deductum puto armillarum seu dextralium apud delicatas mulierculas effeminatosue ac molles viros vsū) colliguntur in carpo ac tandem in secundum digitorum quatuor articulum desinunt eumque flectunt. Cur colligentur in carpo, duplex est causa. Prima, ne distrahantur & vacillet motus, in tam longo præsertim ductu. Secunda, vt digiti magis conuertantur & flectantur ad carpum. Sed dum primum hi perreptant articulum, membranis ac villis illi quoque alligantur, eumque simul mouent. Alter simili quidem, sed humiliori principio, pari que diuisione ad tertiam eorumdem digitorum flectendum articulum, prioris musculi tendonibus ad secundum articulum sistentibus perforatis, progreditur. Quod tūm ex necessitate factum est, cum progredi alio modo non posset: tūm ex intentione naturę, vt remotissimi articuli certior esset ac stabilior motus. Ad primum verò articulum flectendum interiores sunt perexigui

Musculi digitorum motores.

Pericarpium.

musculi, singulis digitis inserti bini ita proximi metacarpij ossibus producti. Deniq. pollex tribus flexitur musculis: primo supremus articulus à superiori parteradij deriuato; duobus alijs à pericarpio & pollici subiecto carpo deductis, tum articulus alter, tum infimus. Sed musculi quidem digitorum quatuor flexores rectis constant fibris, quod recta ad carpum flectant, qui verò pollicem flectunt, obliquis aut transuersis; quoniam ad priores illos digitos mouent, vt valida sit & firma manus apprehensio.

Extendunt autem priores quatuor digitos eorumque articulos musculi alij externi: qui tum ab exteriori brachij processu bini exorti pericarpio-colligati, simili prorsus, quo per internam flexores, modo per externam progredientes manum in secundum & tertium inferuntur articulum: tum à metacarpij ossibus alij, qui interioribus similes ad articulum primum exterius pertinent. Pollicem verò alij à cubito ad illius item articulos deducti.

Est & tertius digitorum motus, quo aut adducuntur aut abducuntur. Is est exiguorum illorum musculorum, quos primis quatuor digitorum articulis infigi diximus. Bini enim simul contracti flectunt aut extendunt: ac si alter contrahatur laxato altero, aut vnus flexor & alter extensor illi proximus contrahantur, laxatis duobus ceteris, adducitur digitus vel abducitur. Et pollicis adfunt adductores musculi à metacarpij ossibus producti, alij. ex aduersa parte abductores. Hæc est obscura satis & multitudine musculorum implicata totius manus descriptio quam breuissime fieri potuit comprehensa. Iam de pede dicendum est.

DE SACRO ET AD  
iunctis ossibus.

CAPVT L.

**M** Anum in quatuor partes diuisimus, scapulam, brachium, cubitum, & extremam manum. Nam et si scapula manus propriè pars non videatur esse, ad manum tamen pertinet: tum quod illius principium sit: tum quod cum non ad thoracem, sed ad artus pertineat, non nisi ad manum pertinere potest: quippè artus omnes manu pedèque comprehenduntur. At pedem manui respondere parèntque esse oportet, & in quadrupedibus bestijs eundem prorsus habent vsum. Pedem igitur quadupartitè item diuidamus, in ischium, femur, tibiã, & extremum summumue pedem. Hic extremæ respondet manui, tibiã cubito, femur brachio, ischium scapula: siquidem vt brachium scapulae, sic ischio femur articulatur. Os sacrum sacro ossi validissime implantatum est; nec intelligi potest quomodo habeat, quin totius sacri ossis intelligatur structura.

**O** sacrum os appellatum est; vel quod maximum sit & ab amplitudine *maro* dictum, id est, latum & amplum os: vel quod veluti basis & fundamentum existat aliorum omnium. Huic namque tum spina tota, tum femora & crura innituntur. Pluribus sanè ossibus constat, sed quæ procedente etate coalescant in vnum, coalius tenui vix vestigio

*Pedis  
partitio  
manus  
respondet.*

*Os sacrum  
cur dictum.*

**A** relicto. Quinque aut sex in puerulis separantur; quæ vertebrarum spinæ similitudinem quandam referunt: & quò magis descendunt, eò angustantur magis, sùm ipsa, tum eorum processus, qui in superioribus ossibus magnopere producantur.

**C**ontinet & sacrum os spindem medullam, indeque quinque aut sex neruorum paria prodeunt, Sed infimæ illius parti succedit os nullæ iam medullæ peruium; quod à Coccygis seu Cuculi auis rostri similitudine nomen habuit tribusque aut interdum quatuor ossiculis constat, quæ minora sensim sunt & in acutum tandem desinunt; rostri figura, quæ introsum incuruatur. *Oppositior* etiam vocant, quod auium caudæ & mobilitus eius ossiculis simile sit. Nam in fœminarum partu & in magna ani apertione conuiet, & cedens ampliorem facit locum. Neque enim credendum est pubis ossa seungi aperitque parientibus: sed tantum coccygis os cedit; & amplior omnino fœminis, quàm maribus, locus: quod tum breuiore linea pubis ossa iungantur & tenuata magis & quasi sinuata distent magis: tum coxendicum infimæ partes magis distent. Ita fœminarum partui sagax & prouida natura prospexit.

**S**uperiori igitur sacri ossis regioni, illius inquam procelibus, os illud vtrinque infigitur implantaturque firmissimè ( in pueris triplici distinctum linea ) quod superiori ac posteriori parte ilium os vocatur; cui appendix summa adnascitur, spina vocata: inferiori & anteriori, qua circa pubem ex vitro que coeunt latere, pubis os appellatur: ad demum media ischium, coxendicis os, quod ibi coxa coxindixue articuletur. Porro hoc os ita vtrinque infigitur, vt simul cù osse sacro veluti peluim efformet, qua intestina, vesica, & fœminæ vterus egregiè continentur. Propterea fœminis ampliora sunt altiùsque educta hæc ossa, vt & fetus tutiori loco gestaretur, & facilius fœminæ gestatio fieret. Externa aut huius ossis regione amplius, rotundus, & profundus continetur sinus excipiendo femoris capiti paratus. Is cartilagine obductus læuis omnino est & lubricus, vt facilis sit tibiz motus, neque assiduo motu atteratur: atque ex media ipsius sede fortissimum producit vinculum, quod summo femoris capiti infixum firmissimè alligat femur.

**V**niuersum hoc os aut ossium potius compago sanè ad truncum pertinet, non ad artus. Non enim mo uetur, sed immota femoris ac pedis totius motum sustinet: hocque à mobili scapula non parum differt, fuit tamen hoc commemoranda loco, tum quod pedi hoc ipsum sit, quod manui scapula: tum quod sine illa femoris articulatio & motus nec intelligitur nec constat.

DE FEMORE.

CAPVT LI.

**F**emur brachio prorsus respondet & est simile: vnicum os longissimum omnium in homine, in auiibus contra & ferè quadrupedibus tibiã longior femore. Caput superius, quod ischij, profundo sinu excipitur, vinculoque alligatur, læui obductum cartilagine apophysis quædam est & appendix, quæ in teneriori præ-

*Osteo-  
g.*

*Fœminæ  
partu.*

*Ossis sacri  
partu.*

*Fœminæ  
ad sacrum  
os articu-  
latu.*

*Os sacri  
scapulae  
pondus.*

*Os femo-  
ris.*

rioni præsertim ætate haud magno labore separatur. Ad sunt & aliæ apophyses seu appendices due minores velut ex ceruice educatæ vna externa, quæ magnus *ῥοτῶν* magnus rotator dicitur: altera interna, minor trochanter seu rotator: *ῥοτῶν* quod est rotare, voluere, & currere. Hi musculorum plurium ortui & insertioni parati sunt. Femoris autem longitudo reliqua rotunda est, at minus exquisitè, ob musculorum exortum & insertionem. Est autem minus exquisitè recta, sed anteriori parte nonnihil curva & posteriori caua, tum propter eandem causam, tum ob sessionis commoditatem. Est enim homo sessile animal. Denique inferiori parte paulò crassior, quàm superiori: tum quòd minus esset carnosa periculifque magis exposita: tum propter diuersam articulationem. Cum ischio quippè vnico capite, cum tibia duplici articulatur: crassiorèmq; oportuit eam partem esse, quæ duo efformatura esset capita & vnum sinum. Propterea superior caput in omnem partem mouetur, flectitur, extenditur, in latera & orbem ducitur: quoniam vnico sinu vinculo ceruici infixio suspensum continetur: inferiori flectitur solum & extenditur: duplex namque caput motum ad latus aut in orbem non permittit. Sinus verò, qui inter hæc duo capita continetur, inæqualis est. Anteriori parte minus profundus, sed magis patulus est, excipiendo scutiformi ossi præparatus: posteriori autem multo magis profunda medium tibiam processum excipit; præualidòque duplici vinculo duo hæc colligantur ossa. In posteriora enim fit homini tibiam flexio, quòd sessile animal sit: contra in bestijs, quæ toto in terram procumbunt corpore. Diuersitas hæc in inferiori femoris & tibiam articulatione spectatur. Altera in superiori cum ischio. Nam quoniam erecta homo futurus erat corporis figura, quæ cælum intueretur; inferiori prorsus ischio, parti femora illi infinguntur, bestijs terram spectaturis apponuntur ad latera. Ita hominis aliæ, alia bestiarum rationem corpora sustentantur.

Femoris ad ischiũ & ad tibiam articulatione.

Homini & bestiæ vi differantia.

Femur mouentes musculi.

**B**is commissura extrèmoque coxendice atque sub trochantere paruo mediòque ferè femore, ac tandem in extremum ipsius caput inseritur. Tum vero ille ipse, quem inter flexores tertium cõmémorauimus.

Abducunt vero foras transuersi minores tres, quorum vnus ex inferioribus ossis sacri, ossibus, alter ex exteriori, tertius ab inferiori parte foraminis ossis pubis ad trochantera magnum extenduntur. At postremum hunc aut tripartitum quasi fuisse dicendum est, aut supernè & infernè duobus alijs adaptatum musculis, qui & illum tuto deducant & mouendi robur augeant.

Sed iam quemadmodum femur mouetur significandum est. Flectitur, extenditur, adducitur ad alterum femur, abducitur ab eo & circum agitur. Flectunt tres musculi: primus ex supremis lumborum vertebris ad paruam trochantera rectà descendit: cui cum incumbant renes, sit vt calculosis in femore sentiatur stupor. Alter ex interiori ossis ilium sede ad eundem processum ducitur. Tertius ex pubis ossis medio ferè interiori femoris infixus lateri modicè flectit: potiusque introsum trahit atque ad alterum femur adducit.

Extendunt autem hi. Primus maximus ex tota posteriori ossis ilium costa, ossis sacro & coccyge prodiens, sub magno trochantere desinit. Alter ab anteriori superiori que ilium costa ortus ad altiore processum eiusdem partem progreditur. Tertius ex eodem ilium ossis demissus paulò nactus principium eiusdem trochanteris apici heret. Tres hi musculi carnosissimi sunt, natemque totam efformant. Primus omnium maximus, alter medius, tertius tanto minor secundo, quanto secundus primo.

Adducunt introsum, siue tres dixeris, siue tricripitem vnum; non morabor. Tres enim exortus sunt, qui si vnum facient musculum, omnium est totius corporis crassissimus. Oritur ab ossium pu-

**A** bis commissura extrèmoque coxendice atque sub trochantere paruo mediòque ferè femore, ac tandem in extremum ipsius caput inseritur. Tum vero ille ipse, quem inter flexores tertium cõmémorauimus.

**B**is commissura extrèmoque coxendice atque sub trochantere paruo mediòque ferè femore, ac tandem in extremum ipsius caput inseritur. Tum vero ille ipse, quem inter flexores tertium cõmémorauimus.

DE TIBIA.  
CAPVT LII.

**T**ibiam cubito respondere iam diximus. Respondet autem tum compositione, tum operatione & vsu. Etenim tibia quoque duplici constat osse, interiori & exteriori; quæ in extremis articulantur, in medio dehiscunt; vt & cubitus & radius. Sed interius maius est, & nomen totius retinet, exterius minus & tenuius, fibulâq; vocatur. Pars anterior excarnis creta, posterior tota carnea nominatur sura: *ῥοτῶν* quasi tibiam (tibia enim *ῥοτῶν*) ventrem Græci nuncupant. Ceterum & tibia & fibula minus exquisitè rotunda sunt, triangulares potius: lineaque quæ in anteriori parte tactu, sentitur, spina dicitur. Intus caua sunt: tum vt minus grauent gestatūque & motu faciliores sint: tum vt medullam nutritioni contineant. Vtraque vero extremitas apophylli seu appendice terminatur, quemadmodum, & de femore dictum est.

Tibia ad sacrum.

Sed superior, quæ cum femore articulatur, perquam magna est & lata; vt crassior femoris extremitatem duplexque illius caput excipiat. Propterea duplici cauat peramplo sinu, interiecto capite processuè distincto: & vtroque, vt & femoris capita, obducto cartilagine, quæ facilem & expeditum articuli motum faciat. Itaque crassior euadit superior, quàm inferior tibiam pars; femoris contra inferior crassior, quàm superior. Duplexque femoris caput duplici hoc tibiam sinu excipitur, & interiectus tibiam processus femoris sinum inter duo cauatum capita pulchrè subit, vinculoque ex summo hoc processu in femoris sinum immisso firmissimè duo hæc colligantur ossa. Adstant & cartilagine in articuli præsertim ambitu, quæ non contemnendam præstant operam.

Tibia ad femur articulatione.

Hæc est tibiam ac femoris articulatione: quæ quoniam laxior esse debuit, vt & facilis esset & perfecta tibiam flexio tanto perè incessui & cursui necessaria, munita exterius est (interius enim non permittebat flexio) rotundo osse veluti scuto, quod articulationi adhæret. Molam aliqui, patellam alij & rotulam nominant, vulgus genu. Firmat namque laxiorem articulum, vt ad rectum angulum tibia flectatur, neque antrosum procumbat femur.

Mola seu patella.

Firmior etiam fuit articulus, dum fibula non vsque ad summum ascendit femur, vt duo femori articulentur ossa: sed prægrandi vnico & robusto

Tibia ad pedem articulat.

tibiae articulo capite inferius consistit fibula, leuiterque cauato sinu tibiae caput excipit. Contra inferiori ad pedem parte longiori tibiae sinu excipitur fibula; quae tantumdem infra tibiam producit, quantum superiori parte supra ipsam producit est tibia. Inferiores porro tum tibiae, tum fibulae apophyses seu appendices peramplo terminantur geminato sinu, qui pedis talum excipit, ab eoque vicissim excipitur processus inter duos interceptus sinus: quemadmodum de superiori articulo dicebamus. Sed huius loci proprium est, quod & interius tibia & exterius fibula processum emittunt deorsum: internum & externum malleolum nominamus: uterque cum nulla obtegatur carne; facile vel tactu sentitur. Atque ex infima utriusque malleoli parte vinculum ducitur, quo tibia & fibula colligantur talo. Quibus aliud ex anteriori tibiae appendice sede vinculum accedit aliud tali ceruicem adnectens tibiae. Haec est osium tibiae totius descriptio.

Malleolus duplex.

Tibiae motus.

Mouetur autem flexa, extensa, adducta, & abducta: tamen si flexio sola & extensio proprii ipsius motus sunt. Neque enim adduci aut abduci potest immoto femore, idque propter articulationis conditionem, quae solum quiescente femore flexionem & extensionem facit.

Tibiae motus musculi.

Flectitur igitur musculis tribus ab ischio in posteriorem tibiae regionem deductis. Extenditur quatuor: quorum vnus ab ilio, alter a magni trochanteris radice, tertius a trochantere paruo, quartus ab ipsa femoris osse, tendone vnico in anteriori ferè tibiae principium desinunt. Adducitur intrò, tum breui quodam & quadrato, illi persimili, quem antea diximus radium in proum agere. Is sub poplite latitat, ex femoris ferè cum tibia articulo, inferiorem & exteriorem ipsius tuberculo natus, & obliquis fibris in anteriorem insertus tibiae. Tum duobus alijs, qui non solum intrò agunt, sed attollunt quoque tibiam: nec modò flexionem iuuant, sed & motum eum faciunt, quo vnam tibiam illiusuè poplitem alteri tibiae imponimus. Horum alter longissimus ab anteriori ilio, alter tum a pubis commissura, tum ab exteriori femoris sede in internam & posteriorem tibiae regionem proficiscuntur. Abducitur demùm foras vnico musculo, qui ab ilio in externam tibiam obliquo ductu latissimoque tendone deriuatur, & ad extremum item pedem progreditur.

DE EXTREMO PEDE.

CAPVT LIII.

Pedis incisus.



T ischium scapulae, femur brachio, tibia cubito, ita & pes extremus summae respondet manui. Nam vt manus cubito ad apprehensionem additur, ita & pes apponitur tibiae ad incedendum. Manus enim apprehensionis, pes progressionis instrumentum est: indeque fuisse ductum nomen auctor est Aristoteles in cap. 13. lib. 4. de partibus, quod ad motum, Per unde qui hanc partem videt, hoc est in solo & campo fit, vsui sit. Nam et si in pedum quoque digitis aliqua possit esse apprehensio, & mulierculae vix interdum fuerint, quae perinde pedum ac manuum digitis

Per unde dicitur.

apprehenderent ac dirigerent acum; praecipuus tamen illorum vsus est, vt siue in planis siue in decliuis ac praeruptis locis figeremus pedem. Itaque pedibus & cruribus ambulando, currendo, stando, sedendo vtimus. Ambulamus & currimus altero pede & crure in terram fixo, altero agitato: & firmati quidem pedis potissimum agitari verò totius cruris est actio. Stamus porro vtroque pede in terram fixo: solusque homo stat, propter eam, quam iam significauimus, femoris ad ischium articulationem. Denique sedentes cruribus ac praecipue femoribus vtimus, pedibusque innitimur. Caetera animalia non aequè ac nos sedent: quoniam anteriorum, non posteriorum tibiam flectunt.

At extremi iam pedis compositionem spectemus. Ea quoque manus compositioni persimilis est. Vt enim manus carpo, metacarpo, & digitis, sic pes tarso, metatarso, & digitis item constat.

Sed tarsus septem ossibus constat. Primum est graecis ἀσπράγιος & ἀσπύριος, nobis talus seu balista os. Est enim in uersa nuci balistae simile, & inferiori sede quadratum: vnde & πτερόπιος quatuor dicitur. Superior pars caua est, excipitque os tibiae & fibulam, quae innituntur illi & articulantur: atque processum seu malleolum contentus talus vinculisque alligatur tum propter quadratam figuram, tum propter vtrinque adiectum prognaculum, toti corporis moli sustentandae aptissimus est: dumque anteriorum & posteriorum flectitur, nullam in latera mouetur aut luxatur. Alterum os τριταρσιον, nauiculare vocatur à cymbae similitudine, quam posteriore sui parte refert oblongo & profundo sinu, quo ceruicem oblongam & caput tali excipit, vt in latera pes non nihil agatur. Tertium omnium maximum ἄσπρα, os calcis, calx, calcaneum vocatur. Quod propterea maximè additum fuit; vt ad perpendicularum tibiae in pedem descendere, omninoque firmus staret homo; hoc scilicet os sustentatus, nè in posteriore cornuat.

Quartum, quod anteriori & exteriori pedis parti, carpi, & ossibus alijs adiungitur, à cubi tesserae figura ὑποσθενίον dicitur. Tria reliqua nominata sunt & minora, nauiculari ossi coarticulata: à quibusdam γαστροπόδιον appellantur, quod cuneum ferè referant. Reliquis terram tangimus, illisque maxime sustentamur: tria vero haec simul cum nauiculari attolluntur non nihil, vt pedem cauum faciant, quo terre firmiter figatur; posteriore scilicet calce & anterioribus digitis.

Iam metatarsus, quem ἄσπρον quoque & plantam, interdum etiam pedem dicimus, quinque ossibus constat, quae tarsi ossibus, partim in nominatis tribus, tum cubico articulantur. Hoc differt à metacarpo metatarsus, quod illud quatuor, hic quinque ossibus constat. Manus etenim apprehensio pollicem à ceteris separatam quasi alteram manum ceteris oppositam digitis postulat; contra pedis incessus coniunctos omnes & colligatos. Et hoc rursus à digitis manus pedis digiti; quod in manu pollex tria continet ossa, in pede duo; quo robustior esset & anterior pedis pars terre firmiter inniteretur. Ita manus pedis osse vno superat quippe in carpo octo, in metacarpo quatuor, in digitis quindecim, omnium in tota manu viginti septem: in tarso autem septem in metatarso quinque, in digitis

Pedis incisus.

Tarsus.

Carpi.

Metatarsus.

Os calcis.

Pollex.

Digitus.

Metatarsus.

Pedis incisus.

Manus.

Digitus.

in digitis quatuordecim, in toto pede sex & viginti numerantur. Præter sesamina ossicula, quæ non minus in pedis, quam in manus articulis reperiuntur.

*12 mus.* Totus porò pes tum flexitur & extenditur, tum ad latera trahitur. Retrosùm flexunt hi musculi. Primum duo, qui vtrinque ex extremo femoris ossis genivè articulo enati suo ventre precipuam partem prominentem apponunt carnem, & vno communi prælongo tendone, cui certius accedit perquam item carnosus ex posteriori parte articulationis fibule ad tibiam; in posteriorem calcis sedem inseruntur. Adest & quartus ab externa femoris extremitate prodians, moxque gracilis factus ad posteriorem calcem deductus. Et quintus, qui ab ea tibia, & fibula parte, qua sub communi articulatione dilatatur, in inferiorem tarsi sedem definit: paulò scilicet altius pedem flexens, quam superiores quatuor, ut summis etiam digitis possimus erigi.

Extendunt autem antrosor hui. Primus ab anteriori tibia fibulaque articulatione ad illud os metatarsi descendit, cui pollex articulat. Altera suprema fibula externa ad idem metatarsi os; aut ad illud interdum, cui medius innititur digitus, progreditur. Tertius ex eodem ferè principio sub hoc secundo metatarsi os illud petit, cui minimus adiungitur digitus. Quò etiam portio quedam pertinet illius musculi, quem ad mouendos digitos mox pertinet dicam.

Denique ad latera introsor aut extrosor trahitur pes, mox peculiari aliquo musculo, sed aliquo ex his ipsi trahente laxatis cæteris aduersi lateris.

*Digitos pedis mouentes musculi.* Ad extremum pedis digiti persimili mouentur modo, quo digiti manus. Flexuntur enim & contrahuntur, tum musculo à calcis ossis ad secundum quatuor digitorum articulum ducto: tum duobus alijs à superiori tibia fibulaque regione sub planta altero ad tertium eorundem articulum prioribus perforatis protenso; altero ad secundum pollicis os deriuato.

*Pantaris musculus.* Ad primos verò articulos, ut in manu à metacarpijs, sic in pede à metatarsi ossibus pertinent musculi sed musculosa potius congeries & moles, quam minus exquisitè distinguere ac separare liceat. Nec parum vniuersam hanc pedis contractionem iuuat gracilis ille per totam plantam extensus cutique obnatus (quem plantarem propterea dicemus) palmari manus respondens. Extendunt autem quatuor quidem digiti musculo vnicò ab externa summa tibia ad ipsos quadruplici tendone pertinente. Pollex autem alio sibi proprio à media ferè fibula enato. Adducunt etiam intrò quatuor digitos exigui quatuor musculi ex calcis ossis deriuati & per plantam ad illos ducti: pollicemque alius externo attentus lateri. At postremò abducuntur extrà alijs in superiori pedis parte ex tarsi ossibus in pollicem tresque proximos digitos distributi (qui flexioni quoque simulantur non parum) & peculiari quodam ab externo calcis latere per externum pedis latus in minimum inserto digitorum.

## DE VNGVIBVS.

## CAPVT LIIII.



Æterùm tum manus tum pedis supremis digitis adiecti vngues sunt; substantia mediæ inter cartilagine & ossa, cartilagine durioris at mollioris ossis.

Cum enim tum ad firmandas & communiendas digitorum extremitates velut carnis propugnaculum pertineant, ut in 4. lib. de part. cap. 10. Aristoteles scripsit: tum ad manuum apprehensionem iuuandam: mollis quippè caro cedit, reflectitur, & subuertitur duorum incursum corporum: eos quidem non prædura ossium substantia consistere oportuit, quoniam & ad apprehendendum & continentium non flexerentur; & facile rumpentur, nihil omnino cedentes; duraque à duris labuntur: ea tamen durior, quam cartilago, esse debuit, quo firmior apprehensio esset lætiore minor. Propterea neque superiores neque inferiores digitorum summitatibus vngues esse oportuit. Qui enim superant, minutas res, ut pilum, non apprehendunt. Si verò ad extremos non perueniant digitos infirmior est ad apprehendendum caro.

*Vnguis 10. modo.* Nugatur autem Galenus, cum in primo libro de partium usu cap. 8. Aristotelem reprehendit, qui vngues affirmans instar propugnaculi factos fuisse, haud satis exposuerit quale propugnaculum hoc esse natura voluit, an aduersus frigora, vel calorem, vel vulnerantia, vel quasiantia. Magis ipse reprehendendus est, qui solum apprehensionis usum agnouit. Quippè manus propria est apprehensio, non pedis, cuius tamen digitis præfixi sunt vngues: neque animalibus omnibus communis, quæ vngues aut vngulas habent; sed solius hominis, aut perpaucorum certè animalium. Itaque non generalis, sed specialis is usus est: quemadmodum & scalpere, & mundare, aut excoriare, & vellicare, & diuellere, & siquid est aliud eiusmodi; & in bestijs quibusdam rapere, defendere sese, aut lædere. Generale omnibus propugnaculum est; non aduersus frigora aut calorem, sed aduersus duriorum ac lædentium corporum incursum, à quibus extrema illa partes lædi potuissent, si molles profus fuissent. Argumento illud est, quòd equorum vngulis etsi præduris ferreæ quoque adduntur soleæ quarum sanè alius, quam propugnaculi aduersus hæc iniurias, non est usus. Eiusmodi quidpiam prouida quoque animalibus plerisque natura parauit.

*Cur em. uentur.* Eandem ob causam curuantur gibbæque constant superficie: non solum quòd rotundam sequuntur digitorum formam; sed etiam quòd hæc figura ad resistendum iniurijs sit firmior.

*Vnde oritur.* Empedocles ex neruis eos per congelationem credit nasci. Et Hippocrates in libro de principijs, & libro de natura pueri, ex ossibus & neruis deducere usus est Aristoteli ex cute potius; ut & pilos, & cornua, libuit deriuare in secundo libro de animalium procreatione cap. 4. Colorem namque cutis imitantur, & alba & magna & vario modo diuersa pro colore cutis redduntur. Nam & quotidie crescunt & usu teruntur & excremento ab ossium & neruorum nutrimento diuerso renouantur.

*Vita &  
sensus ex  
partes tres.*

Progrediuntur quidem venæ, arteriæ, & nerui, nõ ad vnguium modo radicem, sed etiam sub vnguib; ad digitorum quoque extremitates: verum hæc ad nutritionem, vitam, & sensum digitorum pertinent: vngues nutritionis omnis veræ vitæ ac sensus expertes sunt: eodemque, quo de pilis, dentibus, & cornibus antea dictum est, se habent modo.

*Natura  
in hoc  
corpore  
paterfamilias  
similis.*

Itaque vniuersam hanc humani & vero animati corporis considerationem philosophi verbis illis concludam, quibus naturam in hoc moliendo & conseruando corpore sapientissimo Patri familias in suæ domus administratione similem fecit. Partium, inquit, vnaquæque ex alimento gignitur: nobilissima quæque & potissimi principij participes ex cocto sincerissimo primoque alimento; reliquæ necessariæ ac illarum gratia institutæ ex deteriore ac reliquijs excrementisque. Perinde enim natura ac Paterfamilias prudens nihil admittere solet, ex quo facere aliquid commodi possit. Dispensatur autem in cura rei familiaris, ita vt cibus optimus detur liberis, deterior seruis, vilissi-

mus socijs animalibus. Vt enim incremento iam addito mens aduena facit hæc; sic in ortu ipsa natura ex sincerissima materia carnem cæterorumque sensoriorum corpora conficit; ex recrementis vero ossa, neruos, pilos, vngues, vngulas & reliqua generis eiusdem constituit. Quamobrem hæc vltima efficiuntur, cum iam suppetit excrementum naturæ. Triplicem namque cibum prudens pater familias facit: ex purissimo tritico sibi filijsque suis, ex minus puro seruis, ac demum reliquum furtur gallinis ac porcis tradit. Sic natura sapiens præcipuas partes ex purissima efformat & sustentat materia; reliquas ex minus pura; excrementa & reiectanea pilos, vngues, vngulas, cornua, dentes, rostra. Ita vniuersa animalium corpora constant & conseruantur. In quorum descriptione non ignoro quædam esse, quæ ab anatomicis accuratius ac pluribus pertractentur. Verum neq; nobis fuit propositum minutissima quæque persequi, sed idoneum animæ corpus organicum præparare; neque à Philosopho plura desiderari debent.

HIERONYMI

FINIS.

